




على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

تؤمن البنية الفراغية للبروتين تخصصه الوظيفي العالي ، إلا أن إصابة بعض المورثات بالطفرات تحدث إختلالا بنيته و منه وظيفته كما في حالة قصور المبيض المبكر الذي يتميز بإنقطاع مبكر للدورة الشهرية و تناقص هرمون الأستروجين يرافقه أعراض مزعجة .
توضح الوثيقة المساعدة بنية مستقبل هرمون FSH (FSHR) و دوره عند امرأتين الأولى سليمة و الأخرى مصابة



1- حدّد المستوى البنائي للمستقبل FSHR.

2- اذكر مختلف الروابط الكيميائية التي تساهم في استقراره.

3- من خلال معطيات الوثيقة ومكتسباتك. وضح في نص علمي مُمنهج العلاقة بين بنية البروتين FSHR وتخصصه الوظيفي. مبرزاً تأثير الطفرات في هذا البروتين.


التمرين الثاني: (13 نقطة)

تتطلب الاستجابة المناعية النوعية تدخل جزيئات بروتينية متخصصة تمنح الخلايا المناعية عدة خصائص كالاعرف والقضاء على المستضدات، لكن قد ينجم عن خلل في نشاط هذه البروتينات إفلات بعض الخلايا المصابة من الجهاز المناعي. مرض hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) هو مرض مناعي نادر يشبه السرطان في طبيعته وطريقة علاجه، يصيب أي فئة عمرية لكنه شائع بين الأطفال الصغار ما دون السنة، يسبب عدة أمراض كالتشنجات العضلية، اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) ومشاكل تنفسية وهضمية.

الجزء الأول:

لغرض معرفة كيف يسبب هذا المرض العجز المناعي الذي يؤدي إلى إفلات الخلايا المصابة من الجهاز المناعي نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ) رسما تخطيطيا لنشاط خلية لمفاوية (LTc) عقب دخول فيروس للعضوية.
- أما الشكل (ب) فيمثل نتائج تتبع نشاط الخلية (LTc) عن طريق قياس كمية الكروم المشع Cr^{51} المحررة في أوساط تحتوي على خلايا مصابة عند طفل سليم وآخر مصاب بـ HLH.
- ملاحظة: Cr^{51} ينفذ إلى هيولى الخلية المصابة ويتثبت على بروتيناتها ويتم تحريره عند انحلالها.



- اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب العجز المناعي عند الأطفال المصابين بمرض HLH، باستغلالك للوثيقة (01).

الجزء الثاني:

- من أجل التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدم الوثيقة (02) حيث:
- يمثل الشكل (أ) بعض مراحل إنتاج بروتين البرفورين داخل حويصلات الخلية LTc.
- بينما الشكل (ب) جدول يبين نتائج الفلورة، حيث أمكن بتقنيات خاصة تحضير أجسام مضادة مفلورة بالأخضر ضد بروتين البرفورين وأخرى مفلورة بالأحمر ضد إنزيم الكاتبسين، أضيفت هذه الأجسام المضادة لوسطين (1) و(2):
- * الوسط (1): به خلايا LTc أخذت من طفل غير مصاب بمرض HLH.
- * الوسط (2): به خلايا LTc أخذت من طفل مصاب بمرض HLH.

- بينما يمثل الشكل (ج) السلسلة غير المستسخة لجزء من مورثة PRF1 المسؤولة عن تركيب بروتين البرفورين عند كل من الطفل السليم والطفل المصاب، بالإضافة لدائرة الشفرة الوراثية.

	47	48	49	50
طفل سليم	TCA	CAG	TAT	CAC
طفل مصاب	TCA	TAG	TAT	CAC

الشكل (ج)

فلورة خضراء	فلورة حمراء	الأوساط
++++	++++	(1)
----	++++	(2)

الشكل (ب)

الوثيقة 02

- اشرح سبب العجز المناعي الملاحظ عند الأطفال المصابين بمرض HLH مناقشاً صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02).

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً تحصيلياً للتغيرات التي تطرأ على الاستجابة المناعية النوعية ضد الخلايا المصابة عند الأطفال المصابين بمرض HLH ، مستعينا بنتائج هذه الدراسة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الأول




الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

للعضوية القدرة على التمييز بما هو ذات ولا ذات. فعند دخول مستضد العضوية يثير استجابة مناعية تتمثل في آلية محددة يتم من خلالها حدوث عدة مراحل يتم خلالها انتاج بروتينات مختلفة ومتخصصة وظيفيا الغرض منها القضاء على الأجسام الغريبة. ولأجل معرفة بعض المراحل الأساسية ودور البروتينات نقترح عليك الوثيقة المساعدة.



- 1- عرّف الذات واللذات.
- 2- تعرّف على البيانات المرقمة ثم على المرحلة التي ينتمي عليها كل شكل.
- 3- من خلال معطيات الوثيقة ومكتسباتك. بيّن في نص علمي مُمنهج دور البروتينات المتدخلة في إقصاء اللذات.


التمرين الثاني: (13 نقطة)

تتوقف النشاطات الحيوية للخلية على التخصص الوظيفي للبروتينات التي تنتجها. مما جعل العلاجات الجديدة في مجال الطب البشري تعتمد على الدراسة الجزيئية لاستهداف البروتينات وتعطيل آليات عملها. لهدف التعرف على علاقة بعض الأمراض بالبروتينات والاستراتيجيات العلاجية لاستهدافها إليك الدراسة التالية.

الجزء الأول

في الأنسجة السليمة، يتم التحكم في انقسامات الخلايا. على العكس من ذلك تنقسم بعض الخلايا في الأنسجة السرطانية بطريقة عشوائية ومستمرة تشكل ورما سرطانيا كسرطان الرئة. يلعب بروتين النمو EGF والمستقبل الغشائي EGFR المحفز لأنزيم التيروسين كيناز دوراً مهماً في تنظيم دورة الخلية أثناء انقسامها.

- تعرض الوثيقة (1) إحصاء عدد الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية بعد زراعتها في نفس شروط الوسط كما هو مبين بالشكل (أ)، أما الشكل (ب) يمثل رسم تخطيطي لبنية EGFR البشري ومواقع الأحماض الأمينية في غشاء الخلية الرئوية مع الإشارة إلى مجالاته ووظائفه المختلفة.



الوثيقة (1)

- بين تأثير EGFR على تكاثر الخلايا باستغلالك للوثيقة (1). صغ فرضية توضح سبب ظهور سرطان الرئة عند الإنسان مقترحا طريقة علاجية للحد من تطوره.

الجزء الثاني

لهدف دراسة سبب ظهور المرض السرطاني الرئوي عند الإنسان وإثبات صحة الفرضية المقترحة إليك الوثيقة التالية :

- الوثيقة (2) تبين قطعة من السلسلة غير المستنسخة من مورثة EGFR عند شخص سليم وآخر مصاب بسرطان الرئة المرفقة بجزء من قاموس الشفرة الوراثية الممثلة بالشكل (أ).




- تم حقن فأر مصاب بورم سرطاني بأجسام مضادة سيتوكسيماب (Cetuximab) لمدة أسبوعين. نتائج تطور حجم الورم عند الفأر ممثلة الشكل (ب).

- يوضح الشكل (ج) آلية عمل EGFR الطافر وتأثير الأجسام المضادة على تطور الورم السرطاني.

رقم الثلاثيات (رامزات)	856	857	858	859	860	861	862	863
السلسلة غير المستنسخة من المورثة EGFR عند الشخص السليم	TTT	GGG	CTG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT
السلسلة غير المستنسخة من مورثة EGFR عند الشخص المصاب	TTT	GGG	CGG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT


الرمزات	CAG CAA	UGA UAG	UCC UCG	UUU UUC	GGU GGG	AAA AAG	AUC AUA	CGA CGG	CGC GCC	CUG CUA
الأحماض الأمينية	Gln	Stop	Ser	Phe	Gly	Lys	Ile	Arg	Ala	Leu

الشكل (أ)



الشكل (ج)

نسبة حجم الورم السرطاني (%)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اشرح سبب تطور السرطان الرئوي وطريقة علاجه. مؤكدا صحة الفرضية المقترحة باستغلالك معطيات أشكال الوثيقة (2)

الجزء الثالث

مما توصلت إليه واعتمادا على معلوماتك قدم في مخطط مصدر الاختلال الوظيفي للبروتين وتأثيره على سلامة العضوية.

انتهى الموضوع الثاني



العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	التمرين
مجموعة	مجزأة		
03	0.25 4× 0.25 4× 01	1- تحديد المستوى البنائي لبروتين FSHR : مستوى بنائي ثالثي 2- الروابط المساهمة في إستقراره : الروابط الشاردية / الهيدروجينية / تجاذب الجذور الكارهة للماء / الجسور ثنائية الكبريت 3- توضيح العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين و تأثير الطفرة على FSHR : تمثيل الإجابة ضمن مقدمة عرض و خاتمة مقدمة تتضمن مشكلا : كيف تؤمن بنية البروتين خصائصه الوظيفية ؟ العرض يتضمن الموارد التالية : -تحديد بنية البروتين من خلال عدد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له و التي تتوضع بطريقة دقيقة ضمن السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية - تنشأ بين جذورها روابط كيميائية (كبريتية، هيدروجينية، شاردية و كارهة للماء) - تؤمن الروابط الكيميائية تشكل بنية فراغية مميزة تسمح بأداء وظيفة نوعية - حدوث طفرة يؤدي إلى تغير توضع الأحماض الأمينية كما في حالة FSHR ، نتج عن الطفرة إستبدال الحمض TYR408 بالحمض ASP408 - نتج عن هذه الطفرة تقارب بين البنيات الثانوية المشكلة لمستقبل FSHR (يشير إلى المسافة) - ما جعله غير وظيفي و ظهور أعراض الخلل تتمثل في (الذكر الأعراض من الوثيقة) الخاتمة : إجابة عن المشكل المطروح ، إقتراح حلول أو طرح مشكل : بما أن أصل المرض طفرة ، كيف يمكن علاج هذا المرض و تخطي أعراضه ؟	التمرين الأول
	04	×0.6 5 01	
3.5	01	- الجزء الأول: - استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل رسما تخطيطيا لنشاط الخلية LTC عقب دخول فيروس للعصويين. الـ عند تماس الخلية LTC مع الخلية المصابة تتعرف عليها تعرفا مزدوجا. تحتوي الخلية LTC على حويصلات البرفورين وبعد تعرفها على الخلية المصابة تحرر محتوياتها من جزيئات البرفورين التي تهاجم غشاء الخلية المصابة بإحداث ثقب على مستواها تؤدي إلى انحلالها وموتها. الاستنتاج: تهاجم الخلية LTC الخلية المصابة بعد التعرف المزدوج عن طريق جزيئات البرفورين.	التمرين الثاني الجزء الأول
	0.5	- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل منحنيي تغيرات نسبة الـ Cr^{51} المحرر من طرف الخلايا المصابة بدلالة نسبة الخلايا LTC عند طفل سليم وآخر مصاب حيث نلاحظ: في وجود نسبة منخفضة من الخلايا (س) كانت نسبة الـ Cr^{51} المحرر من طرف الخلايا المصابة منخفضة عند الطفلين السليم والمصاب. ومع زيادة نسبة الخلايا (س) نلاحظ زيادة سريعة في نسبة الكروم المحرر عند الطفل السليم وزيادة بطيئة في نسبة الكروم المحرر عند الطفل المصاب.	
	0.5	- الاستنتاج: استهداف الخلايا المصابة وتخريبها من طرف LTC يكون ضعيفا عند الأطفال المصابين بـ HLH.	
	0.5	- الفرضيتان المقترحتان: العجز المناعي وإفلات الخلايا المصابة راجع إلى وجود: 1- خلل في تعرف (التعرف المزدوج) الخلايا LTC على الخلايا المصابة. 2- خلل في آلية تخريب (برفورين) الخلايا LTC للخلايا المصابة.	
	01		

- الجزء الثاني:

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: يمثل رسم تخطيطي لبعض مراحل تركيب بروتين البرفورين حيث:
- يكون البرفورين المركب من طرف الـ LTC في الحوصلات غير نشط.

- بعد حدوث التعرف المزدوج (بفضل التكامل البنيوي بين مستقبلاتها TCR ومعد HLAI – بيبتيدي مستضدي) يتدخل إنزيم الكاتبسين الذي يحول البرفورين غير النشط إلى برفورين نشط.

- يحرر البرفورين النشط مع الإنزيم اتجاه الخلية المصابة ليحدث البرفورين تقويا لتخريبها.

الاستنتاج: يركب البرفورين في الـ LTC غير نشط ويحوله إنزيم الكاتبسين إلى برفورين نشط بعد التعرف على الخلية المصابة.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: يمثل نتائج متابعة فلورة الأجسام المضادة للبرفورين والكاتبسين لخلايا LTC مأخوذة من طفل سليم وآخر مصاب بالـ HLH:

في الوسط الحاوي على الـ LTC الطفل السليم: ظهور الفلورة الحمراء والخضراء راجع إلى تحرير البرفورين وارتباطه مع أجسامه المضادة المفلورة بالأحمر. وإلى تحرير الكاتبسين وارتباطه مع أجسامه المضادة المفلورة بالأخضر.

في الوسط الحاوي على الـ LTC الطفل المصاب: ظهور الفلورة الخضراء فقط راجع إلى تحرير الكاتبسين وارتباطه مع الأجسام المضادة له المفلورة بالأخضر دون تحرير البرفورين وبالتالي غياب الفلورة الحمراء.

الاستنتاج: خلايا الـ LTC لدى الطفل المصاب تحرر إنزيم الكاتبسين لكنها لا تحرر البرفورين.

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: يمثل جدول الشفرات الوراثية مع تتابع رموزات السلسلة غير المستنسخة لجزء من المورثة PRF1 المسؤولة عن تركيب البرفورين عند الطفل السليم والطفل المصاب حيث نلاحظ:

طفل سليم	47	48	49	50
السلسلة غير المستنسخة	TCA	CAG	TAT	CAC
تتابع الأحماض الأمينية	Ser	Glu	Tyr	His
طفل سليم	47	48	49	50
السلسلة غير المستنسخة	TCA	TAG	TAT	CAC
تتابع الأحماض الأمينية	Ser	Stp	-	-

- تشابه في تتابع النيكلويدات بين السلسلتين غير المستنسختين للطفل السليم والمصاب إلا على مستوى الرامزة رقم 48 حيث

عند الطفل السليم هي CAG أما عند المصاب فهي TAG.

- ترجمة السلسلتين غير المستنسختين أعطت النتائج الموضحة في الجدول التالي حيث نلاحظ استمرار تركيب الأحماض الأمينية

عن الطفل السليم وتوقف تركيبها عند الطفل المصاب عند

الرامزة الـ TAG التي تعبر عن رامزة توقف.

الاستنتاج: الطفل المصاب بالـ HLH مصاب بطفرة تؤدي إلى تركيب برفورين غير نشط غير مكتمل ذو بنية فراغية غير طبيعية.

- شرح سبب عجز الجهاز المناعي ومناقشة الفرضيتين:


تغير البنية الفراغية لبروتين البرفورين الغير نشط تعيق وتمنع عمل إنزيم الكاتبسين،

فيبقى البروتين الطافر الناتج غير وظيفي مما يؤدي إلى عدم إقصاء الخلايا المصابة عند الأطفال المصابين

بمرض الـ HLH مسببا بذلك عجز الجهاز المناعي وإفلات الخلايا المصابة من الجهاز المناعي.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2 التي تنص على وجود خلل في آلية تخريب (برفورين) الخلايا LTC للخلايا المصابة.

وينفي صحة الفرضية 1 التي تنص على وجود خلل في تعرف الـ LTC على الخلايا المصابة لأنه إذا كان خلل في التعرف فلا تتشكل الخلايا LTC أصلا فتشكلها يتطلب حدوث تعرف مزدوج للـ LTC على الخلايا المصابة.



مخطط تحصيلي يوضح مراحل الاستجابة المناعية الخلوية
عند الأطفال المصابين بـ HLH



العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	التمرين
مجموعة	مجزأة		
04	0.5	1- تعريف الذات: هي مجموعة الجزيئات الغشائية المتواجدة على أغشية خلايا كل فرد محددة وراثيا تكسب كل شخص هويته البيولوجية، منها أنظمة (CMH.ABO.Rh).	التمرين الأول
	0.5	تعريف اللاذات: مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية نوعية ضده قصد القضاء عليه.	
	0.25 8×	2- التعرف على البيانات المرقمة والمرحلة التي ينتمي إليها كل شكل: 1- مستضد (جسم غريب) 2- جسم مضاد 3- مؤشر CD8 4- TCR 5- ببتيد مستضدي 6- HLA1 7- حويصلات البرفورين 8- قنوات غشائية	
	0.5 2	الشكل (أ): مرحلة التنفيذ من الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية. الشكل (ب): مرحلة التنفيذ من الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية.	
03		3- النص العلمي:	
	01	تستجيب العضوية في حالة دخول مستضد بإنتاج بروتينات عالية التخصص نوعية ضد اللاذات تتمثل في الأجسام المضادة المميزة للاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية، وبروتين البرفورين نتيجة استجابة مناعية ذات وساطة خلوية. فكيف تقوم هذه البروتينات في إقصاء المستضد؟	
	0.25	<u>تنتج الخلايا البلازمية المتميزة عن الخلايا LB أجساما مضادة نوعية ضد المستضدات المختلفة لتشكل معقدات مناعية (جسم مضاد - مستضد) مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها، حيث تعمل الأجسام المضادة على منع انتشار وتكاثر المستضدات وعلى إبطال مفعولها، لكن هذه العملية غير كافية لإقصاء المستضد والقضاء عليه إذ تُبَع بظاهرة</u>	
	0.25	<u>بلعمة المعقدات المناعية من طرف الخلايا البالعة للقضاء نهائيا على المستضد.</u>	
	0.25	كما تلعب بروتينات أخرى تتمثل في <u>جزيئات البرفورين</u> دورا هاما في القضاء على	
	0.25	المستضدات داخلية المنشأ (الخلايا المصابة)، وذلك بعد إفرازها من طرف الخلايا LTC	
	0.25	مباشرة بعد عملية التعرف المزدوج على الخلايا المصابة، بحيث <u>تشكل جزيئات البرفورين</u>	
	0.25	<u>على غشاء الخلية المصابة قنوات غشائية تسمح بدخول الماء والشوارد مؤدية إلى حدوث</u>	
	0.25	<u>صدمة حلوية.</u>	
	0.25	يتم إقصاء اللاذات بتخريب الخلايا المصابة بالصدمة الحلوية أو بتشكيل معقدات مناعية والتخلص منها عن طريق ظاهرة البلعمة بتدخل البرفورين والأجسام المضادة على	
	0.5	التة الـ.	

الجزء الأول:

استغلال الوثيقة (1):

الشكل (أ): يمثل منحنيين بيانيين لتطور عدد الخلايا السرطانية والطبيعية في كل وسط بدلالة الزمن حيث نلاحظ:

عند اللحظة 0min يكون عدد الخلايا الطبيعية والسرطانية في كل وسط في حدود 2.25 خلية بالبلبون.

من الزمن 0 إلى 48min يزداد عدد الخلايا الطبيعية والسرطانية بمرور الزمن حتى يصل إلى 5 خلية بالبلبون أي تكاثر متمال للخلايا في بداية الزمن.

من الزمن 48 إلى 120min يستمر ارتفاع عدد الخلايا الطبيعية والسرطانية بمرور الزمن غير أن ارتفاع عدد الخلايا السرطانية يكون بشكل ملحوظ حتى يصل إلى 22.5 خلية بالبلبون في حين يكون ارتفاع عدد الخلايا الطبيعية بطيئا حتى يصل إلى 11 خلية بالبلبون ند نفس الزمن 120min.....

الاستنتاج: تتميز الخلايا السرطانية بتكاثر أسرع من الخلايا الطبيعية.....

الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لبنية EGFR البشري ومواقع الأحماض الأمينية في غشاء الخلية الرئوية ومجالاته ووائفها المختلفة حيث نلاحظ:

يتميز EGFR غير النشط بوجود متخصصة منها مجال خارج الغشاء الهيولي للخلية مكون من أحماض أمينية من الحمض الأميني 1 إلى 621 يلعب دور مستقبل نوعي لهرمون النمو EGF، ومجال داخل الغشاء الهيولي من الحمض الأميني 622 إلى 644 وقطعة مجاورة للغشاء الهيولي داخل الهيولي من الحمض الأميني 645 إلى 685 ومجال محفز للتيروزين كيناز مكون من 686 إلى 960 الذي يتميز بوجود موقع فسفرة التيروسين كيناز. حيث في وجود هرمون EGF الذي يرتبط تكامليا مع موقع تثبيته في مستوى المجال خارج الخلية من وحدتي EGFR مما يحفز ارتباطهما وتنشيط الـ EGFR، وفي وجود الـ ATP يحفز الـ EGFR فسفرة مجال التيروسين كيناز وتنشيطه مما يولد إشارات لتنشيط الـ ADN مما يسبب تنشيط نمو وتكاثر وتمايز خلايا الرئة وبالتالي تكاثرها.....

الاستنتاج: الـ EGFR يحفز تكاثر الخلايا بفسفرة أنزيم التيروسين كيناز في وجود الـ ATP تحت تأثير هرمون النمو EGF.....

• تبين تأثير الـ EGFR على تكاثر الخلايا.

الـ EGFR يحفز تكاثر الخلايا بفسفرة أنزيم التيروسين كيناز في وجود الـ ATP تحت تأثير هرمون النمو EGF نتيجة تنشيط تضاعف الـ ADN مما يسبب تكاثر الخلايا الطبيعية بشكل عادي أو تكاثر سريع للخلايا السرطانية.....

- صياغة الفرضية توضح سبب ظهور سرطان الرئة عند الانسان واقتراح طريقة علاجية للحد من تطوره.

- بما أن الخلايا الخلايا السرطانية تتميز بالتكاثر السريع وأن EGFR يحفز تكاثر الخلايا بفسفرة التيروسين كيناز في وجود ال EGF وتنشيط تضاعف ال ADN وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية:

الفرضية 1: خلل في بنية هرمون النمو EGF وبالتالي خلل في وظيفته مما قد يسبب تثبيته على EGFR والتحفيز المستمر لنشاط ال EGFR ما يؤدي إلى استمرار فسفرة التيروسين كيناز وتنشيط

مستمر لتضاعف ال ADN ومنه تكاثر عشوائي مستمر للخلايا السرطانية وتطور الورم السرطاني.

الفرضية 2: خلل في بنية ال EGFR وبالتالي خلل في وظيفته مما قد يسبب التحفيز المستمر لنشاط ال

EGFR باستمرار تبثت EGF ما يؤدي إلى استمرار فسفرة التيروسين كيناز وتنشيط مستمر لتضاعف ال ADN ومنه تكاثر عشوائي مستمر للخلايا السرطانية وتطور الورم السرطاني.

الفرضية 3: خلل في بنية مجال التيروسين كيناز وبالتالي خلل في وظيفته مما قد يسبب الفسفرة المستمرة للتيروسين كيناز وتنشيط مستمر لتضاعف ال ADN ومنه تكاثر عشوائي مستمر للخلايا السرطانية وتطور الورم السرطاني.....

- يمكن اقتراح الطريقة العلاجية للحد من تطور الورم السرطاني وذلك باستعمال جزيئات (أدوية) لتنشيط نشاط الجزيئات المسببة لتكاثر الخلايا السرطانية إما:

- ترتبط بال EGF أو EGFR فتمنع ارتباط EGF بال EGFR .

- أو ترتبط التيروسين كيناز وتمنع فسفرته وتنشط نشاطه.

ومنه الحد من تنشيط تضاعف ال ADN وبالتالي تراجع تطور الورم السرطاني واختفائه.....

- استغلال معطيات أشكال الوثيقة (2).

- الشكل (أ): يمثل قطعة من السلسلة غير المستنسخة من مورثة EGFR عند شخص سليم وآخر مصاب بسرطان الرئة المرفقة بجزء من قاموس الشفرة الوراثية:

- استخراج تنالي نكليوتيدات ال ARNm وتنالي الأحماض الأمينية لل EGFR:

الشخص السليم

رقم الثلاثيات (رامزات)	856	857	858	859	860	861	862	863
سلسلة ال ADN غير المستنسخة	TTT	GGG	CTG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT
سلسلة ARNm	UUU	GGG	CUG	GCC	AAA	CUG	CUG	GGU
تنالي الأحماض الأمينية لل EGFR	Phe	Gly	Leu	Ala	Lys	Leu	Leu	Gly

الشخص المصاب

رقم الثلاثيات (رامزات)	856	857	858	859	860	861	862	863
سلسلة ال ADN غير المستنسخة	TTT	GGG	CGG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT
سلسلة ARNm	UUU	GGG	CGG	GCC	AAA	CUG	CUG	GGU
تنالي الأحماض الأمينية لل EGFR	Phe	Gly	Arg	Ala	Lys	Leu	Leu	Gly

- المقارنة: عند المقارنة بين تنالي نكليوتيدات سلسلة ال ADN غير المستنسخة لمورثة EGFR للشخصين

المصاب والسليم نجد تشابه في تنالي جميع النكليوتيدات ما عدى الاختلاف في النكليوتيدة T رقم 2 من الرامزة 858 لسلسلة ADN غير المستنسخة عند الشخص السليم التي تم استبدالها بالنكليوتيدة G عند الشخص المصاب وتغي رامزة ال Leu إلى رامزة Arg على مستوى ARNm.

ومن جهة أخرى عند المقارنة بين تنالي الأحماض الأمينية المشكلة لل EGFR عند الشخصين نجد تشابه في تنالي جميع الأحماض الأمينية ما عدى استبدال الحمض الأميني Leu رقم 858 في ال EGFR الطبيعي عند الشخص السليم بال Arg في ال egfr الطافر عند الشخص المصاب.....

الجزء الثالث: المخطط العلاقة بين النمط الظاهري و المورثي و اظهار موقع التأثير .