

المدة: 4 ساعات

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول (4 نقاط)

يجتوي كيس على 5 كريات مرقمة بـ: 1؛ 1؛ 0؛ (-1) و 5 كرات سوداء مرقمة بـ: 0؛ 1؛ 1؛ (-1). الكرات متماثلة لا نفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس. I (نعتبر الحوادث الآتية :

A : " الكرات الثلاثة المسحوبة من نفس اللون "

B : " الحصول على اللونين الأبيض والأسود "

C : " مجموع ارقام الكرات الثلاثة يساوي الصفر "

1 (أحسب احتمال الحادثة A

2 (بين كل مما يلي : $P(B) = \frac{5}{6}$ ؛ $P(C) = \frac{31}{120}$ ؛ $P(A \cap C) = \frac{7}{120}$

3 (علما أنّ مجموع الكرات الثلاثة يساوي صفر ؛ ما هو احتمال أن تكون الكرات الثلاثة من نفس اللون.

II (ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع أرقام الكرات الثلاثة المسحوبة.

1 - (عين قيم المتغير العشوائي X .

2 - (عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X ثمّ احسب امله الرياضيائي .

التمرين الثاني (4 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_n = \int_n^{n+1} e^{2-x} dx$

1 (أ - (تحقق أنّ $u_0 = e^2 - e$ ثمّ اثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n > 0$

ب - (أكتب بدلالة n .

2 (أ - (أحسب بدلالة n الفرق $(u_{n+1} - u_n)$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب - (استنتج أنّ (u_n) متتالية متقاربة .

3 (برهن أنّ (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{e}$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4 (أ - (أحسب المجموع S_n حيث : $S_n = e^{1445} u_{1445} + e^{1446} u_{1446} + \dots + e^{2024} u_{2024}$

ب - (أحسب بدلالة n الجداء P_n ثم استنتج المجموع T_n حيث :

$$P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n \quad \text{و} \quad T_n = \ln u_0 + \ln u_1 + \dots + \ln u_n$$

التمرين الثالث (5 نقاط)

- نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) الآتية : $4x - 9y = 5$.
- (1 -) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 8[9]$ ثم استنتج حلول المعادلة (E).
 - (2 -) α عدد طبيعي يكتب 43 في نظام تعداد اساسه x ويكتب 98 في نظام تعداد اساسه y حيث : $x \leq 35$ و $y \leq 18$.
 - عين القيم الممكنة لـ x و y ثم القيم الممكنة للعدد α في النظام العشري .
 - (3 - أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 9 .
 - (ب) عين كل الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ حلولا للمعادلة (E') الآتية : $2011^x + 4^y + 7 \equiv 0[9]$.
 - (4) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n العددين a و b حيث : $a = 9n + 8$ و $b = 4n + 3$ و $\text{pgcd}(a; b) = d$.
 - (أ) ما هي القيم الممكنة لـ d ؟
 - (ب) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $d = 5$.
 - (5) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $A = 9n^2 + 17n + 8$ و $B = 4n^2 + 7n + 3$.
 - (أ) بين أن العدد $(n+1)$ قاسم مشترك لكل من العددين A و B .
 - (ب) استنتج حسب قيم n ؛ القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين A و B .

التمرين الرابع (7 نقاط)

- (I) نعتبر الدالة g_n المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g_n(x) = n(x+2) + e^{x+1}$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم
- (1) ادرس تغيرات الدالة g_n ثم شكل جدلا تغيراتها.
 - (2) بين أن المعادلة $g_n(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_n وأن $-3 < \alpha_n < -2$.
 - (3) استنتج إشارة $g_n(x)$ على $\mathbb{R}$.
- (II) $f_n(x)$ هي الدالة المعرفة على المجال $]-\infty; +\infty[$ بـ : $f_n(x) = \frac{x+1}{1+ne^{-x-1}}$ وليكن (C_{f_n}) منحنيا البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$.
- (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ ثم ؛ بيانيا فسر النتيجة.
 - (2 - أ) اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'_n(x) = \frac{e^{-x-1} [g_n(x)]}{(1+ne^{-x-1})}$.
 - (3) بين أن $f_n(\alpha) = \alpha_n + 2$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f_n .
 - (4 - أ) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x + 1$ مستقيم مقارب لـ (C_{f_n}) في جوار $+\infty$.
 - (ب) ادرس وضعية المنحني بالنسبة للمستقيم (Δ) .
 - (5 - أ) أثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}^*$:
- $$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{(-x-1)e^{-x-1}}{[1+(1+n)e^{-x-1}](1+ne^{-x-1})}$$
- (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_n) و (C_{n+1}) .
 - (6) أنشئ (Δ) ؛ (C_1) و (C_2) في المعلم السابق .

انتهى الموضوع

الحل المفصل

او كرة تحمل الرقم 1 و كرة تحمل العدد (-1) و كرة تحمل الرقم 0.

عدد عناصر C هو :

$$C_3^3 + (C_2^1 \times C_5^1 \times C_3^1) = 1 + 30 = 31$$

$$P(C) = \frac{31}{120} \text{ إذا :}$$

◀ الحادثة $A \cap C$ هي :

"الحصول على 3 كرات من نفس اللون ومجموع أرقامها يساوي 0" يجب إذا:

* سحب 3 كرات بيضاء وتحمل الأرقام: (-1); 1; 0:

$$C_1^1 \times C_1^1 \times C_3^1 = 3 \text{ ب :}$$

أو

سحب 3 كرات سوداء تحمل الأرقام: (-1); 1; 0:

$$C_1^1 \times C_2^1 \times C_2^1 = 4 \text{ ب :}$$

عدد عناصر $A \cap C$ هو إذا : $3 + 4 = 7$.

$$P(A \cap C) = \frac{7}{120} \text{ ومنه :}$$

(3) علما أنّ مجموع الكرات الثلاثة يساوي صفر ؛ نعيّن احتمال أن تكون الكرات الثلاثة من نفس اللون.

نريد حساب احتمال الحادثة C علما أن الحادثة

A قد وقعت أي $P_A(C)$.

$$\begin{aligned} P_A(C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(A)} \\ &= \frac{7}{120} \times \frac{120}{31} \text{ لدينا :} \\ &= \frac{7}{31} \end{aligned}$$

(II - 1) نعين قيم المتغير العشوائي X .

القيم الممكنة للمتغير العشوائي X هي قيم المجموعة $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

◀ $P(X = -2)$ وهو احتما وقوع الحادثة :

"الحصول على 3 كرات مجموع أرقامها -2"

أي هو الحادثة $\{-1, -1, 0\}$

$$P(X = -2) = \frac{C_2^2 \times C_3^1}{120} = \frac{3}{120}$$

التمرين الأول :

B	B	B	B	B	N	N	N	N	N
-1	0	1	1	1	-1	1	0	0	1

◀ لاحظ انه يمكننا أن نميز بين الكريات :

* إما باللون : 5 بيضاء (B) و 5 سوداء (N).

* * إما بالأرقام :

- 3 كريات تحمل الرقم 0

- كرتان تحملان العدد (-1)

- 5 كريات تحمل الرقم 1

◀ كل سحب عبارة عن توفيق ذات 3 عناصر من مجموعة 10 عناصر.

العدد الكلي لهذه السحبات هو $C_{10}^3 = 120$.

(1) حساب احتمال الحادثة A .

الحادثة تقع A إذا تم سحب 3 كرات بيضاء من بين 5 أو 3 كرات سوداء من بين 5 ايضا.

عدد عناصر A هو إذا : $C_5^3 + C_5^3 = 20$.

$$P(A) = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} \text{ وعليه :}$$

(2) نبين كل مما يلي : $P(B) = \frac{5}{6}$ ؛

$$P(A \cap C) = \frac{7}{120} \text{ ؛ } P(C) = \frac{31}{120}$$

◀ عناصر B من الشكل : $\{B, N, N\}$ أو

$\{B, B, N\}$.

يعني تتحقق الحادثة B إذا سحبنا كرة بيضاء وكرتين سوداوين أو سحبنا كرتين بيضاوين و كرة سوداء.

عدد عناصر B أي عدد الحالات الملائمة هو :

$$C_5^1 \times C_5^2 + C_5^2 \times C_5^1 = 100$$

$$P(B) = \frac{100}{120} = \frac{5}{6} \text{ وعليه :}$$

◀ عناصر C من الشكل : $\{0, 0, 0\}$ أو $\{-1, 1, 0\}$

يجب في هذه الحالة سحب 3 كرات تحمل الرقم 0

$$\{-1, -1, 1\} \text{ أو } \{-1, 0, 0\} : P(X = -1) \blacktriangleleft$$

$$P(X = -1) = \frac{(C_2^1 \times C_3^2) + (C_2^1 \times C_5^1)}{120} = \frac{11}{120}$$

$$\{-1, 1, 0\} \text{ أو } \{0, 0, 0\} : P(X = 0) \blacktriangleleft$$

$$P(X = 0) = \frac{C_3^3 + (C_2^1 \times C_5^1 \times C_3^1)}{120} = \frac{31}{120}$$

$$\{1, 1, -1\} \text{ أو } \{1, 0, 0\} : P(X = 1) \blacktriangleleft$$

$$P(X = 1) = \frac{(C_5^1 \times C_3^2) + (C_5^2 \times C_3^1)}{120} = \frac{35}{120}$$

$$\{1, 1, 0\} : P(X = 2) \blacktriangleleft$$

$$P(X = 2) = \frac{C_5^2 \times C_3^1}{120} = \frac{30}{120}$$

$$\{1, 1, 1\} : P(X = 3) \blacktriangleleft$$

$$P(X = 3) = \frac{C_5^3}{120} = \frac{10}{120}$$

قانون المتغير العشوائي X ملخص في الجدول :

القيم x_i	-2	-1	0	1	2	3	$\sum$
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{120}$	$\frac{11}{120}$	$\frac{31}{120}$	$\frac{35}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{10}{120}$	1

وفي هذه الحالة :

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 x_i P(X = x_i) = -\frac{6}{120} - \frac{11}{120} + 0 + \frac{35}{120} + \frac{60}{120} + \frac{30}{120} = 9$$

التمرين الثاني :

$$u_n = \int_n^{n+1} e^{2-x} dx$$

$$(1 - أ) * \text{ نتحقق أن } u_0 = e^2 - e \text{ ثم نثبت أنه}$$

$$\text{من أجل كل عدد طبيعي } n : u_n > 0$$

$$\text{الدالة } x \mapsto e^{2-x} \text{ تقبل كإحدى دوالها الأصلية الدالة } x \mapsto (-e^{2-x})$$

ومنه :

$$u_0 = (-e^1) - (-e^2) \text{ أي } u_0 = \int_0^1 e^{2-x} dx = [-e^{2-x}]_0^1 = e^2 - e$$

** اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_n > 0$$

الدالة $x \mapsto e^{2-x}$ دالة موجبة تماما على $\mathbb{R}$ وبالتالي موجبة تماما على المجال $[n; n+1]$.

$$\text{وعليه : } \int_n^{n+1} e^{2-x} dx > 0 \text{ أي}$$

$$\text{من أجل كل عدد طبيعي } n : u_n > 0$$

(ب -) نكتب u_n بدلالة n .

$$\text{من أجل كل عدد طبيعي } n : u_n = \int_n^{n+1} e^{2-x} dx$$

$$= [-e^{2-x}]_n^{n+1}$$

$$= (-e^{2-n-1}) - (-e^{2-n})$$

$$\text{إذا من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N} : u_n = e^{2-n} - e^{1-n}$$

$$\text{أي من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N} : u_n = e^{1-n} (e - 1)$$

(2 - أ) حساب بدلالة n الفرق $(u_{n+1} - u_n)$ ثم

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

بالرجوع إلى عبارة الحد العام للمتتالية نجد :

$$u_{n+1} - u_n = e^{1-n-1} (e - 1) - e^{1-n} (e - 1)$$

$$= (e - 1)(e^{-n} - e^{1-n})$$

$$= (e - 1)e^{-n} (1 - e)$$

$$\text{أي } u_{n+1} - u_n = -(e - 1)^2 e^{-n} \text{ وعليه :}$$

$$\text{من أجا كل عدد طبيعي } n : u_{n+1} - u_n < 0$$

المتتالية (u_n) متناقصة تماما في $\mathbb{N}$.

(ب -) استنتاج أن (u_n) متتالية متقاربة .

المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل ومتناقصة

تماما فهي إذا متقاربة.

(3) نبرهن أن (u_n) متتالية هندسية أساسها

$$q = \frac{1}{e} \text{ ثم احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$$

◀ نبرهن ما يلي :

$$\text{من أجل كل عدد طبيعي } n : u_{n+1} = \frac{1}{e} u_n$$

$$u_{n+1} = e^{1-n} - e^{-n}$$

$$\text{لدينا : } \frac{1}{e} \times e(e^{1-n} - e^{-n})$$

$$1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

في هذه الحالة :

$$P_n = u_0^{n+1} \times q^{\frac{n(n+1)}{2}} \text{ وبالتعويض يكون :}$$

$$P_n = (e^2 - e)^{n+1} \left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}} = \left[(e^2 - e) \left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{n}{2}} \right]^{n+1}$$

$$T_n = \ln u_0 + \ln u_1 + \dots + \ln u_n$$

$$= \ln(u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n)$$

$$T_n = (n+1) \ln \left[(e^2 - e) \left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{n}{2}} \right] \text{ أي } T_n = \ln(P_n)$$

التمرين الثالث :

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) الآتية :

$$4x - 9y = 5 \quad \dots (E)$$

1 -) نبين أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاً للمعادلة

(E) فإن $x \equiv 8[9]$ ثم استنتج حلول المعادلة (E)

◀ $(x; y)$ حل للمعادلة (E) معناه $4x = 9y + 5$

$$4x \equiv 5[9] \text{ معناه}$$

$$7 \times 4x \equiv 7 \times 5[9] \text{ يكون}$$

$$28x \equiv 35[9] \text{ أي}$$

$$\text{وبما أن } 28 \equiv 1[9] \text{ و } 35 \equiv 8[9] \text{ نجد } x \equiv 8[9]$$

◀ لدينا (E) تكافئ $9y = 4x - 5 \dots (1)$

بما أن $x \equiv 8[9]$ معناه $x = 9k + 8$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

بتعويض x بقيمته في (1) نجد :

$$9y = 9(4k + 3) - 5$$

$$\text{وبالتالي } y = 4k + 3$$

إذا كانت S هي مجموعة حلول (E) فإن :

$$S = \{(9k + 8; 4k + 3) : k \in \mathbb{Z}\}$$

2 -) نعين القيم الممكنة لـ x و y ثم القيم

الممكنة للعدد α في النظام العشري .

لدينا ما يلي :

$$\alpha = \overline{43}_{[x]} = 3 + 4x \text{ مع } 0 \leq x \leq 35 \dots (1)$$

$$\alpha = \overline{98}_{[y]} = 8 + 9y \text{ مع } 0 \leq y \leq 18 \dots (2)$$

من (1) و (2) ينتج : $4x - 9y = 5$

$$u_{n+1} = \frac{1}{e} (e^{2-n} - e^{1-n})$$

$$= \frac{1}{e} u_n$$

إذا : (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{e}$

◀ المتتالية (u_n) هندسية أساسها $\frac{1}{e} < 1$

فهي إذا متقاربة نحو 0

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4 -) حساب المجموع S_n حيث :

$$S_n = e^{1445} u_{1445} + e^{1446} u_{1446} + \dots + e^{2024} u_{2024}$$

لاحظ ما يلي :

$$e^1 u_1 + e^2 u_2 + \dots + e^{1444} u_{1444} + e^{1445} u_{1445} + \dots + e^{2004} u_{2004}$$

حدا 1444 2004

S_n هو إذا مجموع (560) $(2004 - 1444)$ حدا.

$$e^n u_n = e^n (e^{2-n} - e^{1-n})$$

$$= e^2 - e$$

في هذه الحالة :

$$S_n = (e^2 - e) + (e^2 - e) + \dots + (e^2 - e)$$

S_n هو مجموع 560 حدا مساويا لـ $(e^2 - e)$ ، وعليه :

$$S_n = 560(e^2 - e)$$

ب -) نحسب بدلالة n الجداء P_n ثم استنتج

المجموع T_n حيث : $P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$

$$T_n = \ln u_0 + \ln u_1 + \dots + \ln u_n$$

◀ P_n هو جداء $(n+1)$ حدا من المتتالية الهندسية

$$(u_n)$$

بما أن $u_n = u_0 \times q^n$ ينتج :

$$P_n = u_0 (u_0 q) (u_0 q^2) \times \dots \times (u_0 q^n)$$

$$= (u_0 \times u_0 \times \dots \times u_0) \times (q^{1+2+3+\dots+n})$$

(عامل $(n+1)$)

لدينا :

$$u_0 \times u_0 \times \dots \times u_0 = u_0^{n+1}$$

من جهة أخرى :

$(1+2+3+\dots+n)$ هو مجموع n حدا متعاقبة من

متتالية الأعداد الطبيعية . ومنه :

وعليه الثنائية $(x; y)$ هي حل للمعادلة (E) مع الشروط المذكورة أعلاه.

$$k \in \mathbb{N} : \begin{cases} -8 \leq 9k \leq 27 \\ -3 \leq 4k \leq 15 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} 0 \leq 9k+8 \leq 35 \\ 0 \leq 4k+3 \leq 25 \end{cases} \text{ يكون}$$

$$\text{وبالتالي : } \begin{cases} -\frac{8}{9} \leq k \leq 3 \\ -\frac{3}{4} \leq k \leq \frac{15}{4} \end{cases} \text{ وبما أن } k \text{ عدد طبيعي}$$

$$\text{نجد : } k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

في هذه الحالة القيم الممكنة للعددين x و y وبعد تعويض k يكون :

$$(x; y) \in \{(8; 3), (17; 7), (26; 11), (35; 15)\}.$$

اما قيم α نحصل عليها بتعويض x أو y بقيمته.

$$\alpha \in \{15, 71, 107, 143\}$$

(3 - أ) ندرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 9.

$$\text{لدينا: } 4^0 \equiv 1[9] ; 4^1 \equiv 4[9] ; 4^2 \equiv 7[9] ; 4^3 \equiv 1[9] ; 4^k \equiv 1[9] : k \text{ عدد طبيعي}$$

وهذا معناه :

بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 9 تشكل متتالية دورية ودورها هو 9

هذه البواقي ملخصة في الجدول الموالي :

قيم n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
البواقي الممكنة	1	4	7

(ب - نعين كل الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ حلولا للمعادلة (E') الآتية : $2011^x + 4^y + 7 \equiv 0[9]$.

$$\text{لدينا } 4[9] \equiv 2011$$

في هذه الحالة :

$$(E') \text{ تكافئ } 4^x + 4^y \equiv -7[9] \text{ أي } 4^x + 4^y + 7 \equiv 0[9]$$

$$\text{وبما أن } 2[9] \equiv -7 \text{ يكون } 4^x + 4^y \equiv 2[9] \dots (1)$$

بما أن $(x; y)$ حل للمعادلة (E)

$$(1) \text{ تكافئ } 4^{9k+8} + 4^{4k+3} \equiv 2[9] \text{ و } k \in \mathbb{N}$$

$$\text{أي } 4^2 \times 4^{3(3k+2)} + 4^k \times 4^{3(k+1)} \equiv 2[9]$$

$$\text{أي } 4^2 + 4^k \equiv 2[9]$$

$$4^K \equiv 7[9] \text{ إذا } 4^K + 7 \equiv 2[9] \text{ ومنه } 4^K \equiv -5[9]$$

$$\text{أي } 4^K \equiv 4[9]$$

وحسب الجدول $K = 3m+1 / m \in \mathbb{N}$. وفي هذه الحالة $(x; y) = (27m+17; 12p+7)$.

(4 - أ) تعيين القيم الممكنة لـ d

$$\text{لدينا } \begin{cases} d|a \\ d|b \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} d|9n+8 \\ d|4n+3 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} d|4(9n+8) \\ d|9(4n+3) \end{cases}$$

$$\text{يكون } d | [4(9n+8) - 9(4n+3)]$$

$$\text{ومنه } d|5$$

$$d \in \{1, 5\} \text{ معناه } d|5$$

(ب - نعين مجموعة قيم العدد الطبيعي n

التي من أجلها يكون $d=5$.

إذا كان $p.g.c.d(a; b) = 5$ فهذا يعني "

$$\text{ومنه } \begin{cases} 9n+8 \equiv 0[5] \\ 4n+3 \equiv 0[5] \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} a \equiv 0[5] \\ b \equiv 0[5] \end{cases}$$

$$4n+3 \equiv 0[5]$$

$$4n \equiv 2[5] \text{ ينتج}$$

$$\text{أي } 5 \mid 16n \dots (2) \text{ لكن}$$

$$\begin{cases} 16 \equiv 1[5] \\ 8 \equiv 3[5] \end{cases} \text{ ومن (2) نجد } n \equiv 3[5]$$

قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $d=5$.

هي $n=5p+3$ مع $p \in \mathbb{N}$

(5- أ) نبين أن العدد $(n+1)$ قاسم مشترك

لكل من العددين A و B .

$$\text{لدينا } A = (n+1)(9n+8) \text{ أي } (n+1) | A$$

$$B = (n+1)(4n+3) \text{ أي } (n+1) | B$$

مما سبق : $(n+1)$ قاسم مشترك للعددين A و B

(ب - استنتاج حسب قيم n : القيم الممكنة

للقاسم المشترك الأكبر للعددين A و B .

لدينا :

$$p.g.c.d(A; B) = p.g.c.d[(n+1)(9n+8); (n+1)(4n+3)]$$

$$= (n+3) p.g.c.d(4n+3; 9n+8)$$

وحسب ما سبق :

$$p.g.c.d(9n+8; 4n+3) = d \text{ حيث } d=1 \text{ أو } d=5$$

$$\text{وجدنا : من أجل } n=5p+3; p \in \mathbb{N} \text{ يكون } d=5$$

وعليه :

$$\leftarrow \text{من أجل } n=5p+3 \text{ يكون}$$

$$p.g.c.d(A; B) = 5(n+1)$$

$$\leftarrow \text{من أجل } n \neq 5p+3$$

$$\text{يكون } p.g.c.d(a; b) = n+1$$

التمرين الرابع

I (1- دراسة تغيرات الدالة g_n ثم تشكيل جدول تغيراتها.

حساب النهايات

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x) = -\infty ; \begin{cases} n(x+2) \rightarrow -\infty \\ e^{x+1} \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty ; \begin{cases} n(x+2) \rightarrow +\infty \\ e^{x+1} \rightarrow +\infty \end{cases}$$

الدالة المشتقة وإشارتها

g_n دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا :

$$g'_n(x) = n + e^{x+1}$$

من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$

$$g'_n(x) > 0$$

الدالة g_n هي إذا دالة متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

جدول التغيرات :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g'_n(x)$		+	
$g_n(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

2 (نبين أن المعادلة $g_n(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا

α_n وأن $-3 < \alpha_n < -2$.

الدالة g_n مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ وتأخذ

قيمها في $\mathbb{R}$ و $0 \in \mathbb{R}$. وبالتالي :

المعادلة $g_n(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α_n في $\mathbb{R}$

لدينا :

$$g_n(-2) = e^{-1} \text{ و } g_n(\alpha_n) = 0 ; g_n(-3) = -n + e^{-2}$$

$$g_n(-3) < g_n(\alpha_n) < g_n(-2)$$

وبما أن g_n متزايدة تماما فهي تحفظ الترتيب فإن :

$$-3 < \alpha_n < -2$$

3 (استنتاج إشارة $g_n(x)$ على $\mathbb{R}$.

إشارة $g_n(x)$ كما يلي :

x	$-\infty$	α_n	$+\infty$
$g'_n(x)$	-	0	+

II (1) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ ثم :

بيانيا فسر النتيجة.

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = ? \begin{cases} (x+1) \rightarrow -\infty \\ (1+ne^{-x-1}) \rightarrow +\infty \end{cases}$$

حالة عدم التعيين من الشكل $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

نزيل هذه الحالة .

$$f_n(x) = \frac{x+1}{e^{-x}(e^x + e^{-1})} = \frac{xe^x + e^x}{e^x + e^{-1}}$$

بالانتقال إلى النهاية نجد :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x + e^x}{e^x + e^{-1}} = 0 ; (xe^x \rightarrow 0; e^x \rightarrow 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty ; ((x+1) \rightarrow +\infty; e^{-x-1} \rightarrow 0)$$

* بيانيا المستقيم الذي معادلته $y = 0$ أي حامل

محور الفواصل هو مستقيم مقارب لـ (C_{f_n}) .

* أما في جوار $(+\infty)$ ؛ يحتمل وجود مستقيم

مقارب مائل .

2 (أ -) إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f'_n(x) = \frac{e^{-x-1}[g_n(x)]}{(1+ne^{-x-1})^2}$$

لدينا :

$$f'_n(x) = \frac{(1+ne^{-x-1}) - (-ne^{-x-1})(x+1)}{(1+ne^{-x-1})^2}$$

$$= \frac{1+2ne^{-x-1}+nxe^{-x-1}}{(1+ne^{-x-1})^2}$$

$$= \frac{1+ne^{-x-1}(x+2)}{(1+ne^{-x-1})^2}$$

$$= \frac{e^{-x-1}(e^{x+1}+n(x+2))}{(1+ne^{-x-1})}$$

$$f'_n(x) = \frac{e^{-x-1}[g_n(x)]}{(1+ne^{-x-1})^2} \text{ اي}$$

- ب (استنتاج اتجاه تغير الدالة f_n

نلاحظ أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ؛ إشارة f_n من

إشارة g_n . وهذا يعني

◀ f_n متناقصة تماما على المجال $]-\infty; \alpha_n]$

◀ f_n متزايدة تماما على المجال $[\alpha_n; +\infty[$

◀ جدول تغيرات الدالة f_n يكون كما يلي :

x	$-\infty$	α_n	$+\infty$
$f'_n(x)$	-	0	+
$f_n(x)$			

3) نبين أن $f_n(\alpha) = \alpha_n + 2$ م شكل جدول

تغيرات الدالة f_n .

لدينا :

$$\begin{aligned} f_n(\alpha_n) - (\alpha_n + 2) &= \frac{\alpha_n + 1}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} - (\alpha_n + 2) \\ &= \frac{\alpha_n + 1 - (\alpha_n + 2)(1 + ne^{-\alpha_n - 1})}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_n(\alpha_n) &= \frac{\alpha_n + 1 - \alpha_n - n\alpha_n e^{-\alpha_n - 1} - 2 - 2ne^{-\alpha_n - 1}}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} \\ &= \frac{-1 - ne^{-\alpha_n - 1}(\alpha_n + 2)}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} \\ &= \frac{-e^{\alpha_n + 1}[e^{-\alpha_n - 1} + n(\alpha_n + 2)]}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} \end{aligned}$$

$$f_n(\alpha_n) - (\alpha_n + 2) = \frac{-e^{\alpha_n + 1} \cdot g_n(\alpha_n)}{1 + ne^{-\alpha_n - 1}} \text{ اي}$$

وبما أن $g_n(\alpha_n) = 0$ ينتج $f_n(\alpha_n) = \alpha_n + 2$

4 - أ) نبين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته

$y = x + 1$ مستقيم مقارب لـ (C_{f_n}) في جوار $+\infty$.

$$f_n(x) - (x + 1) = \frac{-ne^{-x-1}(x + 1)}{1 + ne^{-x-1}}$$

$$\text{لدينا : } \frac{x + 1}{1 + ne^{-x-1}} = -n \frac{e^{x+1}}{1 + ne^{-x-1}}$$

وبالانتقال إلى النهاية يكون :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_n(x) - (x + 1)] = 0 ; \begin{cases} \frac{x + 1}{e^{x+1}} \rightarrow 0 \\ (1 + ne^{-x-1}) \rightarrow 1 \end{cases}$$

وبالتالي المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x + 1$


مستقيم مقارب لـ (C_{f_n}) في جوار $+\infty$.

- ب) ندرس وضعية المنحني بالنسبة

للمستقيم (Δ) .

إشارة الفرق $[f_n(x) - (x + 1)]$ من إشارة $-n(x + 1)$

هذه الإشارة كما يلي (لكون $n > 0$)



وبالتالي :

◀ (C_{f_n}) أعلى (Δ) في المجال $]-\infty; -1[$

◀ (C_{f_n}) أسفل (Δ) في المجال $]-1; +\infty[$

◀ (C_{f_n}) يقطع (Δ) في النقطة $(-1; 0)$

5 - أ) نثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}^*$:


$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{(-x-1)e^{-x-1}}{[1 + (1+n)e^{-x-1}](1 + ne^{-x-1})}$$

لدينا :

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) - f_n(x) &= \frac{(x+1)[(1 + ne^{-x-1}) - (1 + (n+1)e^{-x-1})]}{[1 + (n+1)e^{-x-1}](1 + ne^{-x-1})} \\ &= \frac{(x+1)(1 + ne^{-x-1} - 1 - ne^{-x-1}e^{-x-1})}{[1 + (n+1)e^{-x-1}](1 + ne^{-x-1})} \\ &= \frac{-(x+1)e^{-x-1}}{[1 + (n+1)e^{-x-1}](1 + ne^{-x-1})} \end{aligned}$$

- ب) درس الوضع النسبي للمنحنيين (C_n) و (C_{n+1}) .

واضح أن إشارة الفرق $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ كما يلي :



◀ $(C_{f_{n+1}})$ و (C_{f_n}) يشتركان في النقطة $A(-1; 0)$.

◀ $(C_{f_{n+1}})$ أعلى (C_{f_n}) في المجال $]-\infty; -1[$

◀ $(C_{f_{n+1}})$ أسفل (C_{f_n}) في المجال $]-1; +\infty[$

6 - ننشئ (Δ) : (C_1) و (C_2) في المعلم السابق .

◀ (Δ) يمر بالنقطتين ذات الحداثتين $(0; 1)$ و $(-1; 0)$

◀ معادلة (C_{f_1}) هي : $y = \frac{x+1}{1 + e^{-x-1}}$

◀ معادلة (C_{f_2}) هي : $y = \frac{x+1}{1 + 2e^{-x-1}}$

