


اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الطبيعية

النمرين الأول: 05 نقاط - يستند نشاط **التعبير المورثي** على توظيف عضيات خلوية تؤمن سيرورة جملة من

الآليات تسمح بالتصنيع الحيوي لجزيئات عضوية **متخصصة وظيفيا** .

I- تمثل **الوثيقة 1** - نتائج تجريبية لخلية حية تم معاملتها بقاعدة اليوريددين المشع بينما تمثل

الوثيقة 2 - تسلسل القواعد الأزوتية لدعمات وراثية مختلفة .



أ: جزء من بداية إحدى سلسلتي مورثة [ع]

CGATTCTCTACTTCGCCATATAAAAACTACC

ب: جزء من نهاية العنصر 6

UCUUCUACACUCCUAAGACU

↑
الريبونوكلييدة الأخيرة

الوثيقة - 2 -

1- تعرف على البيانات المرقمة . من الوثيقة (1)

2- بناء على معطيات الوثيقة 1- قدم تفسيراً منطقياً يترجم العلاقة بين الشكلين 1 و 2 والعنصرين 5 و 6 .

مبرزاً دور العنصر 6 .

3- معتمداً على معطيات الشكلين أ و ب من الوثيقة - 2- حدد ناتج التعبير المورثي في كل حالة .


II- قام العالمان **Philipe و Nirenberg** بتحضير أوساط يتضمن كل منها مكونات خلوية مختلفة وفي كل

مرة نقوم بترشيح محتوى الخليط بعد إعطائه الوقت الكافي عبر غشاء مكون أساساً من **نترات السليلوز**

(غشاء نفوذ لا يسمح بعبور الريبوزومات) ثم نقوم بالغسيل .

- تمثل **الوثيقة 3** - قياسات النشاط الإشعاعي المسجلة على مستوى غشاء نترات السليلوز في مستوى

أربعة (4) أوساط مختلفة .



الوثيقة - 3 -

- الوسط (1) : ريبوزومات + متعدد يوراسيل (U12) + $ARNt_{phe}^*$

- الوسط (2) : ريبوزومات + متعدد يوراسيل (12U) .

- الوسط (3) : ريبوزومات + متعدد يوراسيل (3U) + $ARNt_{phe}^*$

- الوسط (4) : ريبوزومات + متعدد يوراسيل (2U) + $ARNt_{phe}^*$

1- حلل وفسر تطور النشاط الإشعاعي ضمن أوساط الزرع .

2- ما هي المعلومات المستخلصة من خلال هذه الدراسة .

$ARNt_{phe}^*$: حمض نووي ريبوي ناقل حامل لفينيل ألانين مشع
12U: متعدد يوراسيل حيث يشير العدد 12 إلى عدد قواعد اليوراسيل

- التمرين الثاني: : 08 نقاط

- يمثل **النشاط الإنزيمي** مثالا جيدا عن الأدوار الوظيفية التي تؤديها الجزيئات البروتينية أين تتجسد قدرتها في سيرورة التفاعلات الأيضية والتحولات الكيميائية بناء على ما تفرضه متطلبات الخلية أو العضوية .
- خلال هذه الدراسة نسعى إلى التعرف على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط إنزيمات **الأكسدة الحلقية** المعروفة إختصارا بـ **COX** الذي يرتبط نشاطها بـ **الاستجابة الالتهابية** . يمثل **البروستاغلاندين** أحد الوسائط الالتهابية المركبة خلال الرد الالتهابي حيث يتسبب إفرازه في توسيع الأوعية الدموية وارتفاع نفاذيتها وهو ما يترجم إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها (آلام موضعية في مستوى منطقة الإصابة) .

الشكل (3)	الشكل (2)	الشكل (1)

(1) الوثيقة

(I)


- 1- معتمدا على معطيات الشكل (1) ا- الوثيقة (1) ماهي المعلومات التي تقدمها مقارنةك للتفاعلين 1 مع 4 ثم 2 مع 3.
 - 2- استنتج الخاصية المدروسة المميّزة للنشاط الإنزيمي .
 - 3- قدم الدعامة الكيميائية (معادلة كيميائية) التي تترجم التفاعل المبين في الشكل (2) ا- الوثيقة (1) ، مبرزاً نوعه .
 - 4- معتمدا على معطيات الشكل (3) ا- الوثيقة (1) :
- أ- **قارن** بين الموقع الفعال لكل من إنزيم **COX 1** و **COX 2** .
- ب- **كيف** تبرر إجابتك في (4- ا) التأثير النوعي المستهدف من خلال التفاعلين 2 و 3 .
- II- يمثل الجدول المبين في الشكل (1) من الوثيقة (2) معطيات تجريبية متعلقة بالنشاط الإنزيمي لإنزيم **COX 2** بينما يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة تطور الأنشطة الإنزيمية لكل من إنزيم **COX 1** و **COX 2** ضمن أوساط تتضمن تراكيز متزايدة لمركب كيميائي ذو تأثير علاجي يتمثل في دواء **ibuprofène** في وجود تراكيز معتبرة لمادة التفاعل (حمض أراشيدونيك).

<table><tr><td>2- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 513 و His 90</td><td>1- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 120 و Tyr 385</td><td>الخلل الجيني</td></tr><tr><td>تركيز منخفض لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين</td><td>تركيز عال لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين</td><td>خصائص وسط التفاعل</td></tr></table>	2- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 513 و His 90	1- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 120 و Tyr 385	الخلل الجيني	تركيز منخفض لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين	تركيز عال لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين	خصائص وسط التفاعل	
2- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 513 و His 90	1- طفرة مست الحمضين الأمينيين Arg 120 و Tyr 385	الخلل الجيني					
تركيز منخفض لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين	تركيز عال لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستاغلاندين	خصائص وسط التفاعل					
الشكل (2)	الشكل (1)						

(2) الوثيقة

- 1- من خلال تحليلك للنتائج التجريبية لجدول الشكل (1) من الوثيقة (2) فسر خصائص أوساط التفاعل في الحالتين .
- 2- ماهي المعلومة المستخلصة من خلال هذه الدراسة ؟
- 3- حلل نتائج الشكل (2) لـ الوثيقة (2) . ماذا تستنتج ؟ .
- 4- افتح فرضية يمكن من خلالها تفسير تأثير مركب **ibuprofène** .

III - باستعمال برنامج **Rastop** تم الحصول على الشكلين (1) و (2) لـ الوثيقة (3) والتي تمثل نماذج جزيئية لانزيم **COX 1** بوجود الركيزة الطبيعية (حمض أراشيدونيك) ودواء **ibuprofène** تبرز حيز الإرتباط في كل حالة .




الوثيقة (3)

- 1- هل تأكد معطيات الشكلين (1) و (2) صحة فرضيتك السابقة المقترحة في II-4 ؟ علل
- 2- نمذج النشاط الإنزيمي لانزيم **COX 1** (في حالة وجود الـ **ibuprofène** وفي حالة غيابه) .
- 3- اشرح كيف يؤثر دواء (**ibuprofène**) على إختفاء الأعراض الالتهابية (التقليل من حدة الآلام الموضعية خلال الرد الإلتهابي).
- 4- إذا علمت ان دواء **aspirine** يمتلك نفس الخصائص العلاجية مع **ibuprofène** ماهي الخصائص الجزيئية التي تبرر هذه الحالة.
- 5- بالاعتماد على مكتسباتك بين كيف تساهم القيم المثلى لكل من الـ **PH** و درجة الحرارة في بلوغ ذروة كفاءة التحفيز الإنزيمي .

- التمرين الثالث : 07 نقاط

- يكتسب **البروتين** بعد إصطناعه الحيوي على مستوى الخلية الحية بنية فراغية مميزة يتحدد بموجبها تخصصه الوظيفي الملائم حيث تلعب وحداته البنائية بخصائصها الفيزيائية والكيميائية دورا هاما في ثبات هذه العلاقة بين البنية والوظيفة .
- لغرض إثبات هذه العلاقة والجوانب التي تبرر وجودها نستعرض الدراسة التالية :

(I)- يمثل الشكلين (1) و (2) بنيات فراغية لبروتينات تم الحصول عليها باستعمال برنامج **Rastop** .



الوثيقة (1)

- 1- تعرف على البيانات المرقمة للشكل (1) من الوثيقة (1) .
- 2- قارن بين البنيتين A و B.
- 3- بعد التشكل النهائي لهذه البنيات وانطواءها ضمن ظروف معينة تبقى محافظة على ثباتها واستقرارها . علل .

(II) - سمحت الإمهاء الكلية لجزء من البروتين (B) متمثل في ثماني ببتييد (P8) من الحصول على الأحماض الأمينية التالية :

Ala ، Asp، Arg، 2 Gly، Phe، Ser،Val

a- تعطي معاملة (P8) بانزيم (**trypsin**) متعددات ببتييد تمثلت في ثلاثي ببتييد TP3 و خماسي ببتييد TP5 .

b- تعطي معاملة (P8) بانزيم (**chymotrypsin**) متعددات ببتييد تمثلت في ثلاثي ببتييد CP3 و خماسي ببتييد CP5 .

- نعامل متعددات الببتييد (TP3، TP5، CP3، CP5) بانزيمي **aminopeptidase** و **carboxypeptidase** والنتائج ممثلة بالجدول التالي علما أن

- انزيم (**trypsin**) يستهدف الرابطة الببتيديّة التي تلي الأحماض الأمينية القاعدية (Arg-Lys-His) من الطرف الكربوكسيلي .

- انزيم (**chymotrypsin**) يستهدف الرابطة الببتيديّة التي تلي الأحماض الأمينية العطرية (Phe-Tyr-Trp) من الطرف الكربوكسيلي .

- معاملة متعدد الببتييد بانزيم **aminopeptidase** يسمح لنا بتحديد طبيعة الحمض الأميني المميز للنهاية الطرفية الأمينية

- معاملة متعدد الببتييد بانزيم **carboxypeptidase** يسمح لنا بتحديد طبيعة الحمض الأميني المميز للنهاية الطرفية الكربوكسيلية .

		aminopeptidase	carboxypeptidase
P8		Ala	Val
نواتج تأثير إنزيم التربسين	TP3	Ser	Val
	TP5	غير محدد	غير محدد
نواتج تأثير إنزيم الكيموتربسين	CP3	غير محدد	غير محدد
	CP5	Asp	Val

1- مستندا إلى المعطيات الواردة أعلاه استنتج التسلسل الصحيح للأحماض الأمينية المشكلة لثماني الببتييد (P8) .

2- حدد التسلسل النيوكليتيدي لجزء الدعامة الوراثية التي سمحت بالتعبير المورثي عن الببتييد (P8) .

- تعطى العلاقة بين اللغة النووية

Ala	Asp	Arg	Gly	Ser	Phe	Val
GCC	GAC	AGA	GGC	UCA	UUC	GUU

والبروتينية بالشكل التالي :

(III) - لدراسة بعض الخصائص المميزة لمتعددات الببتييد TP3 و TP5 الناتجة عن تأثير إنزيم **trypsin** وكذا تحديد العوامل المحددة

لـ التخصص الوظيفي لهذا الإنزيم نستعرض الدراسة التالية :

- التجربة (1): بالاستعانة بتقنية الرحلان الكهربائي ندرس السلوك الكهربائي لمتعددات الببتييد (TP3، TP5) الناتجة عن تأثير إنزيم

trypsin على ثماني الببتييد السابق (P8) ضمن وسطين مختلفان من حيث قيمة الـ PH والنتائج موضحة ضمن الشكل (1) من الوثيقة (2) .


- التجربة (2): يمثل الشكل (2) نتائج تم الحصول عليها بتقنية الفصل الكروماتوغرافي أحادي البعد لنواتج وسط

التفاعل بالنسبة لانزيم **trypsin** في وجود ثماني الببتييد (P8) وفي وجود أو غياب مركب كيميائي (M) يكمن تأثيره في كسر بعض

الروابط الكيميائية التي تضمن إستقرار البناء الفراغي لإنزيم **trypsin** .

trypsin + +

مركب M - +



+: وجود / -: عدم وجود

الشكل (2)

الشكل (1)

الوثيقة (2)

1- فسر نتائج الهجرة للبقتين A و B في الحالتين .

2- استنتج طبيعة البقتين A و B .

3- بين كيف تساهم الخاصية المدروسة في الشكل (1)

من الوثيقة (2) في تحديد البنية الفراغية للبروتين .

4- حلل وفسر نتائج الهجرة الممثلة بالشكل (2)

من الوثيقة (2) .

5- ما هي المعلومة المستخلصة حول العلاقة

بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي .

مسنوی نهائي علوم نجرية

العلامة	الإجابة النموذجية
	-النمرين الأول: I-1- التعرف على البيانات المرقمة للوثيقة (1) : 1- غلاف نووي / 2- ثقب نووي / 3- مورثة / 4- إنزيم الإستنساخ / 5- سلسلة ARNm متنامية / 6- سلسلة ARNm ناضجة . 2-التفسير: أ- تمركز الإشعاع في مستوى النواة (الشكل 1) يرتبط بدمج قواعد اليوريددين (نيوكليزيدة اليوراسيل) المشع في جزيئات الـ ARNm المتنامية (العنصر 5) التي يتم إصطناعها داخل النواة ب- ظهور الاشعاع في مستوى هيولى الخلية (الشكل 2) يرتبط بهجرة جزيئات ARNm الناضجة (العنصر 6) من النواة الى الهيولى لغرض توظيفها في المرحلة الموالية لنشاط التعبير المورثي (الترجمة) . - دور جزيئات ARNm الناضجة : تأمين نقل الرسالة الوراثية المشفرة في صورة رامزات من النواة إلى مستوى تركيب البروتين (الهيولى) . 3- ناتج التعبير المورثي : - الشكل (أ) : بداية المورثة CGATTCCTCTACTTCGCCATATAAAAACTACC ↓ إستنساخ AUG AAG CGG UAU AUU UUU GGA UGG ↓ ترجمة Met – Lys- Arg- Tyr- Ile – Phe- Gly- Trp ↓ ↓ ترجمة Phe –Tyr- Thr- Pro - Lys – Thr II-1- التحليل والتفسير : - الوسيط (1) : في وجود ريبوزومات + متعدد يوراسيل (U12) + ARNt_{phe}* سجلنا ارتفاع مهم في النشاط الاشعاعي على مستوى غشاء الترشيح . - نفس ارتفاع النشاط الاشعاعي ضمن الوسيط (1) بحدوث إرتباط وظيفي بين مكونات الوسيط عمل خلاله الريبوزوم على قراءة الأحرف النووية لمتعدد اليوراسيل وترجمتها إلى متعدد فينيل ألانين مشع مما سمح بظهور الاشعاع على مستوى الغشاء باعتبار أن الريبوزومات لا يمكنها عبور غشاء نترات السيليلوز . - الوسيط (2) : في وجود ريبوزومات + متعدد يوراسيل (U12) سجلنا غياب النشاط الاشعاعي على مستوى غشاء الترشيح . -فسر ذلك بـ عدم حدوث إرتباط وظيفي نتيجة غياب ARNt_{phe}* وهو ما يؤكد أن الريبوزومات + متعدد يوراسيل (U12) لوحدهما غير كافيان لحدوث نشاط ترجمة .

- الوسط (3) : في وجود ريبوزومات + متعدد يوراسيل (3U) سجلنا نشاط اشعاعي منخفض

على مستوى غشاء الترشيح .

- نفسر ذلك بما يلي :

- ظهور نشاط إشعاعي يؤكد **حدوث إرتباط وظيفي** بين مكونات الوسط عمل خلاله الريبوزوم على قراءة الأحرف النووية لمتعدد اليوراسيل وترجمتها إلى متعدد فينيل ألانين مشع مما سمح بظهور الاشعاع على مستوى الغشاء .

- النشاط الاشعاعي المنخفض مقارنة بالوسط (1) يرتبط بانخفاض عدد الأحرف النووية التي تمت قراءتها من طرف وحدات الريبوزوم (جزئ الـ ARNm المستعمل يتضمن 3 قواعد يوراسيل) وهو ما يعني دمج عدد قليل من وحدات الفينيل ألانين المشع .

- الوسط (4) : في وجود ريبوزومات + متعدد يوراسيل (U2) + ARNt_{phe}* سجلنا غياب

النشاط الاشعاعي على مستوى غشاء الترشيح .

- نفسر ذلك بـ **عدم حدوث إرتباط وظيفي** رغم توفر الوسط على جميع مكونات الوسط (1) ويبرر ذلك بأن عدد أحرف متعدد اليوراسيل (U2) كانت غير كافية لقراءتها من طرف الريبوزوم وبالتالي غياب نشاط الترجمة وعدم دمج وحدات الفينيل ألانين المشع ومنه غياب الاشعاع على مستوى الغشاء .
- مقارنة نتائج الوسط (3) و (4) تؤكد أن أقل عدد لأحرف الشفرة الواحدة هو 3 .

2- المعلومات المستخلصة :

- يتطلب حدوث نشاط الترجمة توفر ريبوزومات + جزئي حامل للمعلومة الوراثية في صورة شفرات (ARNm) + جزيئات ARNt حاملة لحمض أميني (حمض أميني منشط) .
- وحدة الرامزة تتضمن أكثر من حرفين نوويين (3 أحرف نووية = رامزة) .

- التمرين الثاني :

1- المعلومات المقدمة :

(i) **التفاعل (1) مع التفاعل (4) :**

- الفوسفوليپاز قادر على تحفيز تفاعل الفوسفوليبيدات الغشائية .
- الفوسفوليپاز غير قادر على تحفيز تفاعل حمض أراشيدونيك .
- تبرز هذه المعطيات أن الإنزيم قادر على التأثير على ركيزة تفاعل واحدة فقط .
- إذن تأثير الإنزيم **نوعي تجاه مادة التفاعل** .

(ب) **التفاعل (2) مع التفاعل (3) :**

- كل من إنزيم COX1 و COX2 حضرا على تفاعل نفس الركيزة إلا أنه كان هناك اختلاف في ناتج التفاعل .

إذن تأثير الإنزيم **نوعي تجاه نوع التفاعل** .

2- تأثير الإنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل ونوعي تجاه نوع التفاعل .

- إذن جزيئات الإنزيم تتميز بخاصية **التخصص المزدوج** .

3- الدعامة الكيميائية :



- نوع التفاعل : تفاعل تركيب (بناء)

4- المقارنة :

- اختلاف في طبيعة بعض الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال (الحمض الاميني رقم 523 هو ايزوليوسين بالنسبة لـ COX1 أما بالنسبة لـ COX2 فهو فالين .
- اختلاف في أبعاد الموقع الفعال لكلا الإنزيمين .

تبرير التأثير النوعي : الاختلاف في خصائص الموقع الفعال لكلا الإنزيمين يبرر اختلاف سلوك كل

إنزيم تجاه نفس الركيزة حيث يرتبط ذلك باختلاف المجاميع التي تؤمن حدوث التفاعل في كل حالة .

(II)-1- تفسير خصائص أوساط الزرع :

- الوسيط (1) : التراكيز العالية لجزيئات COX2 الحرة وغياب ناتج التفاعل (بروستاغلاندين)

يرتبط بغياب تشكيل معقدات التفاعل (ES) نتيجة عدم قدرة جزيئات الإنزيم على التعرف على الركائز

بسبب الطفرة التي مست الحمضين الأمينيين Tyr 385 و Arg 120 وأعاقت بذلك تثبيت الركيزة .

– إذن الأحماض الأمينية Tyr 385 و Arg 120 تشكل موقع التثبيت للموقع الفعال لإنزيم COX2 .

- الوسيط (2) : التراكيز المنخفضة لجزيئات COX2 الحرة يرتبط بتوظيفها ضمن وسط التفاعل

وهو ما سمح بتشكيل معقدات التفاعل .

– إذن الطفرة لم تعطل قدرة الإنزيم على التعرف على الركيزة .

– غياب البروستاغلاندين (ناتج تفاعل) ضمن وسط التفاعل رغم تشكل معقدات التفاعل يؤكد أن الطفرة التي مست His 90 و Arg 513 عطلت تحفيز الركيزة (حمض أراشيدونيك) على التفاعل وهو

ما أعاق ظهور النواتج ضمن الوسيط .

– إذن الأحماض الأمينية His 90 و Arg 513 تشكل موقع تحفيز الركيزة على التفاعل .

2- المعلومة المستخلصة :

الموقع الفعال يتضمن موقعين **موقع تثبيت** الركيزة و **موقع التحفيز** على تفاعل الركيزة.

– حيث بالنسبة لـ COX1

– الأحماض الأمينية Tyr 385 و Arg 120 تشكل موقع التثبيت.

– الأحماض الأمينية His 90 و Arg 513 تشكل موقع تحفيز الركيزة على التفاعل .

3- **التحليل :** يمثل المنحنى تطور النشاط الإنزيمي لإنزيم COX2 و COX1 بدلالة التراكيز

المتزايدة لمركب **ibuprofène** في وجود تركيز عالية لركيزة التفاعل حيث نسجل :

– **عند تركيز منعدم [0] لمركب ibuprofène :** يبلغ النشاط الإنزيمي لإنزيم COX2 و

COX1 قيمة أعظمية (100%).

– **عند التراكيز المنخفضة لمركب ibuprofène [أقل من 10⁻⁶] نسجل :**

– ثبات عند قيمة أعظمية للنشاط الإنزيمي لإنزيم COX2 (100%) بينما نسجل إنخفاض بطيء في

النشاط الإنزيمي لإنزيم COX1 .

عند التركيز العالية لمركب ibuprofène [أكثر من 10⁻⁶] نسجل :

– إنخفاض سريع في النشاط الإنزيمي لإنزيم COX1 و إنزيم COX2 .

الإستنتاج :

– مركب **ibuprofène** يثبط النشاطات الإنزيمية لكل من إنزيم COX1 و إنزيم COX2 .

4- الفرضية :

– مركب **ibuprofène** يمتلك جزء تثبيت على الموقع الفعال لإنزيم COX1 و COX2 مماثل

لجزء تثبيت ركيزة التفاعل (حمض أراشيدونيك) وبالتالي يمكنه منافسة الركيزة على الموقع الفعال .

III-1- نعم تؤكد .

النتائج :

– يتضح من خلال معطيات الشكلين (1) و (2) من الوثيقة (3) أن جزيئة **ibuprofène** شغلت نفس


حيز الارتباط الذي شغلته الركيزة الطبيعية (حمض أراشيدونيك) على مستوى الموقع الفعال لإنزيم

COX1 و بناء على خصوصية الموقع الفعال التي يشترط فيها وجود تكامل بنيوي بينه وبين جزء من الركيزة

يتأكد أن جزيئة **ibuprofène** تمتلك نفس جزء الارتباط مع حمض أراشيدونيك

2- النمذجة الجزيئية :

في وجود المثبط (ibuprofène)




تشكل عدد قليل من معقدات التفاعل (ES)



ناتج ضعيف (بروستغلاندين)

في غياب المثبط (ibuprofène)



تشكل معتبر لمعقدات التفاعل (ES)



ناتج مهم (بروستغلاندين)

3- الشرح :

- يمتلك دواء **ibuprofène** جزء تثبيت مماثل للركيزة الطبيعية وهو ما يجعله ينافسها على الموقع الفعال.
- إحتواء جزيئات **ibuprofène** ضمن الموقع الفعال يثبط ارتباط الركيزة الطبيعية (ح.أراشيدونيك) .
- تثبيط ارتباط الركيزة الطبيعية (ح.أراشيدونيك) لا يسمح باستهلاكها وبالتالي غياب النواتج (بروستغلاندين).
- غياب البروستغلاندين لا يسمح باتساع الاوعية الدموية وزيادة نفاذيتها ومنه غياب الاعراض والآلام المرضية .

4- الخصائص الجزيئية :

- إمتلاك مركب **aspirine** جزء تثبيت مماثل لمركب **ibuprofène** و الركيزة الطبيعية يسمح له بالتكامل البنيوي مع الموقع النشط (الفعال) لانزيم **COX** وبالتالي نفس التأثير .

5- التبيان :

- **درجة الحرارة المثلى :** تكون البنية الفراغية المميزة لجزيئات الانزيم ثابتة ومستقرة تؤمن حدوث الارتباط النوعي (تكامل بنيوي) بين الموقع الفعال وركيزة التفاعل وهو ما يجعل من المجاميع الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على ركيزة التفاعل وبالتالي تشكل معتبر معقدات التفاعل ومنه استهلاك أمثل للركيزة يجعل من النشاط الانزيمي يكون أعظميا .
- **قيمة PH المثلى :** تسمح باستقرار وثبات البنية الفراغية حيث تكون الحالة الايونية للوظائف وخاصة ضمن الموقع الفعال ملائمة لبناء روابط انتقالية ضعيفة بين بعض المجاميع الكيميائية الحرة للأحماض الامينية للموقع الفعال و اجزاء من ركيزة التفاعل مما يجعل من المجاميع الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على ركيزة التفاعل نتيجة التكامل البنيوي بينهما وبالتالي تشكل معتبر لمعقدات التفاعل ومنه استهلاك أمثل للركيزة يجعل من النشاط الانزيمي يكون أعظميا .

- التمرين الثالث :

- **II-1- التعرف على البيانات :** 1- حلزون α / 2- نقطة إنعطاف / 3- وريقة β .

2- مقارنة بين البنيتين :

بروتين B	بروتين A	معايير المقارنة
رابعي	ثالثي	<u>المستوى البنائي</u>
3 سلاسل	سلسلة واحدة	<u>عدد السلاسل</u>
$\alpha 4$ و $\beta 10$	$\alpha 1$ و $\beta 6$	<u>عدد ونوع البنى الثانوية</u>
معقد	متوسط التعقيد	<u>درجة التعقيد</u>
كروي	كروي	<u>مظهر النموذج الفراغي</u>

3- تحليل ثبات واستقرار البنى الثانوية والرابعة :

- يعود ذلك إلى وجود روابط كيميائية داعمة تشمل :
- روابط غير تساهمية : روابط شاردية ، روابط هيدروجينية ، روابط كارهة للماء .
- روابط تساهمية : جسور ثنائية الكبريت .
- 1-II- إستنتاج الترتيب الصحيح للأحماض الأمينية لمتعدد الببتيد (P8) :
- نتيجة معاملة P8 بانزيم aminopeptidase تؤكد أن الحمض الأميني رقم (1) هو : Ala
- نتيجة معاملة P8 بانزيم carboxypeptidase تؤكد أن الحمض الأميني رقم (8) هو : Val
- نتيجة معاملة TP3 بانزيم aminopeptidase تؤكد أن الحمض الأميني رقم (6) هو : Ser باعتبار أن ال Val (الحمض الأميني الأخير) ظهر في نهاية TP3 .
- نتيجة معاملة CP5 بانزيم aminopeptidase تؤكد أن الحمض الأميني رقم (4) هو : Asp باعتبار أن ال Val (الحمض الأميني الأخير) ظهر في نهاية CP5 .
- TP3 ناتج عن تأثير إنزيم Trypsine فهذا يعني أن الرابطة الببتيدية المستهدفة تقع على مستوى الطرف الكربوكسيلي لحمض أميني قاعدي (Arg) ومنه الحمض الأميني رقم (5) هو Arg .
- CP5 ناتج عن تأثير إنزيم Chymotrypsine فهذا يعني أن الرابطة الببتيدية المستهدفة تقع على مستوى الطرف الكربوكسيلي لحمض أميني عطري (Tyr) ومنه الحمض الأميني رقم (3) هو Tyr .
- نتيجة الإمالة الكلية لـ P8 سمحت بظهور 2Gly ومنه الحمض الأميني رقم (2) و (7) هو Gly .
- وعليه يكون تسلسل الببتيد P8 بالشكل التالي :

1	2	3	4	5	6	7	8
Ala	Gly	Phe	Asp	Arg	Ser	Gly	Val

2- تحديد التسلسل النيوكليتيدي :

ح. أميني	Ala	Gly	Phe	Asp	Arg	Ser	Gly	Val
ARNm	GCC	GGC	UUC	GAC	AGA	UCA	GGC	GUU
س. م	CGG	CCG	AAG	CTG	TCT	AGT	CCG	CAA

III-1- تفسير سلوك البقعين A و B :

- عند قيمة $PH=1$:

- حركة عديدات الببتيد (A و B) نحو المهبط (-) يعني أنهما يمتلكان شحنة موجبة الذي يبرر حدوث تأين على مستوى وظائفها الامينية الحرة باكتساب بروتون (سلوك قاعدة ضمن وسط حامضي).

- عند قيمة $PH=13$:

- حركة عديدات الببتيد (A و B) نحو المصعد (+) يعني أنهما يمتلكان شحنة سالبة الذي يبرر حدوث تأين على مستوى وظائفهما الكربوكسيلية الحرة بفقدان بروتون (سلوك حمض ضمن وسط قاعدي).

2- إستنتاج طبيعة البقعين (A و B) :

- TP3 يتضمن (3) أحماض متعادلة

- TP5 يتضمن (3) أحماض متعادلة وحمض أميني قاعدي (Arg) وآخر حامضي (Asp).

عند قيمة $PH=1$ [وسط جد حامضي] : تتأين وظائف السلسلة الخطية والسلاسل الجانبية

وعليه تصبح شحنة TP3 هي $1+$ أما شحنة TP5 هي $2+$.

- TP5 أكثر قوة كهروجابية من TP3 وعليه TP5 سوف يبدي مسافة تحرك أكبر من TP3 ومنه :

$$B = TP3 \quad \text{و} \quad A = TP5$$

- تأكيد :

عند قيمة $PH=13$ [وسط جد قاعدي] : تتأين وظائف السلسلة الخطية والسلاسل الجانبية

وعليه تصبح شحنة TP3 هي $1-$ أما شحنة TP5 هي $2-$.

- TP5 أكثر قوة كهروسلبية من TP3 وعليه TP5 سوف يبدي مسافة تحرك أكبر من TP3 ومنه :

$$B = TP3 \quad \text{و} \quad A = TP5$$

3- التبيان :

- تتأثر البنية الفراغية للبروتين بـ السلوك الحمضي الذي تبديه الأحماض الأمينية التي تؤمن بنائها وفقا لقيمة PH الوسط .

- عند تغير قيمة PH الوسط تتغير شحنة بعض جذور الاحماض الامينية التي تساهم في تشكل روابط

كيميائية تضمن ثبات واستقرار البنية الفراغية للبروتين وهو ما يؤدي إلى إختفاء هذه الروابط

الكيميائية الضرورية مما يترتب عنه فقدان البنية الفراغية المميزة للبروتين .

4- تحليل وتفسير نتائج الشكل (2) :

- في وجود إنزيم Trypsine وغياب مركب [M] : سجلنا ظهور بقعتين تتوافقان مع TP3 و TP5 .

- نبرر ذلك بأن إنزيم Trypsine حفز على إماهة الرابطة الببتيدية للطرف الكربوكسيلي للحمض

الاميني القاعدي (Arg) لمتعدد الببتيد P8 وهو ما سمح بالحصول على متعدد ببتيد TP3 و TP5 .

في وجود إنزيم Trypsine ووجود مركب [M] : سجلنا ظهور بقعة واحدة تتوافق مع P8 .

- نبرر ذلك باستهداف مركب (M) للروابط الكيميائية المميزة للبنية الفراغية لإنزيم Trypsine

التي تؤمن ثباته واستقراره وهو ما أفقده القدرة على تحفيز إماهة الرابطة الببتيدية للطرف الكربوكسيلي

للحمض الاميني القاعدي (Arg) لمتعدد الببتيد P8 والنتيجة هي ظهور بقعة واحدة توافق P8.

5- المعلومة المستخلصة :


- تتوقف البنية الفراغية للبروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط الكيميائية التي تنشأ بين

أحماض أمينية محددة متوضعة بطريقة دقيقة على مستوى بنيته الفراغية وفقا لما تفرضه المعلومة

الوراثية التي شفرة لبنائه .

التمرين الأول (05 نقاط)

المضادات الحيوية من الأدوية المستعملة لمعالجة الأشخاص المصابين بأمراض التي تسببها الجراثيم. تهدف هذه الدراسة تحديد مكان وآليات تأثير بعض المضادات الحيوية على مستوى الخلية الجرثومية. تمثل الوثيقة 1 مراحل التعبير المورثي عند حقيقيات النواة .



- 1 - تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 9.
- 2 - باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) ومعارفك المكتسبة، استخرج العناصر الضرورية لحدوث المرحلة (1) و(2) من جهة ، وتشكيل العنصر (9) من جهة أخرى.
- 3 - بين العلاقة بين العنصرين (9) و(5).

4 - نقدم لك معطيات حول مكان التأثير الشبتي لبعض المضادات الحيوية على احدى المراحل الممثلة في الوثيقة 1.

أ - الكلورامفينيكول (Chloramphénicol) : يثبط عمل انزيم ببتيديل ترانسفيراز peptidyl transférase (انزيم ناقل الببتيديل) على مستوى تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى.

ب - التتراسكليتات (Tétracycline): ترتبط إلى تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى .

ج - لنيزوليد (Linezolid) : يرتبط بالموقع (A) على ما تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى.

د - سترپتوغرامين (Sterptogramins): يثبط العمل التحفيزي لانزيم Aminoacyl-ARNt SYNTHETASE.


- انطلاقا من المعطيات المقدمة ومعلوماتك ، اشرح عواقب المعالجة بالمضادات الحيوية المشار اليها أعلاه على الجراثيم .

التمرين الثاني (07 نقاط) :

الانزيمات هي بروتينات ذات بنية ووظيفة محددة ، بغرض التعرف على بعض خصائص الانزيم التي تمكنه من القيام بدوره ، وبعض العوامل المؤثرة على نشاطه ، نقدم لك المعطيات التالية :

I - انزيم ATCase (aspartate carbamyl-transférase) يحفز تخليق القواعد الآزوتية البريميديّة التي تدخل في تركيب الأحماض النووية .

تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية للانزيم باستعمال الحاسوب ، خلال نشاطه التحفيزي.



1 - سم البينات المرقمة من 1 إلى 5 .


2 - أ - تعرف على بنية انزيم ATCase مع التعليل .

يمتاز العنصر (س) بخاصية بنيوية ووظيفية مميزة له .


ب - حدد هاتين الخاصيتين .

II - بغرض التعرف على بعض العناصر الكيميائية المتحركة في نشاط انزيم ATCase ، نقترح عليك المعطيات التالية :

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 نشاط هذا الانزيم في وجود أو غياب ATP أو CTP. الشكل (ب) من الوثيقة 2 يمثل طريقة مبسطة للتفاعلات المشاركة في هذا المسار البنائي (تخليق القواعد الأزوتية البريميديّة).



الشكل أ -



الشكل ب -

الوثيقة 2

- 1 - قدم تحليلاً مقارناً للتسجيلات الثلاثة للشكل (أ) من الوثيقة (2). ماذا تستنتج؟
- 2 - إلى أي فئة من المركبات ينتمي إليها كل من ATP و CTP.
- 3 - علماً أن الـ ATP و CTP تمثل مواد طلائعية لتخليق متعدد النيكليوتيد، فسر طريقة تأثير كل منهما على نشاط الانزيم.
- 4 - بتوظيف المعارف المبنية خلال هذه الدراسة ومعلوماتك المكتسبة حول الأيض الخلوي، لخص في نص علمي لا يتجاوز (6) أسطر، العلاقة بين بنية ووظيفة انزيم ATCase.

التمرين الثالث (08 نقاط) :

الشخص (ع) مصاب بقصور كلوي حاد، نصحه الأطباء بزرع كلية. ولتحقيق هذه العملية بنجاح يتم عادة الاستعانة بالأقرب للتبرع بالكلية للمريض، ويجري فحص مطابقة أنسجة لمعرفة مدى مطابقة الأنسجة بين الشخصين.



I - تم تحديد زمر التوافق النسيجي CMH عند كل من الشخص (ع) وبعض أفراد عائلته. تلخص الوثيقة 1 النتائج المحصل عليها.

تموضع اليات معقد التوافق النسيجي CMH على :										أفراد عائلة الشخص
الصبغي رقم : 6 (المماثل)					الصبغي رقم: 6					(ع)
D _{R2}	D _{W2}	B ₅	C _{W1}	A ₁	D _{R3}	D _{W3}	B ₈	C _{W2}	A ₁	أب الشخص (ع)
D _{R4}	D _{W4}	B ₁₂	C _{W8}	A ₁	D _{R1}	D _{W1}	B ₇	C _{W4}	A ₂	أم الشخص (ع)
D _{R1}	D _{W1}	B ₇	C _{W4}	A ₂	D _{R3}	D _{W3}	B ₈	C _{W2}	A ₁	الشخص (ع)
D _{R4}	D _{W4}	B ₁₂	C _{W8}	A ₁	D _{R2}	D _{W2}	B ₅	C _{W1}	A ₁	أخ الشخص (ع)
D _{R4}	D _{W4}	B ₁₂	C _{W8}	A ₁	D _{R2}	D _{W2}	B ₅	C _{W1}	A ₁	أخت الشخص (ع)

الوثيقة 1

- اعتماد على الوثيقة 1 :

- 1 - أذكر ثلاث خصائص مميزة لمورثات CMH.
- 2 - أ - أعط النمط الوراثي لـ CMH لكل من : الشخص (ع) وأبويه و أخت الشخص (ع) .
ب - من بين إخوة الشخص (ع) ، هل يوجد فرد تسمح لديه تركيبة CMH بالتبرع بكليته لأخيه ؟ علل إجابتك.
- II - لإبراز الخصائص البنيوية المميزة للجزيئات المحددة للذات ، نقترح عليك المعطيات المبينة في الوثيقة 2 ، حيث يمثل الشكلان (أ) و(ب) البنية ثلاثية الأبعاد والتمثيل التخطيطي للجزيئات HLA الناتجة عن تعبير مورثات CMH .



الوثيقة 2

- 1 - تعرف على جزيئتي HLA الممثلة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 2.
- 2 - باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2 ومعلوماتك حول البروتينات ، قارن بين بنية جزيئتي HLA .
- 3 - وضح الغرض من تصنيف جزيئات HLA الممثلة في الوثيقة (1) .
- III - من خلال المفاهيم المبنية خلال هذه الدراسة ومعارفك المكتسبة ، استخلص العلاقة بين جزيئات النظام HLA ونسبة قبول الطعم ؟

العلامة		عناصر الإجابة									
مجزأة	كاملة										
		1 - التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 9: <table border="1"> <tr> <td>1 - جزيئة ARNm</td><td>4 - سلسلة ببتيدية قيد النمو</td><td>7 - ريبوزوم (تحت الوحدة الصغرى)</td></tr> <tr> <td>2 - إنزيم ARN بوليميراز</td><td>5 - رابطة ببتيدية</td><td>8 - إتجاه القراءة</td></tr> <tr> <td>3 - ADN (المورثة)</td><td>6 - ARNt</td><td>9 - المعقد (حمض أميني-ARNt)</td></tr> </table> 2 - العناصر الضرورية لحدوث : المرحلة 1 : الاستنساخ ✓ المورثة (المعلومات الوراثية الأصلية على جزيئة ADN). ✓ إنزيم ARN بوليميراز. ✓ 4 أنواع من النيوكليوتيدات الداخلة في تركيب الـ ARN. ✓ طاقة (ATP) المرحلة 2 : الترجمة : ✓ الـ ARNm ✓ تحت وحدتي الريبوزوم الكبرى والصغرى ✓ جزيئات الـ ARNt ✓ انزيمات وطاقة. تشكيل المعقد " حمض أميني-ARNt " ✓ إنزيم التنشيط: Aminoacyl-ARNt SYNTHETASE ✓ جزيئات الـ ARNt ✓ طاقة (ATP) ✓ أحماض أمينية 3 - العلاقة بين المعقد " حمض أميني-ARNt " والرابطة الببتيدية : ✓ يرتبط ARNt مع الحمض الأميني نوعيا عن بواسطة رابطة غنية بالطاقة (رابطة استر). ✓ أثناء الترجمة وعند انفصال ARNt عن الحمض الأميني تتحرر هذه الطاقة التي تسمح بتشكيل رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني الموجود في الموقع الببتيدي P مع آخر موجود في موقع الحمض الأميني للريبوزوم. 4 - شرح عواقب المعالجة بالمضادات الحيوية على الجراثيم : عواقب المعالجة بالمضاد الحيوي الكلورامفينيكول (Chloramphénicol) : ✓ يثبط عمل إنزيم ببتيديل ترانسفيراز peptidyl transférase (إنزيم ناقل الببتيد) على مستوى تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى. لذلك لا يستطيع الببتيد الموجود في الموقع P لتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى أن ينتقل إلى الموقع A ، لعدم تشكل الروابط الببتيدية بين الحمض الأميني في الموقع P مع الحمض الأميني في الموقع A — توقف عملية الترجمة (مرحلة الاستطالة). عواقب المعالجة بالمضاد الحيوي التتراسكلينات (Tétracycline) : ✓ ترتبط إلى تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى فتمنع ارتباط المعقد aminoacyl-ARNt -ARNt- حمض أميني" مع تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى (منع ارتباط "ARNt-حمض أميني" مع الموقع A على مستوى المعقد : ريبوزومات -ARNm) — توقف عملية الترجمة (مرحلة الاستطالة) عواقب المعالجة بالمضاد الحيوي لنيزوليد (Linezolid) : ✓ يرتبط بالموقع (A) على ما تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى مما يؤدي إلى تثبيط تشكل المركب	1 - جزيئة ARNm	4 - سلسلة ببتيدية قيد النمو	7 - ريبوزوم (تحت الوحدة الصغرى)	2 - إنزيم ARN بوليميراز	5 - رابطة ببتيدية	8 - إتجاه القراءة	3 - ADN (المورثة)	6 - ARNt	9 - المعقد (حمض أميني-ARNt)
1 - جزيئة ARNm	4 - سلسلة ببتيدية قيد النمو	7 - ريبوزوم (تحت الوحدة الصغرى)									
2 - إنزيم ARN بوليميراز	5 - رابطة ببتيدية	8 - إتجاه القراءة									
3 - ADN (المورثة)	6 - ARNt	9 - المعقد (حمض أميني-ARNt)									

		الثلاثي "t-RNA – ribosome - mRNA" ، فتتوقف عملية الترجمة (مرحلة الانطلاق) عواقب المعالجة بالمضاد الحيوي سترپتوگرامين (Sterptogramins): ✓ يثبط العمل التحفيزي لانزيم Aminoacyl-ARNt SYNTHETASE مما يعيق ارتباط الحمض الاميني مع ARNt النوعي له، ينجم عن ذلك <u>غياب تنشيط الاحماض الامينية</u> وبالتالي لا يتم نقل الاحماض الامينية <u>ولا يتم فك رموز الشفرة الوراثية</u>. <u>فلا تحدث عملية الترجمة</u>. ✓ وعليه المضادات الحيوية المذكورة تثبط عملية الترجمة في عدة مستويات ، ينجم عن ذلك توقف تركيب البروتينات مما يعيق تكاثر البكتيريا مما يسهل عمل الجهاز المناعي بالقضاء عليها.
--	--	---

التمرين الثاني (07 نقاط) :

العلامة		عناصر الاجابة						
مجزأة	كاملة							
		I-1 - تسمية البيانات : <table border="1"> <tr> <td>1 - مادة التفاعل</td><td>3 - منطقة انعطاف</td><td>5 - تحت وحدة (سلسلة ببتيدية)</td></tr> <tr> <td>2 - بنية ثانوية وريقات مطوية β</td><td>4 - بنية ثانوية حلزونية α</td><td></td></tr> </table> 2 - أ - التعرف على بنية انزيم ATCase: ✓ بنية رابعة التعليل: ✓ يتكون من تحت وحدتين (أربعة نهايات) حيث كل تحت وحدة ذات بنية ثنائية ب - تحديد الخاصيتين : الخاصية البنيوية : ✓ تمتلك البنية (س) بنية فراغية ثلاثية الابعاد نتيجة انطواء السلسلة الببتيدية ، تمتلك هذه البنية تجويف يتمثل في الموقع الفعال ، بنيته الفراغية ثلاثية الابعاد مكملية لبنية جزء محدد من مادة التفاعل. الخاصية الوظيفية : ✓ نظرا لامتلاك هذه البنية موقع فعال ، على مستواه يحدث التفاعل الكيميائي ، لذا هذه البنية تمتلك <u>وظيفة تحفيزية</u> II-1 - التحليل المقارن للتسجيلات الثلاثة للشكل (أ) من الوثيقة 2 : ✓ يمثل الشكل (أ) تغير نشاط انزيم ATCase بدلالة تركيز مادة التفاعل aspartate في وجود أو غياب ATP أو CTP. ✓ في غياب كل من ATP أو CTP (الشاهد): كلما زاد تركيز مادة التفاعل الاسبارتات ازداد نشاط الانزيم (سرعة التفاعل) ليصل الى اقصى نشاط له المقدر بـ (4) عند التركيز mmpl/L40 ، بعد ذلك تصبح سرعة التفاعل ثابتة عند قيمة قصوى. ✓ في وجود ATP : نسجل ارتفاع في نشاط الانزيم مقارنة مع الشاهد، فعند تركيز مادة التفاعل المقدر بـ mmol/l10 كمثال نسجل سرعة تقدر بـ 4 بالمقابل نسجل عند نفس التركيز سرعة تقدر بـ 2 في حالة غياب ATP. ✓ في وجود CTP : نسجل انخفاض في نشاط الانزيم مقارنة مع الشاهد، فعند تركيز مادة التفاعل المقدر بـ mmol/l10 كمثال نسجل سرعة تقدر بـ 0.5 بالمقابل نسجل عند نفس التركيز سرعة تقدر بـ 2 في حالة غياب CTP. الاستنتاج : ✓ ATP يرفع من نشاط الانزيم ، فهو يلعب دور منشط (محفز). ✓ CTP يخفض من نشاط الانزيم ، فهو يلعب دور مثبط.	1 - مادة التفاعل	3 - منطقة انعطاف	5 - تحت وحدة (سلسلة ببتيدية)	2 - بنية ثانوية وريقات مطوية β	4 - بنية ثانوية حلزونية α	
1 - مادة التفاعل	3 - منطقة انعطاف	5 - تحت وحدة (سلسلة ببتيدية)						
2 - بنية ثانوية وريقات مطوية β	4 - بنية ثانوية حلزونية α							

2 - تصنيف كل من ATP و CTP:

- ✓ عبارة عن نيكليوتيدات ريبية (نيكليوزيد ثلاثي الفوسفات) ، حيث :
- ✓ ATP يتبع مجموعة البيورينات (purines)
- ✓ CTP يتبع مجموعة البيريميديئات (pyrimidines)

3 - تفسير طريقة تأثير كل من ATP و CTP:

تفسير طريقة تأثير كل من CTP:

- ✓ نيكليوتيدة CTP يتم بناؤها انطلاقا من قاعدة بيريميديية هي السيتوزين . الفائض من CTP يثبط تركيب هذه القاعدة البريميديية(السيتوزين) و تجنب تراكمها دخل الخلية ويعود ذلك الى تثبيت CTP على الموقع النوعي لها على مستوى تحت الوحدة رقم 5 من الوثيقة1 يؤدي ذلك الى تثبيط النشاط التحفيزي لانزيم ATCase.اذن الناتج النهائي للسلسلة التركيبية (CTP) يلعب دور تثبيطي.

تفسير طريقة تأثير كل من ATP:

- ✓ - تثبت جزيئات الـ ATP على الموقع الخاص بها على مستوى تحت الوحدة رقم 5من الوثيقة1 ، يؤدي ذلك الى تنشيط العمل التحفيزي لأنزيم ATCase.
- ✓ فوجود كمية معتبرة من جزيئات الـ ATP داخل الخلية تكون متوافقة مع النشاط البنائي بما في ذلك تركيب البريميديئات . فتركيب الـ ARN والـ ADN يتطلب كمية متساوية من البيورينات والبريميديئات ،وجود فائض من الـ ATP (مركب بيوريني) ، يرافقه زيادة في تركيب البريميديئات ، هذا التفاعل يكون مستهلك للطاقة ، كما ان تفاعل تركيب carbamyl-phosphate يتطلب كذلك استهلاك طاقة ; الزيادة في جزيئات ATP تسرع التفاعل الكيميائي نتيجة الزيادة في تركيز مادة التفاعل (aspartate).

4 - العلاقة بين بنية ووظيفة انزيم ATCase :

- ✓ يتكون انزيم ATCase من تحت وحدتين مختلفتين ، تحت وحدة لها وظيفة تحفيزية حيث تثبت مادة التفاعل (الاسبارتات) وناتج التفاعل يتمثل في تركيب القواعد الازوتية البريميديية التي تدخل في تركيب الاحماض النووية .تحت الوحدة الثانية لها وظيفة تنظيمية ،يثبت على مستواها جزيئة الـ ATP او CTP،وهي تتحكم في نشاط الوحدة التحفيزية للانزيم ، فعند تثبيت CTP يؤدي ذلك الى تثبيط نشاط تحت الوحدة الوظيفية للانزيم والعكس في حالة تثبيت الـ ATP .اذن فهذا الانزيم يلعب دور هام في التفاعلات الايضية لكونه يدمج المعلومات على المستوى الطاقوي للخلية وعلى مستوى تركيز المركبات المشاركة في تفاعلات الهدم الحيوي.

التمرين الثالث (08 نقاط) :

العلامة		عناصر الاجابة			
مجزأة	كاملة				
		1- ا - الخصائص المميزة لمورثات CMH : ✓ محمولة على الذراع القصير للصبغي رقم 6 عند الانسان ✓ متساوية السيادة ✓ متعددة الأليلات			
		2 - أ - الأنماط الوراثية لـ			
		أخت الشخص (ع)	أب الشخص (ع)	ام الشخص (ع)	الشخص (ع)
		$A_1C_{W1}B_5D_{W2}D_{R2}$	$A_1C_{W2}B_8D_{W3}D_{R3}$	$A_2C_{W4}B_7D_{W1}D_{R1}$	$A_1C_{W2}B_8D_{W3}D_{R3}$
		$A_1C_{W8}B_{12}D_{W4}D_{R4}$	$A_1C_{W1}B_5D_{W2}D_{R2}$	$A_1C_{W8}B_{12}D_{W4}D_{R4}$	$A_2C_{W4}B_7D_{W1}D_{R1}$

ب - لا يوجد أي فرد تسمح لديه تركيبة CMH بالتبرع بكليته لآخيه
التعليق :

✓ لعدم وجود توافق بين CMH الشخص (ع) و CMH افراد عائلته .

II - 1 - التعرف على جزيئتي الـ HLA :

الشكل (أ) : جزيئة الـ HLA I

الشكل (ب) : جزيئة الـ HLA II

2 - المقارنة بين HLA I و HLA II

HLA II	HLA I	أوجه المقارنة
رابعة	رابعة	البنية
2 متناظرتان	2 : سلسلتان غير متناظرتان السلسلة α طويلة و السلسلة β_2m قصيرة	عدد السلاسل
β_1/α_1	α_2/α_1	منطقة تثبيت المستضد الببتيدي
مفتوح الطرفين موجود بين السلسلتين α و β	مغلق الطرفين تكونه السلسلة α فقط	طبيعة حيز التثبيت للمستضد الببتيدي

3 - توضيح الغرض من تصنيف جزيئات الـ HLA I و HLA II

✓ حتى يتم قبول زرع الطعوم (انسجة او أعضاء) يجب أن تكون معقدات التوافق النسيجي للمعطي متوافقة مع مستضدات التوافق النسيجي للمتلقى

✓ فالغرض من التصنيف هو لأجراء فحص التوافق (التطابق) النسيجي بين المتبرع والمستقبل وذلك بتشخيص خصوصية الـ HLA المكونة للنمط الظاهري (phenotype) أو النمط الوراثي (genotype) ، حيث يتم تحديد مستضدات مورثات الصنف الأول (HLA-A, B, C) والصنف الثاني (DQ, DP, DR) بالاختبارات المصلية.

✓ يسمح بأجراء اختبار توافق بين الـ HLA الموجودة علي لمفاويات المعطي مع مصل المريض (المستقبل) بمعرفة أن كانت هناك أجسام مضادة سابقة التكوين في مصل المريض والتي في هذا الاختبار سوف تتفاعل مع مستضدات الـ HLA على لمفاويات المعطي.

III - العلاقة بين جزيئات النظام HLA ونسبة قبول الطعم

✓ كل فرد يمتلك تركيبة خاصة لـ CMH مرتبطة بتعدد الاليات للمورثات المشفرة لجزيئات HLA.

✓ فنسبة قبول الطعم مرتبط بمدى التوافق بين جزيئات HLA للمعطي والمستقبل نظرا للتنوع الكبير لهذه الجزيئات ، فكلما زاد الاختلاف كلما قلت نسبة قبول الطعم ، اما في حالة التوافق بين جزيئات HLA (حالة التوأمة الحقيقي) يحدث قبول للطعم لانه يعتبر جسما من الذات.

اختبار الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

البروتين تعبير دقيق للمورثة، يساهم في تركيبه عضيات خلوية ومركبات كيميائية تعمل بتنسيق كبير فيما بينها.

I. للتعرف على آلية التعبير المورثي نقترح الدراسة التالية:

- الوثيقة (1) تمثل البنية ما فوق خلوية لخلية بنكرياسية عنقودية في حالة نشاط.

1- تعرف على العناصر المرقمة.

2- حدد دلائل نشاط الخلية البنكرياسية.


3- الجدول المرفق يوضح التجارب والنتائج المحصل عليها باستخدام الخلايا السابقة.

التجربة	وسط الزرع	النتيجة مكان ظهور الاشعاع
1	خلايا بنكرياسية + اليوراسيل المشع (U)	بعد 5 ساعات يظهر في العنصر (3) وبعد 12 ساعة يظهر في العنصر (4).
2	خلايا بنكرياسية + أحماض أمينية مشعة	بعد (3 دقائق) يظهر في العنصر (2) ثم في (4).


أ- علل سبب استعمال اليوراسيل المشع والأحماض الأمينية المشعة في هذه التجربة.

ب- فسر النتائج، وأستخرج العلاقة بين العنصرين (3) و(4).

4- تمثل أشكال الوثيقة 2 بعض مظاهر التعبير المورثي عند أنواع خلوية.



الوثيقة 1



الوثيقة 2

أ/ سم البيانات المرقمة من 1 إلى 7. مع تسمية العملية الممثلة في كل شكل من أشكال الوثيقة 2.

ب/ حدد عند أي نوع من الخلايا نلاحظ الشكلين أ و ج، مع التعليل.

ج/ قدم رسما تخطيطيا تفصيليا للجزء المؤطر في الشكل ج من الوثيقة 2.

II/ الوثيقة 3 تمثل جزء من مورثة إنزيم البرمياز (يتواجد على مستوى غشاء الكريات الحمراء ويساهم في نقل الجلوكوز إلى داخل الكرية الحمراء) أحدهما طبيعي والآخر طافر (لا يقوم بأي وظيفة) وكذا ترتيب الأحماض الأمينية التي يشرف عليها كل جزء من مورثة إنزيم البرمياز

تسلسل أحماض الأنزيم العادي Lys—Gly—Try—Pro—Cys—Ala TTT CCG ACC GGT ACG CG A جزء لسلسلة من مورثة الأنزيم العادي الشكل (2)				تسلسل أحماض الأنزيم الطافر Lys—Gly—Try—Pro—Gly—Ala TTT CCG ACC GGT CCG CG A جزء لسلسلة من مورثة الأنزيم الطافر الشكل (1)			
الوثيقة 3 ARN_m				الشكل (3) 1/ إستخرج سلسلة			
CGA	ACG	GGU	ACC	CCG	UUU	الرمزة المضادة	
Ala	Cys	Pro	Try	Gly	Lys	الحمض الأميني الموافق	

المسؤولة عن تركيب الإنزيم العادي والإنزيم الطافر ؟.

2/ بالإعتماد على معارفك ونتائج الوثيقة 3 علل فقدان الإنزيم الطافر لوظيفته ؟.

3/ قارن بين ARN_m ومورثة الإنزيم العادي ماذا تستخلص ؟.

III-نطبق تقنية الهجرة الكهربائية على قطرة من محلول يحتوي على حمضين امينيين (1) و(2) من انزيم البرمياز ضمن محلول ذو $PH=9.7$. النتيجة ممثلة في الوثيقة (4).


علما أن الجذر (R) للحمض (2) هو $[-CH_2-COOH]$ والجذر (R)

والحمض (1) هو $[-CH_2-C(=O)-NH_2]$

1- فسر هذه النتيجة ؟

2- مثل الصيغة الشاردية للحمضين الامينيين في هذه الحالة.



3- مثل هجرة الحمضين الامينيين في حالة الوسط ذو $PH=2$



التمرين الثاني :

تؤدي الإنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات نظرا للوظائف العديدة التي تقوم بها ، وتختلف الأدوار باختلاف المواد التي تؤثر فيها.

I/ يمثل الشكل 1 من الوثيقة 1 البنية الفراغية لإنزيم ARNase لوحظ ببرنامج الراسنوب، بينما يمثل الشكل 2 التفاعل الذي يقوم به.




1- حدد مستوى البنية الفراغية لهذا الإنزيم مع التعليل.

2- سم البيانات المرقمة في الشكل 2 مع تحديد نوع التفاعل.

3- يظهر الشكل 2 خاصية مهمة جدا للإنزيمات.

- حدد ما أهمية المستوى البنائي للإنزيم وموقع الأحماض الأمينية في النشاط الإنزيمي.

II/ يسمح تتبع تغيرات تركيز كل من المنتج P والمعد ES اثناء حدوث النشاط الانزيمي لإنزيم ARNase بالحصول على الوثيقة 2.



1- فسر تغيرات تركيز كل من المنتج P وES خلال الأزمنة $t_1-t_2-t_3$.

2- مثل برسومات تخطيطية العلاقة بين (E) و (S) و (P)

خلال الأزمنة $t_1-t_2-t_3$.

3- مما سبق ومن معلوماتك، قدم تعريفا للموقع الفعال.

أساتذة المادة يَمنون لكم التوفيق والنجاح

التصحيح المقترح لاختبار الفصل الأول وسلم التنقيط *3 علوم تجريبية*

التمرين الأول: (12.00 نقاط)		عناصر الإجابة	سلم التنقيط
0.5	*2	1/ التعرف على العناصر المرقمة:	1.25
		-1- حوصل افرازي. -2- هيولي. (سيتوبلازم). -3- نواة. -4- ش ه محبة. -5- ميتوكوندري.	
0.25	5*	2- دلائل نشاط الخلية البنكرياسية:	0.75
		- ش ه محبة نامية. - جهاز كولجي متطور. - عدد كبير من الحويصلات الإفرازية. - عدد كبير من الميتوكوندري مصدر الطاقة. - تموج الغشاء الهولي (الاطراح الخلوي للبروتين)	
0.25	3*	3- أ/ تعليل استعمال كل من:	01
		- اليوراسيل: لأنه قاعدة ازوتية تدخل في تركيب الـ ARN_m - الاحماض الامنية: لأنها وحدات بنائية تدخل في تركيب البروتين - الاشعاع: لتتبع مساره ومعرفة المركبات الناتجة.	
0.5	0.5	3- ب/ تفسير النتائج:	0.5
		- التجربة 1: ✓ بعد 5 سا يظهر الاشعاع اولا في النواة وهذا راجع لتركيب جزيئة الـ ARN_m خلال عملية النسخ نتيجة دمج اليوراسيل المشع في تركيبه.	
0.5	0.5	✓ وبعد 12 سا يظهر الاشعاع في الهيولي وهذا راجع الى انتقال الـ ARN_m من النواة الى الهيولي عبر الثقوب النووية.	0.5
		- التجربة 2: ✓ بعد 3د يظهر الاشعاع في الهيولي وهذا راجع لدخول (نفاذية) الاحماض الامنية من الوسط الى الهيولي (الميز). ✓ ثم ظهوره في ش ه المحبة يدل على تركيب البروتين نتيجة دمج الاحماض الامنية المشعة في تركيبه.	
0.5	0.5	- العلاقة بين (النواة) و(ش ه محبة): يتم تركيب الـ ARN_m انطلاقا من الـ ADN داخل النواة خلال النسخ ثم يخرج الى الهيولي، اين يتم تركيب البروتين خلال الترجمة.	01
		4- أ/ كتابة البيانات:	
0.25	*2	-1- مورثة (ADN) -2- انزيم الـ ARN بوليميراز. -3- ARN_m -4- ريبوزوم. -5- متعدد بيتيد.	0.75
		-6- نهاية الاستنساخ (المورثة). -7- بداية الاستنساخ (المورثة).	
0.25	2*	➤ تسمية العملية لكل شكل:	01
		- الشكل أ: الاستنساخ. - الشكل ب: الترجمة. - الشكل ج: التعبير المورثي.	
0.25	4*	4- ب// تحديد نوع الخلايا:	0.25
		- الشكل أ: خلية حقيقيات النواة. التعليل: عملية النسخ منفصلة عن عملية الترجمة. - الشكل ج: خلية بدائيات النواة التعليل: النسخ والترجمة تتمان في آن واحد.	



0.5

- جزيئة الـ ARN_m للانزيم العادي:

0.5

- جزیئة الم ARN_m للانزیم الطافر:

0.5

0.5

0.25

0.25


0.5

0.25

0.25


01

0.5




01 الحمض الاميني

0.25




0.25

2

التمرين الثاني: (08.00 نقاط)		عناصر الإجابة	سلم التقط
01	0.25 4*	I / 1 - <u>مستوى البنية الفراغية</u> : ثالفة.	
		<u>التعليق</u> : - سلسلة ببتدية واحدة. - وجود مناطق الانعطاف. - وجود البنيات الثانوية α و β	
0.5		2- <u>كتابة البيانات</u> :	
0.25		1- الركيزة S. 2- الانزيم E. 3- الموقع الفعال. 4- المنتج P_1 . 5- المنتج P_2 .	
0.5		- <u>نوع التفاعل</u> : تفاعل تفكيكي.	
0.5		3- <u>الخاصية</u> هي: لا يتأثر أثناء التفاعل.	
0.75		- <u>أهمية المستوى البنائي للإنزيم وموقع الأحماض الأمينية في النشاط الإنزيمي</u> : ان نوع وعدد وترتيب الاحماض الامينية المشكلة للإنزيم يحدد بنيته ونشاطه وخاصة تلك التي تشكل الموقع الفعال له حيث ترتبط مع مادة التفاعل الخاصة بواسطة روابط انتقالية نتيجة التكامل البنيوي ومنه تشكيل المعقد (انزيم-الركيزة) وبالتالي حدوث النشاط الانزيمي.	
03		II / 1- <u>تفسير تغيرات تركيز كل من P و ES خلال الأزمنة $t_1-t_2-t_3$</u> .	
		➤ خلال t_1 :	
0.5		✓ تزايد ضئيل في تركيز P وهذا راجع الى حدوث نشاط انزيمي ضعيف نتيجة ارتباط عدد قليل من الانزيمات بالركيزة اي تشكل عدد قليل من ES.	
0.5		✓ تزايد في تركيز ES راجع الى ارتباط الانزيم بالركيزة نتيجة التكامل البنيوي.	
		➤ خلال t_2 :	
0.5		✓ تزايد سريع في تركيز P وهذا راجع الى حدوث نشاط انزيمي سريع نتيجة ارتباط كل الانزيمات بالركيزة اي تشكل كل المعقدات ES.	
0.5		✓ ثبات في تركيز ES راجع الى تشبع كل الانزيمات بالركيزة اي تشكل كل المعقدات ES. نتيجة التكامل البنيوي.	
		➤ خلال t_3 :	
0.5		✓ تزايد ضئيل في تركيز P وهذا راجع الى حدوث نشاط انزيمي ضعيف نتيجة مشاركة عدد قليل من الانزيمات اثناء التفاعل لنقصان تركيز مادة التفاعل.	
0.5		✓ تناقص في تركيز ES راجع الى ارتباط عدد قليل من الانزيمات بالركيزة وبقاء بعض الانزيمات حرة نتيجة تناقص تركيز الركيزة في الوسط.	
01.5		2- <u>التمثيل برسومات تخطيطية العلاقة بين (E) و (S) و (P) خلال الأزمنة $t_1-t_2-t_3$</u> .	
0.5 3*			
0.5		3- <u>تعريف الموقع الفعال للإنزيم</u> : جزء محدد من الانزيم يتكون من مجموعة من الاحماض الامينية محددة وراثيا ، جذورها له القدرة على التعرف النوعي لمادة التفاعل واحداث التفاعل.	

التمرين الأول:

أولاً: تعتبر β -لاكتوغلوبولين من بين البروتينات المهمة والاكثر تواجد في مصّل الحليب وتمثل الوثيقة-1- اشكال مختلف البنيات الفراغية لهذا البروتين.




1-بأي برنامج تم الحصول على الأشكال الموضحة في الوثيقة-1-وبأي نموذج تم تمثيل الشكل (b).

2 - ما هو المستوى البنائي لبروتين β -لاكتوغلوبولين مع التعليل.

3- يمثل الشكل (e) من الوثيقة -1- البنية المؤطرة في الشكل (c) لنفس الوثيقة أما عن الأرقام فتتمثل ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية، باستغلال هذه المعلومات علل تباعد الأحماض الامنية في الشكل (e) وتقاربها في الشكل (c).

4- اكتب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر من الشكل (e) باستعمال صيغ هذه الأحماض الامنية الموضحة في الوثيقة -2-
 ثانياً: تمثل الوثيقة-3-الفحص المجهرى لبعض عضيات خلية بنكرياسية لها القدرة على إنتاج جزيئات بروتينية متخصصة، تم تحضير هذه الخلايا في أوساط مغذية مزودة بحمض اميني موسوم بالترثيوم (H_1^3) يمثل شكل -2- من الوثيقة -3- خطوات ونتائج التجريبية التي تم الحصول عليها.



- 1- ضع بيانات العناصر المرقمة للشكل- 1- من الوثيقة -3-
 - 2- فسر النتائج المحصل عليها في الشكل - 2 - من الوثيقة -3-
 - 3- ماهي العلاقة المستخلصة من مقارنتك للمميزات البنيوية الموضحة في الشكل-1- والنتائج المحصل عليها في الشكل-2-
 - 4- عملية بناء البروتينات تتم على مستوى الهيولى، ولإثبات قدرة مختلف عضيات هذه الهيولى على تركيب البروتين تجري التجربة التالية:
- توضع كل عضية على حدة في وسط زجاجي ، تضاف إليه احماض امينية مشعة، مركب غني بالطاقة (مادة ابيضية)، انزيمات متخصصة و ARNm . بعد عملية حضن لمدة زمنية كافية، تقدر كمية إشعاع البروتينات المصطنعة في مختلف الأوساط ، محتوى كل أنبوب و نتائجه ممثلة في الجدول التالي:

إشعاع البروتينات و كميتها (وحدة دولية)	العضيات
10.8	مستخلص خلوي كامل
1.3	ميتوكوندري
1.1	ميكروزومات (ريبوزومات + اغشية خلوية)
10.2	ميتوكوندري + ميكروزومات
0.4	المحلول الطافي النهائي
1.5	ميتوكوندري + المحلول الطافي النهائي
1.2	ميتوكوندري + ميكروزومات بعد غليها


ملاحظة: ميتوكوندري عضية مسؤولة عن انتاج طاقة

- استخلص الشروط الضرورية لاصطناع البروتين انطلاقا من الجدول

5- انجر رسم تخطيطي تفسيري توضح فيها المرحلة الثانية للمرحلة المدروسة في هذا الجزء.

التمرين الثاني:

- يتمثل النشاط الخلوي في العديد من التفاعلات الكيميائية الأيضية، تعمل الإنزيمات دورا أساسيا في تحفيز هذه التفاعلات الحيوية، للتعرف على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:
- أولاً:-** من بين الجزيئات التي تتركب أثناء التفاعل الالتهابي (réaction inflammatoire) نجد وسطا الهيستامين و السيتوكينات و بروتستاجلاندين تتسبب هذه الأخيرة (بروتستاجلاندين) في توسيع الأوعية الدموية و ارتفاع نفاذيتها، مما يؤدي إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها وهي إلتهاب حاد (آلام حادة في تلك المنطقة).
- يلجأ الأطباء لتقديم وصفة طبية تحتوي على دواء الإيبوبروفان (ibuprofène) أو الاسبرين (aspirine) لتقليل من حدة الألم ، ولمعرفة ما هو تأثير هذا الأدوية على التفاعلات الإلتهابية نقترح عليك هذه الدراسة.
- يمثل الشكل 1-1- من الوثيقة 1- التفاعلات الأيضية المؤدية إلى ظهور جزيئة البروستاغلاندين .**
- يمثل الشكل 2-2- من الوثيقة 1- نتائج قياس النشاط الإنزيمي لإنزيم سيكلو-أكسجيناز (COX) و هذا بوجود دواء الإيبوبروفان و الذي له نفس تأثير الأسبرين.**
- باستغلال شكل 1-1- من الوثيقة 1- :**
- 1- حدد نوع التفاعل الذي يحفزه كل إنزيم.
 - 2- ماهي المعلومة المستخرجة ، ماذا تستنتج؟




باستغلال شكل 2-2- من الوثيقة 1- :

- 3- حلل المنحنى، ماذا تستنتج؟
- 4- قدم فرضيتين تفسر فيها تأثير الإيبوبروفان على النشاط الإنزيمي لإنزيم (COX).

ثانياً: -التحقق من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين:

باستعمال برنامج الراسنوب تم الحصول على أشكال 1- من الوثيقة 2- و التي تمثل نماذج جزيئية لانزيم سيكلو-أكسجيناز بوجود الركيزة الطبيعية و الإيبوبروفان أشكال 1- من الوثيقة 2- ، اما الشكل 2- من الوثيقة 2- فيمثل رسم تخطيطي تفسيري لجزء من الإنزيم سيكلو-جيناز بوجود الركيزة الطبيعية أو الإيبوبروفان أو الأسبرين



1-ماذا تمثل الأرقام الموضحة في الوثيقة 2-


2-اشرح كيف يؤثر هذا الدواء (الإيبوبروفان) على اختفاء الاعراض الالتهابية (تقليل من حدة الآلام عند المصابين).

3-مثل معادلة التفاعل في الحالتين (حالة وجود الإيبوبروفان و في حالة غيابه) باستعمال الرموز موضحة ما يمثله كل رمز.

4-هل تم التأكد من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين ؟ علل

5-من هذه الدراسة و من معلوماتك وضح العلاقة بين بنية الفراغية للإنزيم و تخصصه الوظيفي.

ثالثاً: يتأثر إنزيم (COX) بشروط الوسط الذي يعمل فيه لتحديد تأثير كلا من درجة الحرارة ودرجة الـ pH على نشاطه، تم قياس تغيرات سرعة تفاعل الإنزيم بدلالة الـ pH ، وكذا قياس تغيرات سرعة تفاعل الإنزيم بدلالة درجة الحرارة، فالنتائج ممثلة في الأشكال (A و B) للوثيقة 3-



1- حدد من المنحنيين درجة الحرارة و درجة الـ pH الأمثل لنشاط إنزيم (COX).

2- من معلوماتك اقترح تفسير لآلية تأثير درجة الحرارة المنخفضة على نشاط الإنزيم.

3- اكمل منحنى الشكل (B) في حالة تزايد درجات الحرارة حتى 100°م مع التعليل.

4-اقترح تفسير لآلية تأثير درجة الـ pH على نشاط الإنزيم.

بالتوفيق والسداد

الحل المقترح

التمرين الأول:

أولاً : 1- تم الحصول على أشكال الموضحة في الوثيقة -1- : باستعمال برنامج **الراستوب**، تم تمثيل الشكل (b) بنموذج

الكرة (مكسد)

2-المستوى البنائي: **رابعي** لأن الشكلين (a و b) يبينان وجود **تحت وحدتين** (سلسلتين ببتيديتين ذو بنية ثالثة)

3-تعليل تباعد الأحماض الأمينية في الشكل (e) لأن الأرقام تمثل ترتيب الأحماض الأمينية وموقعها بالضبط في السلسلة

الببتيدية والناتج عن تتابع النيكليوتيدي للمورثة ، أما عن تقاربها في الشكل (c) فيفسر بانطواء السلسلة الببتيدية أثناء


النضج (في جهاز غولجي) مما يسمح بتقارب الأحماض المينية و تقابلها بالجذور

أو : أثناء نضج البروتين حدثت له انطواءات عديدة ، سمحت لأحماض امينية ذات ارقام متباعدة في السلسلة اللولية بأن

تتقارب فضائياً .

ثانياً: 1- البيانات: (تم قبول الإحتمالين)

1- ش ه ف
2-جهاز غولجي
3-حويصلات إفرازية
4- افراز الخلوي




2-تفسير نتائج الشكل -2-:

لأنها مقر تركيب و تصنيع البروتين لغزارتها بالريبوزومات	ظهور الإشعاع على مستوى العنصر -1-
لأنها مقر نضج البروتين	ظهور الإشعاع على مستوى العنصر -2-
لأنها مسؤولة عن نقل البروتين	ظهور الإشعاع على مستوى العنصر -3-
لأن البروتين ينتقل من موقع نضجه إلى موقع نشاطه خارج الخلية ويكون بظاهر افراز الخلوي	ظهور الإشعاع على مستوى العنصر -4-

3-العلاقة المستخلصة من مقارنتك للمميزات البنيوية: ان تركيب البروتين يتم في ش ه ف على مستوى الريبوزومات ثم ينتقل إلى جهاز غولجي ليكتمل نضجه ثم ينتقل عبر الحويصلات الإفرازية الكولجية لتفرز بظاهرة الإفراز الخلوي لينتقل إلى المكان الذي سيمارس فيه وظيفته.

4- استخلاص الشروط الضرورية لاصطناع البروتين من الجدول:

- ريبوزومات + أغشية خلوية (ميكروزومات)
- طاقة



5-انجار رسم تخطيطي تفسيري توضح فيها المرحلة الإستطالة لعملية الترجمة

التمرين الثاني:

أولاً: 1- نوع التفاعل الذي يحفز كل إنزيم انطلاقاً من الشكل 1- : كلا الإنزيمين سيكلو-أكسجيناز و الفوسفوليبياز يحفزان تفاعل تحويلي (تحويل مادة واحدة)

2- المعلومة المستخرجة : لكل إنزيم مادة التفاعل خاصة به ، للإنزيم تخصص نوعي لمادة التفاعل

3-أ- تحليل منحنى الشكل 2- : يمثل المنحنى النشاط الأنزيمي لإنزيم سيكلو-أكسجيناز بدلالة مادة الإيبوبروفان حيث يلاحظ عند انعدام الإيبوبروفان في الوسط يكون النشاط الأنزيمي أعظمي (100%) ثم يتناقص النشاط الأنزيمي تدريجياً كلما ازداد تركيز الإيبوبروفان حتى ينعقد النشاط كلياً عند التركيز.....

ب-الإستنتاج: مادة الإيبوبروفان تثبط، تكبح، توقف نشاط إنزيم سيكلو-أكسجيناز


4-الفرضيتين :

- الإيبوبروفان ينافس مادة التفاعل (حمض الازاشيدونيك) على الموقع الفعال (تثبيط تنافسي)
- وجود الإيبوبروفان في الوسط يسبب تغيير إنزيم سيكلو-أكسجيناز لبنيته الفراغية مما يمنع تثبيت الركيزة على الموقع الفعال (تثبيط غير تنافسي)

ثانياً: 1- تمثل الأرقام : موقع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال إنزيم سيكلو-أكسجيناز

2- شرح كيفية تأثير الدواء: للإيبوبروفان بنية فراغية شبيهة لحمض الازاشيدونيك تسمح له بالتثبيت على الموقع الفعال لإنزيم سيكلو-أكسجيناز فتنافس بذلك الركيزة الأصلية (حمض الازاشيدونيك) فيمنع تحويل هذه الأخيرة إلى جزيئات البروستاغلاندين المسؤولة عن ظهور الإلتهاب الحاد بذلك يتوقف الإحساس بالألم

3- المعادلة:



4-نعم تم التأكد من إحدى الفرضيات السابقة

ان الإيبوبروفان مثبط تنافسي لنشاط إنزيم

سيكلو-أكسجيناز لان وجوده في الوسط

ينافس للركيزة على الموقع الفعال فتوضعه

على الموقع الفعال يمنع تشكيل معقد ركيزة-

إنزيم

5-العلاقة بين البنية و التخصص الوظيفي

للإنزيم:


ان عدد و نوع و ترتيب الأحماض الأمينية يسمح بتشكيل بنية فراغية محددة للإنزيم خاصة تلك المشكلة للموقع الفعال التي تسمح بتشكيل موقع لتثبيت الركيزة و موقع تحفيز التفاعل و هذا ما يمنح الإنزيم تخصصه الوظيفي العالي

ثالثاً: 1- درجة الحرارة المثلى 20° و درجة الـ pH الأمثل 7.4

2- ينخفض نشاط الإنزيم عند انخفاض درجة الحرارة وقد يتوقف النشاط كلياً و بصورة عكسية بسبب قلة حركة الجزيئات (لا يتم تخريب البنية الفراغية).

3-

في هذه الحالة يتم تخريب بنية الإنزيم




4-تأثير درجة الـ pH على نشاط الإنزيم:

تؤثر درجة الحموضة على شحنة المجموعات الكيميائية الحرة في جذور الأحماض الأمينية و خاصة تلك الموجودة في الموقع الفعال مما يمنع حدوث التكامل بين المجموعات الكيميائية للإنزيم في الموقع الفعال و المجموعات الكيميائية لمادة التفاعل.

التمرين الأول : (05 نقاط)

تحتل البروتينات مركزا أساسيا في بناء و تركيب المادة الحية ، و كذلك في القيام بالوظائف الحيوية المختلفة داخل الخلايا ، يساهم في تركيب البروتين عدة بنى تعمل بتنسيق كبير بينها .

I - تبين الوثيقة (1) مخططا بسيطا لإحدى آليات تركيب البروتين في خلية حقيقية النواة .



- (1) قدم عنوانا مناسباً للوثيقة 1 ثم بين مقر حدوث الظاهرة المدروسة على مستوى الخلية .
- (2) تعرف على الأحداث الممثلة بالأرقام من 1 إلى 5 - مع الشرح (باختصار) .
- (3) يتميز العنصر (س) ببنية فراغية تسمح له بالتخصص الوظيفي وضح ذلك .
- (4) تسبق المرحلة الموضحة في الوثيقة (1) مرحلة مهمة في تحديد بنية العنصر (6) ، ماهي و ما أهميتها مدعماً الإجابة برسم تخطيطي عليه البيانات اللازمة .

التمرين الثاني: (7 نقاط)


البروتينات جزيئات حيوية هامة نظرًا لتعدد وظائفها في الخلية ، ولغرض تحديد العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته نقترح ما يلي:

I / تمثل (الوثيقة 1-1) جدول جذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في بناء جزيئة الإنزيم الممثل في الوثيقة (1-1) بالإضافة إلى رقم تسلسلها والـ pHi الخاص بكل حمض.

الرقم	جذر الحمض الأميني	pHi
105	R(Asp) —CH ₂ —COOH.	3
35/11	R (Cys) —CH ₂ —SH.	5
163	R (Lys) —(CH ₂) ₄ —NH ₂	9.8

الوثيقة 1-1

الوثيقة 1-1 ب



1- صنف هذه الأحماض الأمينية . مع التعليل.

2- ماهو اكبر عدد ممكن من أنواع ثلاثي

الببتيد الذي يمكن تركيبها انطلاقا

من هذه الأحماض. ماذا تستنتج؟ وكيف تعلق

التنوع اللامتناهي لمتعددات الببتيد؟

II / يمكن باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية

التعرف على بعض خواص الأحماض الأمينية

السابقة.

1- اكتب الصيغة الكيميائية المفصلة للأحماض

الأمينية الثلاثة في وسط ذو $PH = 5$

(علما أن الجذور تتأثر بالوسط).

2- مثل صيغة الجزء المؤطر من الوثيقة (1 - ب) بالاعتماد على الجواب السابق.

3- استنتج أنواع الروابط (α ، β) .

4- استخلص مستوى البنية لهذه الجزيئة ، مع التعليل.


5- أعد تمثيل صيغة الجزء المؤطر من الوثيقة (1 - ب) في وسط ذو $PH = 1$.

6- استنتج علاقة سلوك الأحماض الأمينية في الوسط بالبنية الفراغية للبروتين وبالتالي وظيفته.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتمثل النشاط الخلوي في العديد من التفاعلات الكيميائية الأيضية، تعمل الإنزيمات دوراً أساسياً في تحفيز هذه التفاعلات الحيوية. للتعرف على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:

I. تمثل الوثيقة (1) مراحل تشكل معقد (إنزيم - مادة تفاعل) تم الحصول عليها ببرنامج راسنوب.




أ - تعرف على البيانات المرقمة.


ب - قارن بين شكلي الوثيقة (1). ماذا تستنتج حول طريقة عمل هذا الإنزيم؟

II. من أجل دراسة العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي نقوم باستعمال ExAO لدراسة نشاط إنزيم اللاكتاز الذي يفكك اللاكتوز إلى جلوكوز وغلاكتوز، في التجارب التالية :

التجربة 2	التجربة 1	
في تركيب تجريبي يحتوي على اللاكتوز و بتركيز ثابت مضاف إليه إنزيم اللاكتاز في درجة حرارة ثابتة عند 37 م° و نغير في كل مرة PH الوسط المنحني الشكل (ب) من الوثيقة 2 يمثل تغيرات كمية اللاكتوز بدلالة PH الوسط	يوضع في أنبوب اختبار ذو $PH = 8$ و ثابت ، كمية من إنزيم اللاكتاز بتركيز ثابت أيضا و في وجود اللاكتوز نعاير (نقيس) كمية الجلوكوز المنتجة خلال الزمن مع تغيير درجة الحرارة في كل مرة فنحصل على الشكل (أ) من الوثيقة 2 .	الشروط



الشكل ب



الشكل ب

الوثيقة -2-

- 1- حلل و فسر منحنى الشكل (أ) و الشكل (ب) من الوثيقة 2.
- 2- ما هي المعلومات المستخلصة من التجربتين فيما يخص نشاط إنزيم اللاكتاز ؟

التجربة الثالثة :

الجدول الموالي يمثل نتائج حساب السرعة الابتدائية لنشاط إنزيم اللاكتاز V_i على لاكتوز في وجود تراكيز متزايدة من مركب الثيولاكتوز (مركب شبيه باللاكتوز) حيث تكون درجة الحرارة ثابتة عند 37 م° و $PH = 8$ ثابت

تركيز ثيولاكتوز وحدة افتراضية UA	0	12	33	80	82	130
السرعة الابتدائية V_i وحدة افتراضية / الثانية	1.25	0.83	0.5	0.41	0.39	0.37

- 1- أنجز منحنى بياني يعبر عن تغير V_i بدلالة تركيز الثيولاكتوز
- 2- فسر نتائج التجربة مدعماً إجابتك برسم وظيفي .

III/ من خلال المعلومات المتوصل إليها و معلوماتك اكتب نصاً علمياً تبين فيه مفهوم الإنزيم و خصائصه الوظيفية.

حظ موفق للجميع

الفقرات

الاجابة

التدقيق

2 x 0,25
0,5 =

(2 x 0,25)
5 x

2,5 =

0,25

2 x 0,25

0,5 =

2 x 0,25
0,5 =


0,1

طبع بأكمله فقط

- 1- عنوان الوثيقة : رسم تخطيطي لآلية الترجمة
- 2- مقترعا : الفيول
- 3- الأحداث :
- 1- > تنشط الـ $ARNE$ الخاص بالهبة : يترجم كما لها تبييت المقصود الأهمين على الـ $ARNE$ خاص به ودالك بواسطة ما تسمى بوحدة
- 2- > مرحلة الانطلاق الترجمة : يتوقع الـ ARN الحامل المقصود الأهمين $7e5$ وموافقا لراصة الانطلاق AUG في الموقع P على مستوى الريبوزوم
- 3- > تشكل هبة الانطلاق
- 4- > مرحلة الاستطالة : تدمج رابطة بين المقصود الأهمين السابق والمقصود الأهمين الحالي. يتم انزاحة الريبوزوم بمراصة رابطة بين الموقع A تساهل لتبييت الـ ARN الحامل للمقصود الأهمين التالي
- 5- > مرحلة نهاية الترجمة : يكمل الريبوزوم (ان) رابصة التوقف فيتحرر السلسلة الببتيدية وتحت وحده الريبوزوم
- 6- > تحرر السلسلة الببتيدية وتاخذ بنسج فراغية حسب تصميمها الوظيفي
- 7- > تخصص الوظيفة للريبوزوم وتنبأ الفراغية : يتكهن الريبوزوم من تحت وحده
- 8- > تحت الوحدة الصغرى لها مواقع لقراءة رامزات الـ $ARNm$
- 9- > تحت الوحدة الكبرى بها موقعين تفاعليين A و P لتبييت الـ $ARNE$ حامل للأماض الهبة وهذا ما يسمح له بأداء وظيفته تحويل اللغة النورية الى بروتينية - الترجمة -
- 10- > المرحلة : الاستشاح (النسخ) (0,25)
- 11- > أهميتهما : تفتح المعلومة الوراثية المتواجدة في النواة المحتملة في تاليف لينغليوتيد ADN سلسلة الـ $ARNm$ بها يمكن نقلها
- 12- > مقر تركيب البروتين (0,25)
- 13- > رسم تخطيطي لآلية النسخ
- 14- > سلسلة الـ ADN (المورثة) - تفتح النسخ تعال لتليغليوتيدات
- 15- > الـ $ARNP$ و انفتاح المورثة - استطالة الـ $ARNm$

التعليق	عناصر الإجابة	الن
(8x0,25) 3% = 1,5	12- تجميع مع التعليل: - Asp < حامض ووجود وظيفة كربوكسيلية في الجذر. اما في - Lys < متعادلة عدم وجود آب وظيفتها ايجابية في الجذر الكربوكسيلية والامينية - Lys < قاعدية لوجود وظيفتها ايجابية في الجذر المحيط عدد ممكن من التفاعلات البينية: احتمال الاول: $1 \times 2 \times 3 = 6$ احتمالات (عدد الاحتمالات) احتمال الثاني: $3^3 = 27$ احتمالات (احتمال التكرار) 13- الحيف الكيميائية عند $pH = 5$.	
3x0,5 = 1,5	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array}$ (Lys) $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$ (Asp) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$ (Lys)	
0,5	14- صيغة الجذر المؤطر عند $pH = 5$. $\begin{array}{c} -\text{NH} - \text{CH} - \text{CO}- \\ \\ \text{CH}_2 \quad (\text{Asp}) \\ \\ \text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \quad (\text{Lys}) \end{array}$ رابطة الشاردية	
2x0,25 = 0,5	13- أنواع الروابط β < حمور كبريتية α < شاردية	
3x0,25 = 0,75	14- عسثون البنية: ثالثية التعليل: * يتكون من ببتيد واحدة * شديدة الالتصاق * وجود الروابط التي تقاطع انتم اما شاردية وكبريتية	

حيطة الجزء المؤطر عند $pH = 1$



كسر الرباط
الشاردييه



العلاقة : لتأين الوطائين الجانبيين الحرة للأحماض الأمينية
في ال pH (مثال $pH = 5$) تسمح بتكوين روابط تحافظ
على واستقرار بنية البروتين وبالتالي وحيدته
وتغير ال pH (مثال $pH = 1$) يؤدي إلى تكسير هذه الروابط
وبالتالي تغير البنية وفقدان الوحدية

IP

- البيانات : 1 = ركيذة 2 = موقع الفاعل
- المقارنة : الشكل (4) : الأحماض الأمينية لموقع الفاعل في بيئات الركنية
متساوية
- الشكل (ب) : المتماثل للموقع الفاعل في وجود الركيذة
متقاربة
- الاستنتاج : الأثر لم يغير بنية الموقع الفاعل بالتأثير التحفيزي
للتشكل فقط ، فتركيبه ركيذة لأنه شرط عمل الإنزيم
- التجريب : الشكل (4) : يمثل المنحنى تغيرات تركيز الغلوكوز مع كالة الزمن
في أوساط مختلفة درجة الحرارة
- عند درجة الحرارة (35) ترايد سواد في تركيز الناتج الغلوكوز المحلول
التقابل ، إلى أن يصل لتركيز (35 و 10) بعد 10 د
- عند 10 د مع تغير درجة حرارة الوسط إلى (50) تركيز الغلوكوز
تأيت عند قيمة السابقة (35 و 10)
- عند 25 د مع تغير درجة حرارة الوسط إلى (10) يعود تركيز
الغلوكوز إلى ترايد بشكل طبيعي

1/4

1/4

3

0.5

0.5

0.7

2 x 0.8
0.5

2 x 0.8
0.5

0.5

4 x 0.8

4.00

- عند زرع مع تغير درجة الحرارة الوسط، الماء (80م) يبقى تركيز الكلور ثابت ويبقى في درجات حرارة (37م).

التفسير:

- عند (37م): حدوث التفاعل الحيوي الكامل البشري في تركيزه والموقع النضج نتيجة تشتت المعقد ما يزيد تركيزه في درجة الحموضة للتفاعل.

- عند (50م): توقف التفاعل لتثبيت حركة الجزيئات وتغير الشحنة الفراغية للأزيم وخاصة الموقع الفعال مما يبيق تشتت المعقد ما يزيد تركيزه.

- عند (10م): عودت التفاعل لأنه تخرب عكوس لا تزيد الاستعدادة نشاطه بيمه لأن درجة الحرارة منخفضة تقل التصادات بين الأفرزيم والركيزة.

- عند (80م): عدم حدوث التفاعل لتخرب الأفرزيم بحدس الواسط التي تحافظ على استقرارها يبيق تشتت المعقد ما يزيد تركيزه.

- عند (37م): عدم انشاطات الأفرزيم نشاطه لأن درجة الحرارة العالية تؤدي إلى تخرب غير عكوس (نهائياً).

الشكل (ب):

- التحليل: يمثل المنحنى تغيرات تركيز اللاكتوز بدلالة الزمن في أوساط مختلفة درجة الحموضة (pH).

- عند $pH = 8$ ، انخفاض سريع في تركيز (الركيزة) اللاكتوز من (150 إلى 120) و (100).

- عند $pH = 4$ ، انخفاض تدريجي في تركيز اللاكتوز من (150 إلى 120) و (100).

- عند $pH = 1$ ، تركيز اللاكتوز ثابت عند قيمة السابقة (5 و 10) جولة التجربة.

التفسير:

- عند $pH = 8$ حدوث نشاط انزيمي لأنها درجة الحموضة تسمح بتشكل المعقد ما يزيد تركيزه.

- عند $pH = 4$ و $pH = 1$ ، انخفاض (1) لأن يتوقع النشاط الأفرزيم لتأثر الجدران الجانبية للأغشاه الخلية للأفرزيم أن الحالة الكهرلية فتصبح شحنة موجبة مما يؤدي إلى تغير الشحنة الفراغية للأفرزيم وخاصة للموقع الفعال مما يعيق تشكل المعقد ما يزيد تركيزه.

5x0,25

1,25

3x0,25

0,75

3x0,25

0,75


٢- تاسير الاجابات

التقدير

- ١- المعلومات المستخلصة
- ٢- درجة الحرارة للوسط ودرجة الصوفة (م) تأثير على نشاط الانزيم
- ٣- رسم المخطط

كم ٥ x ٢
كم ٥ =

المعلومات المستخلصة
درجة الحرارة للوسط ودرجة الصوفة (م) تأثير على نشاط الانزيم



- ١- النقص العلمي
- ٢- التعليل

النقص العلمي
الانزيم وسيط حيوي للتفاعل الكيمائي وحيوية بيولوجية
يتصير نسبة فرائضة نوعية بوجود تجويف يسمى بالموقع الفعال
يتكامل ثيولاكتوز الركيزة مشكلا معقد انزيم - ركيزة
لحدوث التفاعل وتاثير نوعي
يتاثر الانزيم بدرجة الحرارة والحموضة للوسط مما يؤثر في التغير
في النسبة الفرائضة للانزيم وخاصة الموقع الفعال وبالتالي يعيق
تحرير التفاعل لعدم التفاعل المودع - انزيم - ركيزة

كم ٣ x ٥
كم ٥٥ =

حج ٨ نقاط

كم ٥ x ٢
كم ٥ =
تابع

الاستنتاج: تختلف البيئات من حيث نوع وتركيب وعدد الأتفاعلات
الاحتمالية
تواجه عدد لا حصر له للبيئات كما جتكا في عدد نوع
ترتيب الأتفاعلات الداخلية في تركيبتها والارادح للموت
حج ٨ نقاط على تركيبتها

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية ورقلة

وزارة التربية الوطنية

المدة: 2.5 ساعة
التاريخ: 2016/12/06

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية

ثانوية العربي قويدر
المستوى : 3 ع ت

أجب على أسئلة التمارين التالية :
التمرين الأول : ((10 نقاط)) :

1 - رغم تواجد المعلومة الوراثية في النواة إلا أنها تؤثر عن بعد في التركيبات التي تحدث في سيتوبلازم الخلية ، لإبراز العلاقة بين المورثة والبروتين والنمط الظاهري ، نقترح دراسة الوثيقة التالية :

الشكل (د)

الشكل (ج)

الشكل (ب)


الوثيقة (1)

الشكل (أ)


		الوضع الثاني				
		U	C	A	G	
الوضع الأول	U		Ser	Tyr Tyr STOP	Cys Cys STOP	U C A G
	C		Pro	His	Arg Arg Arg	U C A G
	A	Leu	Thr		Ser Ser Arg	U C A G
	G	Met	Lys		Arg Arg	U C A G
		Val	Ala	Glu	Gly Gly Gly	U C A G

- 1 - ماذا تمثل الأشكال (أ ، ب ، ج ، د) الموضحة في الوثيقة (1) ؟
- 2 - تعرف على العناصر المرفقة للأشكال ب ، ج ، د ، د
- 3 - ماهو ناتج الإماهة الجزئية والكلية للعنصر رقم 2 من الشكل (ج) ؟
- 4 - يمثل الشكل (أ) مشهدا من نافذة برنامج anagene للأحماض الأمينية الإحدى عشر الأولى للسلسلة β من جزيئة الهيموغلوبين Hba السليمة و Hbs الطافرة .
أ - إذا علمت أنه تم حساب 147 حمض أميني لكل جزيئة فكم يقدر عدد القواعد الأزوتية الخاصة بمورثتيهما ؟
ب - مثل بالإعتماد على جدول الشفرة الوراثية المقابل الـ ARNm المشرف على تركيب هذا الجزء من الـ Hba و Hbs ؟
ج - حدد التغير الذي طرأ على جزء المورثة المشرفة على تركيب الهيموغلوبين عند الشخص المصاب ؟
- 5 - الظاهرة التي يظهرها الشكل (د) لا تحدث إلا عند أنواع خاصة من الكائنات الحية . ماهي الكائنات المعنية بهذه الظاهرة ؟ و ماهو مقررهما ؟
- II - عندما قمنا بإماهة كلية للعنصر (4) من الشكل (ب) تحصلنا على أحماض أمينية مجموعة منها صيغها الكيميائية مبينة في الوثيقة (2)


- 1- مثل صيغة العنصر (4) المكون من : فالين - حمض الأسبارتيك - أسباراجين ؟
- 2 - نفصل خليط الأحماض الأمينية الثلاثة السابقة بواسطة جهاز الرحلان الشاردي حيث أن ورقة الفصل مبللة بمحلول ذو $4 = \text{PH}$.
نتيجة الفصل ممثلة بالوثيقة (3)



الوثيقة (2)



النتيجة المتحصل عليها





الوثيقة (3)

3 - ماهو الحمض الأميني الذي تدل عليه البقع (أ ، ب ، ج) على ورقة الفصل . علل ؟

التمرين الثاني : ((10 نقاط)) :

الانزيمات وسائط حيوية هامة في حياة الخلية كونها تسرع تفاعلاتها الحيوية .
الليزوزوم إنزيم يتكون من 129 حمض أميني تفرزه الكريات الدموية البيضاء ذات النواة المفصصة تلعب دورا كبيرا في تحطيم (تفكيك) المحفظة السكرية لبعض أنواع البكتيريا . لدراسة خصائص هذه الانزيمات أجرينا الدراسة التالية :
- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) بنية إنزيم الليزوزوم باستخدام برنامج Rastop ، بينما الشكل (2) البنية الأولية له




الوثيقة (1)

يمثل الشكل 1 البنية ثلاثية الأبعاد لإنزيم الليزوزوم بإستعمال النموذج المكسد
وبينما يمثل الشكل 2 البنية الأولية لهذا الإنزيم و تمثل الأشرطة الأحماض
الأمينية الداخلة في تشكيل العنصر (1) من الشكل 1

- 1- ماذا يمثل العنصر (1) من الشكل (1) ؟ و ماهي خصائص هذا الجزء من الإنزيم ؟
- 2- علل تباعد العناصر المرقمة في الشكل (2) و تقاربها في العنصر (1) من الشكل (1) من الوثيقة (1) ؟
- 3- يوجد عدة ليزوزومات طافرة منها LYZ 35 و LYZ 124 حيث أن الطفرات نتجت عن استبدال الأحماض الأمينية 35 و 124 على التوالي بأحماض أمينية أخرى ، عند تتبع نشاط هذين الإنزيمين وجد أن LYZ 124 يعمل بنفس كفاءة الإنزيم الطبيعي بينما LYZ 35 نشاطه معدوم .

- فسر اختلاف نشاط الإنزيمين الطافرين ؟

II - يتواجد في الأوساط الحيوية التي تعمل فيها الإنزيمات مركبات كيميائية تسمى بالمؤثرات و التي تعمل على تغيير حركية التفاعلات الإنزيمية:




الوثيقة (2)

تمثل الوثيقة (2) كيفية تأثير مؤثرين X و Y على السرعة الابتدائية لنشاط إنزيمين A و B حيث :

- ✓ المنحنى (1): تغير السرعة الابتدائية V_i في غياب المؤثر
- ✓ المنحنى (2): تغير السرعة الابتدائية V_i بوجود المؤثر بتركيز ضعيف.
- ✓ المنحنى (3): تغير السرعة الابتدائية V_i بوجود المؤثر بتركيز قوي

- (1) إستخرج من تحليل النتائج تأثير كل مؤثر ؟
- (2) فسر تطور السرعة الابتدائية (V_i) نحو السرعة القصوى V_{max} بزيادة تركيز الركيزة في حالة الانزيم A ؟
- (3) استنتج كيفية تأثير كل من X و Y على السرعة الابتدائية للنشاط الإنزيمي A و B. ؟
- (4) تصنف المؤثرات على النشاط الإنزيمي إلى منافسة وأخرى غير منافسة ، تمثل الوثيقة (2) رسمين تخطيطيين لآلية تأثيرهما :



- اعتمادا على المعلومات المقدمة و الوثيقة (3) قدم فرضية تفسر بها تدخل كل نوع من المؤثرين (X) و (Y) ؟

تمنيتي لكم بالتوفيق
أستاذ المادة : عرفة محمد رياض

التصحيح النموذجي لامتحان الفصل الأول

العلامة		تصحيح مفصل									
مجموع	مجزأة	التمرين الأول : 10 نقاط									
1	4 * 0.25	I - 1- تعرف على الأشكال الوثيقة (1): - الشكل (أ): تتابع سلسلتي β للهيموغلوبين A و S. - الشكل (ب) : مخطط يوضح آلية الترجمة. - الشكل (ج) : بنية جزيئة ADN - الشكل (د) : الترجمة على مستوى البوليزوم.									
3	12* 0.25	2- التعرف على العناصر المرقمة : الشكل (ب): 1 - ARNt. 2- رامزة مضادة. 3- رابطة بيتيدية. 4- عديد بيتيد. 5- تحت وحدة كبرى. 6 - ARNm. 7- تحت وحدة صغرى. الشكل (ج) : 1 - حمض فوسفوريك. 2- نكلوتيدة. 3- رابطة هيدروجينية. 4- ديوكسي ريبوز. الشكل (د) : 1- ريبوزوم. 2 - ARNm.									
0.75	3 * 0.25	3 - ناتج الإماهة الجزئية: نكليوزيدة + حمض فوسفوريك. <u>ناتج الإماهة لكلية:</u> قاعدة + ديوكسي ريبوز + حمض فوسفوريك.									
0.5	0.5	4 - أ عدد القواعد : عدد الأحماض الأمينية 3×147 (عددالقواعد الأزوتية لكل رامزة) + 3 (ثلاثية التوقف). علما أن Met محتسب ضمن 147 كما هو مبين في الشكل (أ) = 444.									
		ب- تمثيل ARNm المشرف على تركيب Hba و Hbs:									
1	2 * 0.5	<table><tr><td>Hba</td><td>MetValHisLeuThrProGluGluLysSerAla</td></tr><tr><td>ARNm</td><td>AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GAG-GAG-AAG-UCU-GCC</td></tr><tr><td>Hbs</td><td>MetValHisLeuThrProValGluLysSerAla</td></tr><tr><td>ARNm</td><td>AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GUG-GAG-AAG-UCU-GCC</td></tr></table>		Hba	MetValHisLeuThrProGluGluLysSerAla	ARNm	AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GAG-GAG-AAG-UCU-GCC	Hbs	MetValHisLeuThrProValGluLysSerAla	ARNm	AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GUG-GAG-AAG-UCU-GCC
Hba	MetValHisLeuThrProGluGluLysSerAla										
ARNm	AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GAG-GAG-AAG-UCU-GCC										
Hbs	MetValHisLeuThrProValGluLysSerAla										
ARNm	AUG-GUG-CAC-CUG-ACU-CCU-GUG-GAG-AAG-UCU-GCC										
0.5	0.5	ج- التغير الحادث على مستوى المورثة المشرفة : تم على مستوى القاعدة الثانية في الثلاثية السابعة حيث استبدلت القاعدة T بالقاعدة A.									
0.5	2 * 0.25	5 - الظاهرة التي يظهرها الشكل (د) الكائنات معنى بها : هي حقيقيات النواة و مقرها الشبكة الهيولية الفعالة. (لأن شكل البوليزوم منتظم نتجة الاستقرار الناتج عن تثبيت الريبوزومات على الشبكة ه الفعالة).									
		II - 1 - تمثيل صيغة العنصر (4) من الوثيقة (2) :									
1	4 * 0.25 صحة الصغة الكيميائية + الاشارة الى الروابط البيتيدية + التسمية	<table><tr><td></td><td>A. Aspartique Asp (D)</td><td>Valine Val (V)</td></tr><tr><td>Arginine Arg (R)</td><td>رابطتان بيتديتان</td><td>ثلاثي بيتيد</td></tr></table>			A. Aspartique Asp (D)	Valine Val (V)	Arginine Arg (R)	رابطتان بيتديتان	ثلاثي بيتيد		
	A. Aspartique Asp (D)	Valine Val (V)									
Arginine Arg (R)	رابطتان بيتديتان	ثلاثي بيتيد									

2- التعرف على بقع الأحماض الأمينية (أ ، ب ، ج) :

- تمثل البقعة (أ) : حمض الأميني الفالين ، بينما البقعة (ب) : هي الحمض الأميني الأسبارجين
- التعليل : لأن $PH < PHi$ الوسط سلكا سلوك القاعدة في الوسط ذو $PH = 4$ فاكسب شحنة موجبة (+) واتجه نحو القطب السالب (-) مع العلم أن شحنة الفالين أكبر لأن فرق الحموضة أكبر
- القاعدة (أي كلما كان الفارق بين PH الوسط و PHi للحمض الأميني كبيرا كلما كانت هجرة هذا الحمض كبيرة جهة أحد القطبين تبعاً لشحنته) .

- أما البقعة (ج) فتمثل الحمض الأميني الأسباراتيك التعليل : لأن $PH > PHi$ الوسط سلك سلوك الحمض في الوسط ذو $PH = 4$ فاكسب شحنة سالبة (-) واتجه نحو القطب الموجبة (+)

10 نقاط

التمرين الثاني :

- 1 - 1 - ان العنصر (1) من الشكل (1) الخاص بالوثيقة (1) : يمثل الموقع الفعال من أنزيم الليزوزوم .
خصائصه :- حيز صغير من الانزيم يمثل موقع الارتباط بالركيزة (مادة التفاعل)

- يتكامل بنيويا مع مادة التفاعل
- يتكون من عدد و نوع و ترتيب معين من الأحماض الأمينية ليست على التسلسل على حسب المعلومة المورثة
- يتكون من موقعين : موقع التثبيت لتثبيت مادة التفاعل ، و موقع التحفيز للتأثير على مادة التفاعل

- 2 - يعود تقارب الأحماض الأمينية في الشكل (1) رغم تباعدها في الشكل (2) الى إنطواء السلسلة الببتيدية و تشكل روابط مختلفة ، مما يجعل الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ليست متتالية كما في السلسلة الخطية .

3 - تفسير اختلاف نشاط الانزيمين الطافرين :

• في حالة الانزيم الطافر LYZ 35 :

تم استبدال الحمض الأميني رقم 35 بحمض أميني آخر و هذا الحمض الأميني يدخل في تركيب الموقع الفعال للإنزيم مما يؤدي الى تشوّهه (أي يحدث عدم التكامل بين الركيزة و الموقع الفعال) أو تصبح المجموعة الطرفية للحمض الأميني (R) (رقم 35 الجديدة لا تستطيع التأثير على الركيزة و بالتالي لا يحدث التحفيز الانزيمي في هذه الحالة .

• في حالة الانزيم الطافر LYZ 124 :

استمر نشاط هذا الانزيم بنفس كفاءة الانزيم الطبيعي و هذا راجع الى أن هذا الحمض الأميني لا ينتمي الى الموقع الفعال فلا يؤثر هذا على التحفيز الانزيمي عند هذا الانزيم الطافر

II - 1 - استخراج تأثير كل مؤثر :

الحالة A : يؤدي المؤثر X الى تخفيض سرعة التفاعل و لكنه لا يغير في السرعة القصوى (V_{MAX}) ، يلاحظ أنه كلما زادت كمية المؤثر كلما زاد الانخفاض في السرعة الابتدائية .

الحالة B : يؤدي المؤثر Y الى انخفاض سرعة التفاعل الانزيمي و تغيير في السرعة القصوى (V_{MAX}) التي يزداد تناقصها بزيادة كمية المؤثر في الوسط .

2- تفسير تطور سرعة التفاعل V نحو قيمة قصوى بزيادة تركيز الركيزة S :

يرجع هذا التطور نحو سرعة (V_{MAX}) الى كون أن كلما زاد تركيز الركيزة في الوسط الذي يحتوي على تركيز ثابت للإنزيم كلما زاد عدد الجزيئات الانزيمية المتدخلة في التفاعل بحيث تصبح سرعة التفاعل ذات قيمة قصوى عندما تكون كل الجزيئات الإنزيمية مشغولة ((تسمى الظاهرة بالتشبع))

3 - استنتاج كيفية تأثير كل مؤثر :

- نستنتج أن المادة X مبطنة للنشاط الانزيمي لأنها منافسة لمادة التفاعل S على الموقع الفعال
- نستنتج أن المادة Y مانعة (مبعدة) للنشاط الانزيمي فهي معيقة لإرتباط مادة التفاعل S بالموقع الفعال
-

4- تقديم فرضية تفسيرية لتأثير كل مؤثر :

- في الحالة A : المؤثر X مركب تشبه بنيته مادة التفاعل مما يسمح له بالدخول في التنافس مع الركيزة S و ذلك بتثبته على الموقع الفعال للإنزيم ((مؤثر منافس))
- في الحالة B : المؤثر Y يختلف بنيويا عن مادة التفاعل حيث يتثبت على جزيئة الانزيم في موقع آخر غير الموقع الفعال ، مسببا تغير في نشاط الإنزيم و ربما تغيير في بنية الانزيم خاصة الموقع الفعال ((مؤثر غير منافس)) .

المستوى : 3 ع ت

اختبار الفصل الاول في مادة علوم الطبيعة والحياة

المدة : 2 ساعة

التمرين الأول (10ن): البروتينات جزيئات محددة وراثيا بعدد ونوع وترتيب الاحماض الامينية المكونة لها , مما يعطي لكل بروتين خصائص بنيوية ووظيفية تميزه عن البروتينات الاخرى . وفي هذا الموضوع نحاول تفسير العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.

الجزء الاول: يمكن استعمال برنامج Anagène من الحصول على الوثيقة (1).

الوثيقة (1)

جزيئات (تتابعات)	< > 0
تتابع (س)	< > 0
تتابع (ص)	< > 0
تتابع (ع)	< > 0
تتابع (ج)	< > 0

(1) - ما هو دور برنامج Anagène الذي تظهره الوثيقة (1)؟ ثم تعرف على التتابعات (س) و(ص) و(ع) و(ج) مع التعليل.

(2) - اعتمادا على نتائج الوثيقة (1) ومعلوماتك بين ان العلاقة $4^3 = 64$ تتوافق مع مفهوم وحدة الشفرة الوراثية؟

(3) - ما عدد الاحماض الامينية للبروتين الوظيفي الذي تظهره الوثيقة (1) مع التعليل؟

(4) - وضع برسم تخطيطي وظيفي ارتباط الحمض الامني

His ضمن السلسلة الببتيدية في مستوى الريبوزوم في الهيولى؟

الجزء الثاني: تمثل الوثيقة (2) البنية الفراغية لبروتين وظيفي

1- علما أن (s) يشير الى وجود جسر ثنائي الكبريت

تعرف على مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع
تعليل الاجابة؟

2- اذا علمت ان جذور بعض الاحماض الامينية المرقمة هي

الحمض الاميني رقم 1	الحمض الاميني رقم 6	الحمض الاميني رقم 129
$\begin{array}{c} \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Phi=3	Phi=5	Phi=9.8

(α) - حدد شحنة كل حمض اميني في حالته الحرة عند PH=5؟

علل اجابتك؟ (β) - مثل صيغة كل حمض ضمن السلسلة الببتيدية عند PH=2؟

(δ) - اعتمادا على المعلومات المبنية في الجزء الاول والثاني ومعلوماتك وضح بدقة - العلاقة بين المعلومة الوراثية من جهة والبنية الفراغية للبروتين وتخصصه الوظيفي من جهة اخرى - .

انتهى التمرين الاول _ يتبع

التمرين الثاني (10 ن): لغرض تفسير بعض الجوانب المتعلقة بالنشاط الوظيفي للإنزيمات وبعض العوامل المؤثر في ذلك نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول: إنزيم الاميلوسنتاز Amilo Saynthase يشرف على تركيب النشاء , ولاختبار نشاطه على ثلاث مواد متفاعلة هي الغلوكوز و غلوكوز-6-فوسفات و غلوكوز-1-فوسفات. نستخلص هذا الإنزيم من خلايا لب البطاطا ثم نضيفه الى ثلاث اوساط تحضن في حمام مائي درجة حرارته ثابتة عند 37°C حيث كل وسط به احد المواد المتفاعلة سابقة الذكر. ثم نكشف عن وجود النشاء او غيابه في الوسط والنتائج موضحة في جدول الوثيقة (1).

رقم الأنبوب	المادة المضافة	لحظات المعايرة			
		t_0	t_1	t_2	t_3
1	جلوكوز	-	-	-	-
2	جلوكوز-1-فوسفات	-	+	+	+
3	جلوكوز-6-فوسفات	-	-	-	-

جدول الوثيقة (1) (+): وجود النشاء - (-): غياب النشاء

(1)- اقترح طريقة يمكنك من الكشف عن وجود النشاء؟

(2)- حلل نتائج الجدول. ماذا تستنتج؟

(3)- حدد نوع التفاعل الذي يتوسطه إنزيم الاميلوسنتاز.

(4)- خلال التفاعل السابق نتتبع بتقنية خاصة تطور تركيز

الإنزيم (E) وكمية النشاء الناتجة (P) وتركيز

المعقد (E-S), والنتائج معبر عنها في منحنيات الوثيقة (2)

(1)- كيف تفسر تطور المنحنيات الثلاثة؟ دعم اجابتك بمعادلة .

(2)- مثل برسومات تخطيطية العلاقة بين S و E في الأزمنة $t=1\text{ms}$; $t=3\text{ms}$ ؟

(3)- ماذا تتوقع بالنسبة لتطور كل من (E) و (P) و (E-S) بعد مدة زمنية طويلة

من بداية التجربة؟

الجزء الثاني: تمثل الوثيقة (3) رسما تخطيطيا لجزء من البنية

الجزئية للإنزيم مع الركيزة في حالة نشاط اعظمي في وسط ذو $\text{pH}=7.1$.

(1)- ماذا تمثل $\text{pH}=7.1$ بالنسبة لهذا الإنزيم؟

(2)- ما العلاقة بين بنية الإنزيم وبنية الركيزة - مادة التفاعل - ؟ ثم فسر هذه

العلاقة بناء على معلومات الوثيقة (3)؟

(3)- اذا غيرنا $\text{pH}=7.1$ للوسط بـ $\text{pH}=3.5$ فكانت النتائج توقف نشاط الإنزيم

وتمثل الوثيقة (4) رسما تخطيطيا لجزء من نفس البنية الجزيئية للإنزيم مع

الركيزة في وسط ذو $\text{pH}=3.5$.




(©)- ماهو تأثير $\text{pH}=3.5$ على الموقع الفعال للإنزيم؟

(®)- كيف تفسر توقف نشاط الإنزيم في هذه الحالة.

(μ)- اعد رسم الوثيقة (3) عندما تكون درجة حموضة الوسط $\text{pH}=11.5$ ؟

(π)- باستغلال المعلومات المستخلصة في الجزأين الأول والثاني ومعلوماتك

وضح : مفهوم الموقع الفعال للإنزيم - مفهوم سرعة التفاعل الإنزيمي - الفرق بين تأثير كل من pH المثلى و pH_i على نشاط الإنزيم.



التمرين الاول: (10 نقاط)

الجزء الاول (1): دور برنامج Anagéne الذي تظهره الوثيقة (1): هو تحويل المعلومات الوراثية – تعبير مورثي اي استنساخ المعلومات الوراثية الى ARNm ثم ترجمة ARNm الى سلسلة ببتيدية.....0,5

- ثم تعرف على التتابعات (س) و(ص) و(ع) و(ج) مع التعليل:.....0.5X4

التتابع	تعريفه	التعليل
س	سلسلة غير مستنسخة من ADN	تميزه قاعدة T- تتابع القواعد الازوتية متطابق مع تتابع ARNm
ص	سلسلة مستنسخة من ADN	تميزه قاعدة T- تتابع القواعد الازوتية مكمل- متقابل مع تتابع ARNm
ع	سلسلة ARNm	تميزه القاعدة U – رامزة انطلاق AUG – رامزة توقف UGA
ج	سلسلة ببتيدية	تتابع احماض امينية Met:Val:His:Ther حسب تتابع القواعد الازوتية للمورثة

(2)- بيان ان العلاقة $4^3=64$ تتوافق مع مفهوم وحدة الشفرة الوراثية.....0.5X2

من معلوماتي: وحدة الشفرة الوراثية هي الرامزة التي تتمثل في تتابع كل ثلاث قواعد ازوتية – نيوكليوتيدات – من ARNm تترجم في مستوى الريبزوم الى حمض اميني محدد في السلسلة الببتيدية.

- في جزيئة ARNm توجد رامزات توقف مثل UGA لا تترجم الى حمض اميني.
- قد تشفر عدة رامزات الى نفس الحمض الاميني
- يوجد 20 حمض اميني قابلة للتشفير.


من الوثيقة (1): جزيئة ARNm تتكون من اربعة انواع من القواعد الازوتية هي A.U.G.C في تتابع من 18 قاعدة ازوتية بما فيها رامزة التوقف UGA – عدد الاحماض الامينية في السلسلة الببتيدية هو خمسة وبالتالي $\frac{18-3}{3} = 3$ كل حمض اميني يوافق 3 قواعد ازوتية.

فمحشرون حمض اميني يتطلب عشرون رامزة واكثر من التتابعات المختلفة لاربعة انواع من القواعد الازوتية A.U.G.C مع وجود عدة رامزات تشفر الى حمض اميني واحد: اي 64 رامزة بما فيها 3 رامزات التوقف.

(3)- ماعدد الاحماض الامينية للبروتين الوظيفي الذي تظهره الوثيقة (1) مع التعليل؟.....0,5

عدد الاحماض الامينية: ثلاثة هي Val-His-Ther - التعليل: في مرحلة نهاية الترجمة تتوقف الترجمة عند الرامزة UGA لعدم وجود حمض اميني موافق لها بينما يتم حذف الحمض الاميني Met الموفق لرامزة الانطلاق AUG .

(4)- توضيح برسم تخطيطي وظيفي ارتباط الحمض الاميني His ضمن السلسلة الببتيدية في مستوى الريبزوم في الهولي (الاستطالة).....0.25X4



الجزء الثاني:

1- التعرف على مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع تحليل الاجابة.....0,5
مستوى البنية للجزيئة الممثلة في الوثيقة (2):ثالثية - التحليل :تتكون الجزيئة من سلسلة ببتيية واحدة لها بداية NH_2 ونهاية COOH , مع وجود جسر ثنائية الكبريت تنشأ عند تقابل جزيئتين من نفس الحمض الامني Cys

2- (α -) تحديد شحنة كل حمض امني في حالته الحرة عند $\text{PH}=5$0.5X3

رقم الحمض الامني	شحنته	التحليل
رقم 1	سالبة	PHi اقل من PH الوسط حيث يكتسب بروتون ويسلك سلوك الحمض COO^- في وسط قاعدي
رقم 6	معدومة	PHi تساوي PH الوسط حيث يسلك سلوك متعادل كهربائيا $\text{NH}_3^+/\text{COO}^-$
رقم 129	موجبة	PHi اكبر من PH الوسط حيث يفقد بروتون ويسلك سلوك القاعدة NH_3^+ في وسط حمضي

2- (β -) تمثيل صيغة كل حمض ضمن السلسلة الببتيدية عند $\text{PH}=2$0.5X3

رقم الحمض الامني	رقم 1	رقم 6	رقم 129
صيغته عند $\text{PH}=2$	$\text{NH}_3^+-\text{CH}-\text{CO}-\dots$	$-\text{NH}-\text{CH}-\text{CO}-\dots$	$\dots-\text{NH}-\text{CH}-\text{COOH}$
	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$-\text{CH}_2-\text{SH}$	$-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_3^+$

2- (δ -) توضيح العلاقة بين المعلومة الوراثية من جهة والبنية الفراغية للبروتين وتخصصه الوظيفي من جهة اخرى.....0.5X3

المعلومة الوراثية هي المورثة والمتمثلة في قطعة من ADN تتميز بتتابع محدد للقواعد الازوتية(النيوكليوتيدات).تستنسخ هذه المورثة الى رسالة وراثية مشفرة بنفس تتابع القواعد الازوتية في شكل جزيئة ARNm الذي يغادر النواة الى الهيولى لترجم على مستوى متعدد الريبزوم سلسلة ببتيية محددة بعدد ونوع وترتيب الاحماض الامنية المرتبطة بروابط ببتيية.ان وجود انواع معينة من الاحماض الامنية ضمن السلسلة الببتيدية يؤدي تلقائيا الى تشكل روابط كيميائية معينة تسمح بالانطواء الطبيعي للسلسلة الببتيدية في مناطق محددة فتتشكل بنية فراغية طبيعية تحدد التخصص الوظيفي لهذا البروتين.

الجزء الاول:

(1)- اقترح طريقة تمكنك من الكشف عن وجود النشاء: يتم ذلك باستعمال كاشف - ماء اليود- حيث عند الحصول على راسب ازرق بنفسجي بعد اضافة ماء اليود فذلك يدل على وجود النشاء.....0,5

(2)- تحليل نتائج الجدول: في وجود الغلوكوز او غلوكوز-6- فوسفات كمادة تفاعل في الانبوبين 1 و 3 نلاحظ عدم وجود النشاء بمرور الزمن من t_0 الى t_3 . اما في حالة وجود غلوكوز-1- فوسفات كمادة تفاعل في الانبوب 2 فنلاحظ ظهور النشاء ابتداء من الزمن t_1 الى t_3 0,5+0,5

الاستنتاج: انزيم الاميلوسنتاز نوعي بالنسبة لمادة التفاعل.....0,5

(3)- نوع التفاعل الذي يتوسطه انزيم الاميلوسنتاز هو تفاعل بناء-تركيب.....0,5


(4)- 1- تفسر تطور المنحنيات الثلاثة؟ دعم اجابتك بمعادلة: من 0-2,5 ملي ثانية: يتناقص تركيز الانزيم E بسبب ارتباطه بمادة التفاعل- الركيزة-S (غلوكوز-1- فوسفات) وتشكل معقد E-S وهو ما يفسر زيادة تركيزه في هذا المجال. ويتزامن ذلك مع زيادة تركيز الناتج P بسبب حدوث التفاعل الانزيمي بتركيب النشاء ثم تحريره مما الى تراكمه.....0,5

عند 2,5 ملي ثانية: ينعدم تركيز الانزيم E بالتزامن مع ثبات تركيز معقد E-S عند قيمة اعظمية ويعود ذلك لتشبع الانزيم بمادة التفاعل بسبب وجود عدد محدود من المواقع الفعالة لجزيئات الانزيم بامكانها الارتباط مع عدد محدد من جزيئات مادة التفاعل، بينما يستمر تزايد المنتج لاستمرار حدوث التفاعل الانزيمي.....0,5

من 2,5 - 5 ملي ثانية: تبقى تركيز الانزيم معدوم وتركيز معقد E-S ثابت عند قيمة اعظمية وتستمر الزيادة في المنتج بسبب استمرار تشبع الانزيم بمادة التفاعل من جهة وتساوي سرعة ارتباط S و E لتشكيل معقد E-S مع سرعة تحرير الناتج من جهة اخرى.....0,5

المعادلة $E+S \rightarrow ES \rightarrow E+P$ 0,5

(4)- 2- تمثيل برسومات تخطيطية العلاقة بين E و S في الازمنة $t=1ms$; $t=3ms$ 0,5+0,5



(4)- 3- أتوقع بالنسبة لتطور كل من

(E) و (P) و (E-S) بعد مدة زمنية طويلة

من بداية التجربة اي

بعد الزمن 5 ملي ثانية

- يتناقص تركيز E-S ويزيد تركيز E

وتستمر الزيادة في تركيز P ببطء..0,5

- ينعدم تركيز E-S ويثبت تركيز E عند قيمته الابتدائية ويثبت تركيز P عند القيمة النهائية.....0,5

(1)- تمثل $PH=7.1$ بالنسبة لهذا الانزيم - قيمة مثلى-.....0,5


(2)- العلاقة بين بنية الانزيم وبنية الركيزة - مادة التفاعل علاقة تكامل بنيوي -0,5

التفسير: من الوثيقة (3) يفسر التكامل البنيوي بتشكيل روابط شاردية $COO^- NH_3^+$ بين جزء من مادة التفاعل والموقع الفعال للانزيم ينتج عنها معقد انزيم - ركيزة.....0,5

(3)- ©: تأثير $PH=3.5$ على الموقع الفعال للانزيم من الوثيقة (4): يصبح مجمل شحنات الموقع الفعال موجبة NH_3^+0,5

(3)- ®: تفسير توقف نشاط الانزيم في هذه الحالة: يعود ذلك الى عدم تشكل الروابط الشاردية بغياب الشحنات السالبة وبالتالي عدم تشكل معقد انزيم - مادة تفاعل فيتوقف نشاط الانزيم.....0,5

(μ)- اعادة رسم الوثيقة (3) عندما تكون درجة حموضة الوسط $PH=11.5$0,5



(3)- π - مفهوم الموقع الفعال للانزيم: جزء صغير من الانزيم ذو بنية فراغية محددة وراثيا بتتابع عدد محدود من الاحماض الامينية تمكنه من الارتباط المؤقت مع جزء من مادة التفاعل بالتكامل البنيوي في موقع التثبيت. ثم تحفيز التفاعل وتحرير الناتج في مستوى موقع التحفيز.....0.25X4


- مفهوم سرعة التفاعل الانزيمي: وتعتبر عن الزيادة في تركيز الناتج P او التناقص في تركيز الركيزة بدلالة الزمن...0,5

- الفرق بين تأثير كل من PH المثلى و PH_i على نشاط الانزيم.: عند PH المثلى البنية الفراغية للانزيم طبيعية وخاصة في مستوى الموقع الفعال حيث تكون المجموعات الكيميائية الضرورية للارتباط بمادة التفاعل في مكانها المناسب فيتشكل معقد انزيم - مادة تفاعل. بينما عند PH_i فتكون محصلة شحنات الانزيم معدومة بما فيها الموقع الفعال فيترسب الانزيم ولا يتشكل معقد انزيم- مادة تفاعل.....0.5X2

تعتبر الخلية مقر تدفق مستمر للمادة والمعلومة الوراثية والطاقة ، لدراسة بعض هذه الظواهر نقترح هذا الموضوع :

التمرين الأول (8 نقاط):

- I- يمثل الشكل (2) من الوثيقة (1) رسم تخطيطي لمورثة في حالة نشاط، أما الشكل (1) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا من مرحلة مكملية:



- 1- سمّ المرحلتين الممثلتين في شكلي الوثيقة (1).
 - 2- أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 8 من الشكل (1) و (س) و (ع) من الشكل (2).
 - 3- حدّد اتجاه المرحلة الممثلة في الشكل (2). علّل إجابتك.
 - 4- ما هي العلاقة الموجودة بين عدد العناصر (4) و عدد العناصر (8) الناتجة ؟ علّل ذلك.
 - 5- صف تجربة تبيّن فيها العلاقة بين (5) و (1) من الشكل (1)
 - 6- قدم رسما تفسيريا للشكل (2) مع كتابة كل البيانات اللازمة.
- II- اليك التجارب التالية :

رقم التجربة	التجربة	الملاحظة
01	نزرع العنصر (س) لبكتيريا هوائية في بكتيريا لا هوائية	البكتيريا اللاهوائية أصبحت هوائية
02	نحقن العنصر (ع) المستخلص من الخلية البلازمية لحيوان ثديي و المسؤول عن تركيب بروتين (1) في بيوض ضفدعة مسؤولة عن تركيب بروتين (2)	الضفادع الناتجة لها القدرة على تصنيع البروتين (1) و (2)
03	نعيد التجربة (2) مع نزع أنوية بيوض الضفدعة	

1- ماهي المعلومات المستخلصة من التجريبتين 1 و 2؟


2- ماهي الملاحظة المتوقعة في التجربة 3؟

III- تمثل الوثيقة (2) العلاقة بين العنصر (ع) من الشكل (2) و العنصر (8) من الشكل (1) للوثيقة (1).

1- حلل المنحنى. ماذا تستنتج؟

2- ماهي خصائص العنصر (ع) المراد دراستها؟

3- بالاعتماد على جدول الشفرات الوراثية . استخرج قطعة المورثة المسؤولة عن إنتاج العنصر (8) من الوثيقة (1)



الحرف الأول

الحرف الثاني


	U	C	A	G
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp
C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG
A	AUU AUC Ile AUA AUG Met	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG
G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG

الحرف الثالث

التمرين الثاني (7 نقاط):

تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيت فراغية معقدة تكسبها تخصصا وظيفيا عاليا، سمح لنا

استعمال برنامج RASTOP بتمثيل البنية الفراغية للبروتين (م) رسمها التخطيطي موضع في الوثيقة (3) .



1- قدم تعريفا دقيقا للبنية الفراغية للبروتين.

2- تعرف على نوع البنية الفراغية لهذا البروتين. علل

اجابتك

3- اذكر الروابط المساهمة في ثبات هذه البنية.

4- تمثل الوثيقة (4) مركبات تم الحصول عليها بعد إمالة

البروتين (م).

أ- اكتب الشكل الشاردي للوحدات الاربعة في الـ Phi الخاص

بها.

ب- حدد سلوك كل حمض اميني في PH = 5.5 علل اجابتك

أ-

$\text{NH}_2\text{---CH---COOH}$ CH_2SH	$\text{NH}_2\text{---CH---COOH}$ CH $\text{CH}_3\text{---CH}_3$	$\text{NH}_2\text{---CH---COOH}$ CH_2 COOH	$\text{NH}_2\text{---CH---COOH}$ $(\text{CH}_2)_4$ NH_2
Cys Phi = 5.06	Val Phi = 5.96	Asp Phi = 2.77	Lys Phi = 9.74

المثقة (4)

5- نقوم بتشكيل مركبين من الببتيديات انطلاقا من الأحماض الأمينية السابقة

أ- قدم معادلة تشكل المركبين الببتيدين التاليين ثم سمى كل واحد منهما :

المركب (A) : Val - Asp

المركب (B) : Lys - Val - Asp

ب- أحسب شحنة كل ببتيدي عند درجتي PH تساوي 2 و 10.

6- قصد التعرف على عدد وانواع الوظائف المتأينة التي يحملها هذا البروتين في اوساط مختلفة درجة الحموضة نقترح عليك هذه الوثيقة :

عدد	PH الوسط	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
الوظائف الامينية المتأينة	95	90	85	70	60	32	25	20	15	14	13	12	11	10	
الوظائف الحمضية المتأينة	05	10	13	15	20	30	50	60	70	80	82	83	84	85	


أ- ترجم الوثيقة الى منحنى بياني ثم ضع عنوانا مناسباً له.

ب- حدد بدقة Phi لهذا البروتين.


التمرين الثالث (5 نقاط):

تلعب الانزيمات دوراً أساسياً في عدد كبير من الوظائف في الجسم، من اجل التعرف على بعض أدوارها وخصائصها نقترح ما يلي:

I- تمثل الوثيقة (5) معادلة اماهة السكروز تحت تأثير انزيم السكراز الى غلوكوز وفركتوز.



نضع انزيم السكراز في المفاعل الحيوي لجهاز EXAO مع كمية محددة من السكروز في درجة حرارة 37°م و PH=7، بواسطة لاقط نقيس كمية الغلوكوز في الوسط فنتحصل على المنحنى الممثل في الوثيقة (6).



1- ما نوع التفاعل الذي يحفزه

انزيم السكراز؟

2- اكتب معادلة التفاعل

باستخدام الرموز P ، S ، E

3- حلل وفسر منحنى الوثيقة (6)

4- حدد كيف يكون شكل المنحنى


عند درجة حرارة 10°م و 70°م

مع التعليل.

II-لدراسة آلية عمل انزيم السكراز نقدم الوثيقة (7) التي تظهر مراحل امادة السكروز المحفز بإنزيم السكراز.

1- اشرح آلية عمل انزيم السكراز

2- ما هي المعلومات المستخلصة حول خصائص الموقع الفعال للإنزيم ؟




قريبا ستعلق قائمة الناجحين في البكالوريا

احرس على أن يكون اسمك بينهم.....

ثانوية العربي التبسي 1


الأستاذة : معنصري لبنى

التمرين الأول (8 نقاط):


رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
1-I	الشكل (1) مرحلة الترجمة	0.5	2*0.25
2-I	1- حمض اميني 2- ARNt 3- رامزة مضادة 4- ريبوزوم وظيفي 5- رامزة - 6 Valine 7- GUG 8- بروتين (س) : ADN (ع) : ARN	2.5	0.25*10
3-I	اتجاه النسخ: تبدأ عملية النسخ من الخيوط الأقصر الى الخيوط الأطول (من اليمين إلى اليسار) التعليق : كلما انتقل ARN بوليميراز أكثر على طول المورثة زاد طول ARNm	0.5	0.25
4-II	العلاقة بين الريبوزومات وكمية البروتين المصنعة هي علاقة طردية. التعليق: كلما زاد عدد الريبوزومات التي تترجم الـ ARNm إلى بروتين زادت سرعة و كمية البروتين المصنعة من طرف الريبوزومات	0.5	0.25
5-I	تجربة نيرنبارغ : قام العالم نيرنبارغ ومساعدوه من تصنيع جزيئة ARNm مكونة من قاعدة اليوراسيل (U) فقط. وضعت الجزيئة في أنبوب اختبار به الأحماض الأمينية العشرون في وسط يحتوي على المكونات السيتوبلازمية الضرورية لتكوين البروتين. أظهرت النتائج تشكل سلسلة من متعدد الببتيد مكونة فقط من الحمض الأميني فينيل ألانين (Phe) عددها يساوي ثلث عدد النيكليوتيدات الموجودة في ARNm	0.25	0.25
6-I		0.25*8	02
1-II	المعلومات المستخلصة : التجربة 1: ADN حامل المعلومة الوراثية التجربة 2: ARNm ينقل المعلومة الوراثية من النواة الى الهيولى ويحدد نوع البروتين المصنع	0.5	0.25 0.25
2-II	الملاحظة المتوقعة في التجربة 3 هي : الضفادع الناتجة لها القدرة على تصنيع البروتين (2) فقط	0.25	0.25

رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
1-III	تحليل المنحنى: يمثل المنحنى تغيرات كمية ARNm و البروتين المصنعة بدلالة الزمن حيث: منحنى كمية ARNm من (ز = 0 إلى ز = 30) : في غياب الـ ARNm لا يحدث تركيب للبروتين وبعد ز = 50 : في وجود الـ ARNm يحدث تركيب للبروتين بحث تكون كمية البروتين المركبة أكبر كلما كانت كمية الـ ARNm كبيرة الاستنتاج : كمية البروتين المصنعة مرتبطة بكمية الـ ARNm الموجودة في الوسط	2*0.25	0.5
2-III	خصائص الـ ARNm المراد دراستها: - مدة حياة الـ ARNm قصيرة	0.25	0.25
3-III	CCA-GGA-AAA-CCA-AAA-AAA-ATA-ATA-GGA-TTT-TGA	0.25	0.25

التمرين الثاني (7 نقاط):

رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
1-	تعريف البنية الفراغية للبروتين: هي الشكل ثلاثي الأبعاد الذي يتخذه الجزيء في الفراغ و الذي يتعلق أساسا بنوع و ترتيب وعدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين من جهة و بمختلف الروابط الكيميائية الناشئة بين الأحماض الأمينية من جهة أخرى.	0.25	0.25
2-	بنية البروتين هي بنية ثلاثية التعليق: لوجود بنيتان ثانوية α و β تربطهما مناطق انعطاف .	0.25 0.25	0.5
3-	الروابط المساهمة في ثبات هذه البنية هي: روابط تكافؤية: روابط بيبتيدي و روابط كبريتية (S-S) -روابط لا تكافؤية : روابط هيدروجينية , روابط شاردية بين المجموعات السالبة والموجبة (CH3-CH3) للجلدور وروابط كارهة للماء (COO ⁻ -NH3 ⁺)	5*0.25	01.25
4-	أ- الشكل الشاردي للوحدات الأربعة عند Phi :  ب- بتطبيق القاعدة: PH الوسط أقل من Phi: شحنة الحمض الأميني تكون موجبة (+) يهاجر نحو القطب السالب (حالة الليزين والفالين) PH الوسط أكبر من Phi: شحنة الحمض الأميني تكون سالبة (-) يهاجر نحو القطب	4*0.25 4*0.5	03

		الموجب(حالة السيستئين و الأسبرتيك)	
		Cys : $\text{NH}_2-\underset{\text{CH}_2\text{SH}}{\text{CH}}-\text{COOH} \xrightarrow[\text{هجرة بطيئة}]{\text{PH الوسط} = 5.5} \text{NH}_2-\underset{\text{CH}_2\text{SH}}{\text{CH}}-\text{COO}^-$ شحنة سالبة Asp: $\text{NH}_2-\underset{\text{CH}_2\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{COOH} \xrightarrow[\text{هجرة سريعة}]{\text{PH الوسط} = 5.5} \text{NH}_2-\underset{\text{CH}_2\text{COO}^-}{\text{CH}}-\text{COO}^-$ شحنة سالبة Val: $\text{NH}_2-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{COOH} \xrightarrow[\text{هجرة بطيئة}]{\text{PH الوسط} = 5.5} \text{NH}_3^+-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ شحنة موجبة Lys: $\text{NH}_2-\underset{(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH} \xrightarrow[\text{هجرة سريعة}]{\text{PH الوسط} = 5.5} \text{NH}_3^+-\underset{(\text{CH}_2)_4\text{NH}_3^+}{\text{CH}}-\text{COOH}$ شحنة موجبة	
01.5	2*0.25	ثنائي الببتيد $\text{Val} + \text{Asp} \Rightarrow \text{Val-Asp} + \text{H}_2\text{O}$ ثلاثي الببتيد $\text{Lys} + \text{Val} + \text{Asp} \Rightarrow \text{Lys-Val-Asp} + 2\text{H}_2\text{O}$	-5-
	4*0.25	الشحنة 1+ $\text{NH}_3^+-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 2 = PH الشحنة 2+ $\text{NH}_3^+-\underset{(\text{CH}_2)_4\text{NH}_3^+}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 10 = PH الشحنة 2- $\text{NH}_2-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2\text{COO}^-}{\text{CH}}-\text{COO}^-$ الشحنة 2- $\text{NH}_2-\underset{(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2\text{COO}^-}{\text{CH}}-\text{COO}^-$	-أ- -ب-

			-6-	-أ-
0.25	0.25	الصفحة 3 / 5 أقلب الصفحة		
0.5	0.5	 منحنى تغيرات النسب المئوية لتأين الوظائف الحمضية و القاعدية بدلالة PH الوسط		
0.25	0.25	ب- تحديد قيمة PHi: يمثل نقطة تقاطع المنحنيين و phi=5.5		

التمرين الثالث (5 نقاط):



رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
1-1	نوع التفاعل الذي يحفز انزيم السكراز: تفاعل تفكيك (تبسيط)	0.5	0.5
2-1	$E + S \longrightarrow ES \longrightarrow E + P1 + P2$	0.5	0.5
3-1	- تحليل وتفسير منحنى الوثيقة (1): يمثل المنحنى تغيرات كمية الغلوكوز بدلالة الزمن : (0 – 3.5 سا): نلاحظ تزايد في كمية الغلوكوز تدريجيا حتى تبلغ اقصى قيمة (40 و.إ.) وهذا راجع لحدوث التفاعل بين انزيم السكراز مع السكروز حيث يتم تفكيك السكروز الى غلوكوز وفركتوز (3.5 – 7 سا): نلاحظ ثبات في كمية الغلوكوز عند اقصى قيمة (40 و.إ.) يرجع الى توقف التفاعل بسبب نفاذ كمية السكروز رغم وجود الانزيم.	2*0.5	01
4-1	<u>عند درجة حرارة 10°م:</u> - لان الحرارة المنخفضة تؤدي الى قلة حركية الجزيئات وتقل التصادمات بين الانزيم ومادة التفاعل ومنه تنخفض سرعة التفاعل فتزداد كمية الغلوكوز الناتج بشكل بطيء وتبلغ اقصى قيمة عند نفاذ السكروز. <u>* عند درجة حرارة 70°م:</u> - لان الحرارة المرتفعة تؤدي تكسير الروابط التي تحافظ على استقرار البنية ومنه تخريب بنية الانزيم فيفقد شكل الموقع الفعال ويفقد وظيفته ومنه لا يحدث التفاعل ولا يتم تفكيك السكروز ولا ينتج الغلوكوز وتبقى قيمته معدومة.	2*0.5	02

		عند درجة حرارة 10°م عند درجة حرارة 70°م	
0.5	0.5	يتكون الموقع الفعال من الحمضين الأمينيين Asp23 و Glu204 اللذان يلعبان دوراً أساسياً في حدوث التفكك الصفحة 4 / 5 أقلب الصفحة - اقتراب السكر من الموقع، سحس بربريم ويسبب فيه سحس سحس، المجموعة الكربوكسيلية في جذر Asp23 مع ذرة الكربون رقم 2 للفركتوز مما يؤدي إلى تكسير الرابطة السكرية بين الغلوكوز والفركتوز، كما أن الوظيفة الكربوكسيلية للحمض Glu204 تفقد بروتون تكتسبها ذرة الأكسجين للغلوكوز الذي يتم تحريره (الناتج الأول P1). - تستعمل جزيئة ماء حيث يكتسب جذر حمض Glu204 بروتون H⁺ وتكتسب ذرة الكربون رقم 2 للفركتوز مجموعة OH مع تكسير الرابطة مع الحمض Asp23 ويتحرر الفركتوز (الناتج الثاني P2) ويسترجع الموقع الفعال شكله الأصلي ليعيد التفاعل مع جزيئة سكروز أخرى.	1-II
0.5	0.5	نستخلص أن الموقع الفعال يتكون من أحماض أمينية محددة تسمح بارتباط مادة التفاعل بفضل روابط انتقالية ضعيفة مع جذور هذه الأحماض الأمينية مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج	2-II

التمرين الأول (7 ن) :

يرتبط نشاط الخلية بالتعبير المورثي لمادتها الوراثية وما ينتج عنها من بروتينات التي تركيبها بآليات منسقة و بصورة منظمة . نتناولها في ما يلي :

I- توضح أشكال الوثيقة (1) المراحل المؤدية إلى تركيب هذه الجزيئات .



- 1- أ) ضع العنوان المناسب لشكلي الوثيقة (1) و البيانات الموافقة للأرقام من 1 إلى 8.
ب) بين كيف تسمح ظاهرة الشكل (أ) بانتقال أمين للمعلومة الوراثية. دعم إجابتك بالرسم .
ج) اعتمادا على الجدول المختصر للشفرة الوراثية استخرج العناصر: ح.1 ح.2 ح.3 ح.4 الظاهرة في الوثيقة (1) .
- 2 - تمثل الوثيقة 2 تغير نسبة النشاط التركيبي المدروس و المرتبط بحالة العنصر (4) من الوثيقة 1 في شروط تجريبية ملائمة .

➤ حل الوثيقة (2) . ماذا تستنتج ؟

- 3 - من خلال هذه الدراسة بين قدرة الخلية على تركيب كمية كبيرة من البروتين التي تحتاجها في نشاطاتها إنطلاقا من مورثة واحدة .

التمرين الثاني (13 ن) :

تعتبر الإنزيمات الفاعل الأساسي المسؤول على التفاعلات البيوكيميائية في العضوية , يرتبط ذلك بعلاقتها بالركيزة و ظروف الوسط . نتناول بعض جوانب هذا الموضوع في الدراسات التالية .


ا. نتابع الأنشطة التحفيزية لإنزيمات مختلفة ضمن الجدول الموالي :

وسط التفاعل	الانزيم	مادة التفاعل	نتائج التفاعل
1	ريبونوكلياز	ARN	(س)
2	(ع)	أحماض أمينية + ARN_t + طاقة	(ص)
3	(ل)	غلوكوز + اوكسجين	حمض الغلوكونيك + ماء أوكسجيني

(1) ماذا تمثل : س , ع , ص , ل , في الجدول .

(2) كيف تعكس هذه النتائج مفهوم التخصص الوظيفي للإنزيمات .

➤ لدراسة العلاقة بين الانزيم و مادة التفاعل إليك البنية الفراغية لإنزيم كربوكسي ببتيداز الموضحة في أشكال الوثيقة (1) , بحيث يمثل الشكل (ا) الإنزيم الطبيعي , و الشكل (ب) انزيم غير طبيعي يمتاز بقدرته على تشكيل معقد (انزيم - مادة تفاعل) لكن بدون حدوث تفاعل




(3) من خلال مقارنة شكل الوثيقة (1) و المعطيات السابقة, وضح كيف تتدخل العناصر المرقمة من الانزيم الطبيعي في تخصصه الوظيفي .


لدراسة تأثير شروط الوسط على نشاط الانزيم إليك الوثيقة (2) , التي تتضمن :

➤ الشكل (1) : يمثل تغيرات سرعة التفاعل لإنزيم الأميلاز اللعابي في درجات حموضة مختلفة .

➤ الشكل (2) : محاكاة بمبرمج Rasmol لبنية الأميلاز اللعابي بنموذج العود قبل و بعد تعرضه لدرجة حرارة $60^{\circ}C$.



- (أ) 1. حل منحنى الشكل (1) . ماذا تستنتج ؟
 2. فسر النتيجة المحصل عليها عند قيمة $PH = 3$.
- (ب) 1. ما هي المعلومة التي يمكنك استخراجها من استغلال الشكل (2) حول تأثير ارتفاع درجة الحرارة على نشاط الإنزيم .
 2. هل يمكنك أن تنسب إحدى نماذج الشكل (2) إلى حالة الإنزيم الطبيعي عند تعرضه لدرجة الحرارة $40^{\circ}C$. علل اجابتك .
- (ج) تؤثر مواد كيميائية معينة على النشاط الإنزيمي, نمذج البعض منها في الأجسام (س) و (ع) و (ص) ضمن اشكال الوثيقة (3) .




➤ استخراج من كل شكل في الوثيقة (3) علاقة المواد : س , ع , ص , بالإنزيم , وتأثيره على نشاطه .

III. على ضوء الدراسات السابقة, استخراج العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم , وأهميتها بعلاقته مع الركيزة .

نتمى لكم النجاح و التفوق في البكالوريا

التمرين الأول : 05 نقاط

يتمثل النشاط الخلوي في العديد من التفاعلات الكيميائية الأيضية تلعب الإنزيمات دورا أساسيا في تحفيز هذه التفاعلات الحيوية ولمعرفة بنيتها الفراغية وبعض خصائصها، تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية للإنزيم اليوزيم المستخلص من الدموع أو اللعاب. يتكون الجزيء من سلسلة ببتيدية مكونة من 129 حمضا أمينيا.




- (1) - أكتب البيانات المرفقة ثم حدد النموذج المستعمل في كلا (أ ، ب) .
- (2) - تعرف على البنية الفراغية لهذا الإنزيم . علل إجابتك ؟
- (3) - يتكون العنصر (2) من الأحماض الأمينية من بينها Asp 52 و lys 35 . * أذكر دور العنصر (2) في النشاط الإنزيمي ؟
- إذا علمت أن مادة التفاعل هي سكريات الجدار الخلوي للبكتيريا .
- (4) - حدد نوع التفاعل مدعما إجابتك برسم تخطيطي عليه البيانات اللازمة .

التمرين الثاني : 07 نقاط

إن صفات الكائن الحي مرتبطة بنمطه الوراثي ، وتعتبر الكريات الحمراء نمودجا لدراسة ذلك .

- (I) - يلاحظ أن الكريات الحمراء عند الثدييات بدون نواة وبها مجموعة من البروتينات كمولدات الارتصاص التي تعبر عن الزمر الدموية .
- (أ) - ما هو الإشكال المطروح في هذه الملاحظة ؟



الوثيقة (1)

- ب) - اقترح فرضية لحل هذا الإشكال .

- سمحت دراسات جزيئية لإنزيمات نظام

ال ABO بالحصول على الوثيقة (1) .

- (أ) - حلل معطيات هذه الوثيقة .

ب) - فسر قصر السلسلة الببتيدية للإنزيم (O) .

(II) - لتحديد الزمرة الدموية لشخصين (س) و (ص) تجري الاختبارين التاليين :

الاختبار الأول : نضيف قطرات من أمصال الاختبار (ضد A ، ضد B ، ضد D) إلى ثلاث قطرات من دم الشخصين (س) و (ص) .

الاختبار الثاني : نعامل محلول الكريات دم حمراء معلومة (كريات A ، كريات B) بمصل دم الشخصين (س) و (ص) .

الاختبار	الاختبار الأول			الاختبار الثاني	
	ضد A	ضد B	ضد D	كريات A	كريات B
س	●	●	○	●	○
ص	○	○	●	○	●
حدوث الارتصاص : ● ، عدم حدوث الارتصاص : ○					

الوثيقة (2)

نتائج الاختبارين موضحة في جدول الوثيقة (2) .

- أ) - فسر نتائج الاختبار الأول والثاني كل على حدا .

2) - أ) هل تبدو لك نتائج الاختبارين منطقية ؟


ب) - علل نتائج الاختبارين .

- 3- أ)- استنتج فصيلة دم الشخصين (س) و (ص) اعتمادا على نتائج الاختبار الأول .
 - أصيب الشخص (س) بنزيف حاد تطلب نقل فوري للدم .
 ب)- هل يكون الشخص (ص) أحد المنقذين له ؟ وضح ذلك مدعما إجابتك برسم تخطيطي يحمل البيانات .

التمرين الثالث: 08 نقاط

تتميز الخلايا الحية بقدرتها على تركيب البروتينات لأداء وظائفها المتنوعة.

- I- يبين الشكل (1) من الوثيقة (1) صورة مورثة في حالة نشاط. أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا من مرحلة مكملية.



الوثيقة 01

- أ- سم المرحلتين الممثلتين في شكلي الوثيقة (1). ثم حدد مقر الشكل (أ) ومقر الشكل (ب).
 ب. أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6 .

- II- من بين الوظائف تلعب البروتينات دورا هاما في الدفاع عن الجسم و تحديد الذات .

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) البنية ما فوق الخلوية لقطعة من الغشاء الهولي خلوية إنسان، أما الشكل (2) فيمثل نموذجا تفسيريا لها.

- 1- أ)- تعرّف على العناصر المرقمة في الشكل (1).

ب)- ضع عنوانا مناسباً للشكل (2).

- 2- بناء على النموذج الموضح في الوثيقة (2)


أ)- استخرج مميزات الغشاء. علل إجابتك

ب) خضع رسما تخطيطيا دقيقا مبسطا مع وضع البيانات الكاملة.

- 3- تتدخل العناصر (س) المشار إليها في الشكل (2) في التعرف على الذات.

أ. سمّ هذه العناصر. مع الشرح

ب. حدد السطح الخارجي مع التعليل




الوثيقة 02

- III- من خلال ما توصلت اليه و معلوما تك الخاصة لخص في نص علمي كيف تم تركيب العنصر (س).

التمرين الأول : 5 نقاط

تمتلك العضوية آليات دفاعية تمكنها من التمييز بين الذات و اللادات تتدخل في تحديد مصير الطعوم المزروعة . أنجزت في هذا الإطار عدة أبحاث , سندرس البعض منها .

توضح الوثيقة (1 أ) نمذجة للبنية الجزيئية للغشاء الهولي . وتمثل الوثيقة (1 ب) صورة مأخوذة بالمجهر الإلكتروني لجزء من الغشاء الهولي لخليتين بشريتين مختلفتين نعاملهما بتقنية الوسم المناعي بأجسام مضادة موسومة بعناصر ذهبية ضد HLA2 بقطر 30 نانومتر. و ضد HLA1 بقطر 15 نانومتر حيث يبدو مظهر كل الخلايا المنوات في العضوية بمظهر أحد الشكلين 1 أو 2.



(1) ضع البيانات الموافقة للأرقام في الوثيقة (1 أ) ثم قدم وصفا لها.

(2) ما هي المعلومات التي تستخرجها من الوثيقة (1 ب) .

(3) قارن في جدول بين أنواع الـ HLA من حيث : المصدر- التركيب الكيميائي - مستوى البنية - موقع. التواجد


(4) سمحت دراسات إحصائية لحالات نجاح الطعوم بالحصول على نتائج مدونة في الوثيقة (1 ج) .

حدد العلاقة التي يمكنك استخراجها منها .

التمرين الثاني 8 نقاط: | تأخذ البروتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتين لآخر كما تقوم باداء

ادوار مختلفة في خلايا العضوية

- 1_ يقدم الشكل أ من الوثيقة 1 بعض التفاعلات الأيضية التي تحدث في الخلية
 أ_ حدد نوع التفاعل الذي يحفز كل من:
 الانزيم فوسفو غلوكوميتاز انزيم غليكو كيناز و انزيم غليكو ايزو ميراز
 ب_ علل التأثير النوعي للإنزيم




2_ يمثل الشكل ب من الوثيقة 1 بنية جزيئة انزيم غليكو كيناز

- أ_ سم البيانات المرقمة من 1 إلى 5
 ب_ تعرف على البنية الفراغية للإنزيم علل اجابتك
 ج_ ماهي المعلومة التي يقدمها الشكل ب من الوثيقة 1 فيما يخص كيفية تشكل المعقد انزيم مادة تفاعل

II لإظهار مسببات
 تغير النشاط
 الإنزيمي السابق
 نقترح ما يلي :

التجربة 2	التجربة 1	الشروط و النتائج
4	10	تركيز الإنزيم (E) ب U.A
16	4	تركيز الركيزة (S) ب U.A
20	20	درجة الحرارة ب °م
7	7	قيمة الـ PH
4	4	قيمة المعقد (E - S) ب U.A
34.8	34.8	السرعة الابتدائية ب mg / g / min

- في تجربتين مختلفتين قيست السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي ، وجدول الوثيقة (2 أ) يبين شروط. التجربتين ونتيجتهما



1 أ - قَدِّم تحليلاً مقارناً لتجربتي الوثيقة 02_ أ

ب_ فسر تماثل السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي في التجربتين ، وماذا تستنتج ؟

2 - تمت دراسة إمكانية تشكل المعقد (إنزيم - ركيزة) من خلال العلاقة البنوية بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل في ثلاث قيم مختلفة للـ PH ، والوثيقة (02 ب) تبين حالة الإنزيم في الأوساط الثلاث ، علماً أن الـ PH المثلى تساوي 7.

أ- قدم تعريفاً للموقع الفعال


ب و رَ ع مع الشرح ، أشكال الوثيقة (02 ب) حسب مجال الـ PH الذي وضع فيه الإنزيم بالنسبة للـ PH المثلى .

3_ من خلال ما تقدم ومعلوماتك ، وضح تأثير تغير عوامل الوسط على نشاط الإنزيم و عوِّب ذلك على النشاط الأيضي

التمرين الثالث : 7 نقاط :

يتطلب التعبير المورثي تدخل عناصر مختلفة في الخلية الحية، لغرض التعرف عليها وتحديد دورها نستعرض التجارب التالية:

نقوم بعزل الأحماض النووية الريبية من خلية حيوانية ضمن شروط تجريبية مختلفة ثم نُخضعها لتقنية الفصل الكروماتوغرافي، الوثيقة (1) تمثل وضعية هذه الجزيئات عند بداية ثم نهاية التجربة




1-أ_ معتمداً على نتائج الفصل الكروماتوغرافي وضح أن الشكل (أ) من الوثيقة (1) يعبر عن نشاط تركيب البروتين على مستوى الخلية الحية

ب- تعطي عملية معالجة خلية حية بمادة "α- amanitine" مثبط نوعي للإنزيم ARN بوليميراز نتائج مماثلة لنتيجة الفصل التي يمثلها الشكل (ب) من الوثيقة (1)
- ماذا تستخلص من نتائج هذه المعاملة التجريبية ؟

2- باستعمال تقنية الفصل الكروماتوغرافي تم فصل مكونات الريبوزومات الحرة المعزولة من الهولوى. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ج) من الوثيقة () .

أ- ماذا تستنتج من هذه النتائج التجريبية؟

ب- باستعمال جدول حدد أدوار الـ ARN الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة ()
 II مكن استعمال مبرمج محاكاة Anagene من الحصول على الوثيقة 2 أ التي تمثل المعلومات الخاصة
 بالعناصر الجزيئية المسؤولة عن تركيب جزء من السلسلة الفا للهيموغلوبين العادي HbA عند الانسان



1_ أ اعتمادا على الوثيقة 2 أ بين أهمية استعمال مبرمج Anagene

ب_ تعرف على الجزئتين س و ع . علل اجابتك .

ج_ وضح برسم تخطيطي الظاهرة المسؤولة عن الانتقال من الجزئية س الى الجزئية ع

2_ تبين الوثيقة 2 ب خطوة من الية تحويل الجزئية ع الى الجزئية ص

أ_ سم هذه الالية . ثم اكتب البيانات المرقمة .

ب_ حدد الخطوة الممثلة معللا اجابتك

ج_ بين بدقة دور كل من العنصر 1 و العنصر 3 في حدوث هذه الآلية .

3_ باستدلال منطقي احسب عدد وحدات جزئية العنصر 4 و عدد وحدات الجزئية الوظيفية للعنصر 5

III _ من خلال ماتوصلت اليه و معلوماتك : أكتب نصا علميا تصف فيه تسلسل الاحداث التي سمحت
 بالانتقال من البنية س الى البنية ع

مديرية التربية الوطنية لولاية تلمسان
ثانوية عمر بن عبد العزيز- ندرومة -
السنة الدراسية: 2017/2016

وزارة التربية الوطنية
إمتحان الثلاثي الأول
الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د


اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول: (05 نقاط)

- تتركب البروتينات من وحدات بنائية هامة تسلك سلوكا مميزا في الأوساط.
I - لدراسة سلوك هذه الوحدات نضع أربعة منها في وسط شريط الهجرة الكهربائي لوسط ذو PH مجهول ثم نمرر التيار الكهربائي.
* الوثيقة 01 توضح نتائج الهجرة الكهربائية المحصل عليها و جدول يلخص الـ PHi للوحدات الأربعة.

(-)				(+))			

II - يؤثر تغير عوامل الوسط على نشاط الأنزيمات، لإظهار ذلك تم قياس مدة الاستهلاك الكلي لمادة التفاعل



في وجود أنزيم نوعي وضمن شروط محددة، النتائج المحصل عليها ممثلة في شكلي الوثيقة (2).

باستغلالك لشكلي الوثيقة (2):

1- استخراج الشروط الملائمة لعمل

هذا الأنزيم، علل.

2- فسّر مدة الاستهلاك للركيزة عند

pH = 2 ، ودرجة حرارة = 4 °C

التمرين الثالث: (08 نقاط)

I - تم باستعمال برنامج Anagène مقارنة تتابع نيكليوتيدات جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب الأحماض الأمينية الـ 6 الأخيرة للسلسلة الببتيدية لإنزيم الريبونوكلياز العادي (الشكل 1) وإنزيم الريبونوكلياز غير العادي (الشكل 2) من الوثيقة (1)، بينما الوثيقة (2) تمثل الوحدات الرمزية للـ ARNm الموافقة:

الموضع الثالث	الموضع الثاني			الموضع الأول
	U	C	A	
U	Phe		Tyr	U
A		Ser		A
U		Pro	His	U
C				C
C	Val			C
U		Ala	Asp	U

الشكل 1-GTA AAA CTA CGA AGT CAG
الشكل 2-GTA ATA CTA GGA AGT CAG
119 120 121 122 123 124

الوثيقة 1-

الوثيقة 2-

1 - بالاعتماد على الشفرة الوراثية المقترحة في الوثيقة 2-


أ* حدّد تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لكل من الشكلين 1 و 2 الممثلين في الوثيقة 1-

ب* فيما يتمثل الفرق بين السلسلتين الببتيديتين المحصل عليهما؟

2- باستعمال تقنيات الهندسة الوراثية تم استبدال النوكليوتيدة رقم 368 في مورثة الريبونوكلياز العادي بنوكليوتيدة تحوي التيمين T.

أ* مثل تتابع الأحماض الأمينية الناتجة عن هذا الاستبدال. ب* كيف تفسّر النتيجة المحصل عليها؟

II - تمثل الوثيقة 3- مرحلة ارتباط الأحماض الأمينية الخمسة الأولى أثناء تركيب إنزيم الريبونوكلياز العادي.



1 - أعد رسم الشكل ب- مع كتابة البيانات من

1 إلى 7 مع القواعد الأزوتية التي يحملها

العنصران (1) و (7).

2- صف الأحداث التي سمحت بالانتقال من الشكل

(أ) إلى الشكل (ب).

III - أدى خلل على مستوى المورثة المشرفة على تركيب هذا الإنزيم إلى فقدان نشاطه الطبيعي. من مكتسباتك و المعارف المبنية من هذه الدراسة، وضح في نص علمي العلاقة بين بنية البروتين و وظيفته.

ثانوية بوخالفة السبتي أم البواقي
السنة الدراسية 2017/2016

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية أم البواقي

الاختبار الأول في العلوم الطبيعية


المدة : ساعتان

المستوى : 03 علوم تجريبية

التنظيم الجيد للإجابة دلالة على التفكير النير


التمرين الأول (08 نقاط) :

- I تمثل الوثيقة (01) بنية هامة تعمل على تنظيم المبادلات الخلوية و تحديد هويتها البولوجية .
- 1 - أ) ضع عنوان مناسب للوثيقة .
 - ب) تعرف على البيانات المرقمة
 - 2 - أ) ماهي أهم خاصية تتميز بها هذه البنية ؟
 - ب) أذكر التجربة التي تثبت هذه الخاصية .



- II (01) تلعب العناصر (X) من الوثيقة (01) أدوار هامة في حياة الخلية و للكشف عن بعض الأدوار تجري الأعمال التجريبية التالية :

نقوم بقياس تحلون الدم و تركيز الأنسولين في دم شخص شخصين (أ) و (ب) كلاهما مصاب بالداء السكري بعد تناولهما لنفس الكمية من المحلول السكري . النتائج ممثلة في الوثيقة (02)




أ- ما هي الاشكالية العلمية التي تطرحها نتائج قياسات الشخص (ب) ؟

ب- اقترح فرضيات تفسير تلك الاشكالية ؟

ت- للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة نحقق أنسولين متخلص من الشخص (أ) في الشخص (ب) فلو حظ تعديل التحلون لديه .

ج- هل تؤكد هذه النتيجة صحة احدى الفرضيات ؟ علل

02 (تسبب تطور الداء السكري عند الشخص (ب) في فشل كلوي أستلزم اجراء عملية زرع كلوي و للحصول على كلية تقدم لهذا الغرض ثلاثة أفراد متطوعين (س ، ص ، ع) من أجل تحديد الأنسب منهم أجريت الاختبارات المبينة في الوثيقة (03) .



الاختبار الأول :

أخذت من الشخص (ب) خلايا لمفاوية و بلعمية و زرعت على أربعة أوساط أضيف لكل وسط منها خلايا كلوية لأحد الأفراد المتطوعين (س ، ص ، ع) و كذلك الخلايا الكلوية للمصاب (ب) . الشكل (1) يبين نتائج الاختبارات النسيجية المتحصل عليها .


الاختبار الثاني :

الشكل (2) يمثل نتائج الاختبارات الوراثية (تحديد أليات الذات)

- أ- باستغلال نتائج الشكل (2) حدد المتطوع الأنسب . علل إجابتك
- ب- هل نتائج الاختبارات النسيجية منسجمة مع الاختبارات الوراثية ؟ وضح ذلك
- ت- إذا اعتبرنا أن نتائج الاختبار الثاني لا يرقى إليها الشك . حدد إذا الشخص الذي يجب إعادة اختباراه الأول

التمرين الثاني (12 نقطة)

- تأخذ البروتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتين لآخر، كما تقوم البروتينات بأداء أدور مختلفة في الخلايا الحية.
- 1 - 1 - يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 1 بعض التفاعلات الأيضية التي تحدث على مستوى الخلية.
- أ - حدد نوع التفاعل الذي يحفز كل من الإنزيم فوسفوغلوكوميلاز و الإنزيم غليكوكينااز .
- ب - علل إذن أن للإنزيم تأثير نوعي.



الوثيقة 1

2 - يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نمذجة جزيئية للتحفيز الإنزيمي للغليكوكينااز .

أ - سم البيانات المرقمة من 1 إلى 5.

ب - تعرف على البنية الفراغية لأنزيم الغليكوكينااز . علل اجابتك ؟

ج - ما هي المعلومة التي يقدمها الشكل (ب) من الوثيقة 1 فيما يخص كيفية تشكيل المعقد 'إنزيم - مادة التفاعل' ؟

د - مثل برسم تخطيطي طريقة ارتباط إنزيم الغليكوكينااز بمادة التفاعل والنتائج عن تفاعل الشكل (ب).

3 - لابرار العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين ننجز الدراسة التالية :

نقدم لك المعطيات التجريبية التالية :

المعطيات 1 : توضع خميرة (*sacccchomyces cervisiae*) لمدة ساعتان في وسط يحتوي على الغلوكوز كمصدر وحيد للطاقة، ثم نقيس تركيز بعض المواد الأيضية داخل الخلايا عند سلالة طبيعية وسلالة طافرة على مستوى المورثة التي تشفر لإنزيم فوسفوغلوكوايزوميراز (*pgi1*). نتائج القياسات ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2 .

أ - حلل وفسر النتائج الممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة 2. ماذا تستنتج؟

المعطيات 2 : إنزيم الغليكوكينااز يتكون من سلسلة واحدة متعددة الببتيد مكونة من 465 حمض أميني . درس الباحثون أنزيمات الغليكوكينااز المحتوية على حمض أميني مستبدل نتيجة حدوث طفرة على مستوى المورثة . يتم التعبير على نشاط الإنزيم من خلال سرعة التفاعل (V_{max}) في شروط تجريبية مثلى ، مع توفر كمية معتبرة من مادة التفاعل. نتائج القياسات المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

التركيز داخل الخلية (nmol/mg من المادة الجافة)		الجزينات
سلالة طافرة pg1	سلالة طبيعية	
76.20	2.07	غلوكوز-6-فوسفات
<0.10	0.43	فراكتوز-6-فوسفات
0.87	5.30	ATP

الشكل-أ-

Vmax	الحمض الاميني المستبدل	الحمض الاميني الاصلي	موقع الحمض الاميني المستبدل بواسطة الطفرة	
100				انزيم طبيعي
51	Arginine (ارجينين)	Glycine (جليسين)	175	انزيمات طافرة
0.5	Alanine (ألانين)	Valine (فالين)	203	

الشكل-ب-

الوثيقة 2

ب - حلل وفسر نتائج الشكل (ب) من الوثيقة 2. ماذا تستخلص فيما يخص العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟

II- باستغلال النتائج التي توصلت اليها ومعلوماتك المكتسبة ، ميز بين كل من:

- المحفز والانزيم
- ناتج التفاعل ومادة التفاعل
- سرعة التفاعل و السرعة الابتدائية (Vmax)
- الموقع الفعال والمعقد ES


اللهم أجعل الامتحان سهلا و أنزل السكينة على قلبي
و ذكرني ان نسيت

بالتوفيق : أساتذة المادة

اختبار الثلاثي الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتعرض العضوية إلى عوامل خارجية مختلفة تؤدي إلى إثارة الجهاز المناعي الذي له القدرة على معرفة الذات و اللادات بفضل جزيئات الغشاء الهولي للخلايا , ولدراسة الخصائص البنوية لهذا الغشاء نقوم بالدراسة التالية :




تمثل الوثيقة 01 نمودجا لبنية الغشاء الهولي لخلية حيوانية.

- 1- تعرف على البيانات المرقمة في الوثيقة ؟
- 2- صف بنية الغشاء الهولي محدد السطح الداخلي والخارجي مع التعليل ؟
- 3- بناء على النموذج المقترح استخرج مميزات الغشاء الهولي؟
- 4- من خلال معارفك وما توصلت إليه من هاته الدراسة أعط مفهوم الذات والادات ؟ .

التمرين الثاني: (07 نقاط)

البروتينات جزيئات شديدة التنوع ، يخضع اصطناعها إلى آليات دقيقة ، لإظهارها نقوم بالدراسات التالية:




I) نقوم بحقن خلايا بيضية لضفدع بخيوط البوليزوم معزول من الخلايا الإنشائية لكريات الدم الحمراء لأرنب ثم نحضنها في وسط به أحماض أمينية مشعة . نستخلص البروتينات المشعة ثم تفصل بتقنية التسجيل اللوني والنتائج في الشكل (أ) من الوثيقة (01):

- 1- (أ) ما هو البوليزوم ؟
- (ب) ما هي المعلومة المستخرجة من تحليلك للشكل (أ) من الوثيقة ؟
- 2- الشكل (ب) من الوثيقة (01) يوضح رسم تخطيطي لصورة مجهرية لنشاط مورثة الخلية الإنشائية لكريات الدم الحمراء . أ- تعرف على النشاط المعني وكذا البيانات المرقمة ؟
- ب- كيف تسمح الوثيقة (01) بإبراز علاقة هذا النشاط بكمية البروتين المتشكلة في الخلية ؟
- ج- قدم رسما تخطيطيا تفسيريا على المستوى الجزيئي عليه كافة البيانات للجزء المؤطر في الشكل (ب).

(II) عند تتبع مسار الإشعاع السابق في الخلايا البيضية للضفدع نلاحظ انه يمر بعدة مستويات قبل الاستخلاص النهائي للبروتينات المفردة .

الشكل (أ) من الوثيقة (02) يوضح هذه المستويات كما تحدد منحنيات الشكل (ب) زمن مرور الإشعاع من مستوى إلى آخر ؟

- 1- هل للإشعاع علاقة بتحديد بناء البروتين ؟ علل ذلك ؟
- 2- حل وفسر منحنيات الشكل (ب) من الوثيقة (02) ؟
- 3- حدد وظائف العضيات التي مر بها الإشعاع في كل مستوى ؟



التمرين الثالث: (08 نقاط)

تأخذ البروتينات بعد تركيبها بنيت فراغية محددة تسمح لها بأداء وظيفتها داخل أو خارج الخلية ، ويعتبر النشاط الإنزيمي احد هذه الوظائف.

(I) يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) البنية الفراغية لجزيئة بروتينية وظيفية تتكون من 125 وحدة بنائية تم الحصول عليها باستعمال برنامج راسنوب ، بينما يمثل الجدول (ب) الصيغ المفصلة للجذر R لثلاث أحماض امينية تدخل في تركيب هذه الجزيئة ورقم تسلسلها و ال PH الخاص بها .

الشكل ج	الجذر R	PHi	الوحدات البنائية	
الشكل ج	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}_2-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	5.98	leu	15
	$-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$	9.74	lys	07
	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$	2.77	Asp	27
الجدول - ب -				
الوثيقة - 1 -				

1- (أ) ما هو النموذج الذي تم به عرض البنية ؟

(ب) صف البنية الفراغية للبروتين محددا المستوى البنائي لها ، مع التعليل ؟

(ج) صنف الوحدات البنائية في الجدول (ب) محددا معيار التصنيف ؟

2- تنشأ بين الأحماض الأمينية أنواع من الروابط بعضها ممثل في الشكل (ج) من الوثيقة (01)

(أ) استنتج أنواع الروابط (A,B) ، ثم اقترح انواعا اخرى للروابط التي تميز هذه البنية ؟

(ب) فسر دور هذه الروابط ؟

3- (أ) ما هو سلوك هذه الوحدات في محلول ذو $\text{PH} = 5.5$ (كل واحد على حدا) ؟ مع التعليل وكتابة الشكل الشاردي ؟

(ب) استنتج الخاصية التي تتميز بها هذه المركبات ؟

(II) لتحديد طبيعة وخواص الإنزيمات ، ننجز التجارب الملخصة في الجدول التالي :

التجارب	الشروط التجريبية	المعاملة بالماء اليودي (النتيجة)
1	أنبوب اختبار 1 + محلول النشاء + أميلاز ، $2 = PH$ أنبوب اختبار 2 + محلول النشاء + أميلاز ، $7 = PH$ أنبوب اختبار 3 + محلول النشاء + أميلاز ، $10 = PH$	وجود النشاء (-). (+). وجود النشاء (-).
2	أنبوب اختبار 4 + محلول النشاء + أميلاز ، درجة الحرارة $0^{\circ}C$ وبعد 10 دقائق نرفع درجة الحرارة الى $30^{\circ}C$. أنبوب اختبار 5 + محلول النشاء + أميلاز ، درجة الحرارة $60^{\circ}C$ وبعد 10 دقائق نرفع درجة الحرارة الى $30^{\circ}C$.	وجود النشاء (-)، بعد 10 دقائق (+) وجود النشاء (-)، بعد 10 دقائق (-)
3	أنبوب اختبار 6 + محلول النشاء + أميلاز ، $7 = PH$ أنبوب اختبار 7 + محلول النشاء + بيبيسين ، $7 = PH$	(+). وجود النشاء (-).

1- انطلاقا من تحليلك للنتائج، ما هي المعلومات المستخلصة حول خصائص الإنزيم ؟

2- كيف تفسر النتيجة المتحصل عليها في أنبوب الاختبار 4 ؟

3- مثل برسم تخطيطي حالة الإنزيم في الأنابيب : 2، 5، 7.

(III) انطلاقا مما توصلت عليه ومن معلوماتك، كيف تسمح الوحدات البنائية بتحديد البنية الفراغية للبروتين وبالتالي وظيفته مبينا في

ذلك العوامل المؤثرة في عمل الإنزيمات كمثال لبنية وظيفية ؟

ضع دائما صورتك التي تريد أن تكون عليها في
عقلك و مخيلتك ، و ستتجه تدريجيا نحوها ... إذا
لم تهزم نفسك ، ستهزمك نفسك ... سلم النجاح لا
يعاني من الازدحام في اعلاه




ملاحظة : تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الاسود .

التمرين الاول : (5 نقاط)

يتميز الغشاء الهولي للخلايا الحيوانية ذات النواة ببنية جزيئية تسمح بتمييز الذات من اللاذات ، ولمعرفة ذلك نُقترح الدراسة التالية :

1 - يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نموذجاً لبنية الغشاء الهولي لخلية لمفاوية .



أ- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 6 .

ب- حدد السطح الخارجي والداخلي للغشاء الهولي ، مع التعليل .

ج- بناءً على النموذج المقترح في الوثيقة (1) استخرج ميزة الغشاء الهولي ، معللاً اجابتك .

رقم التجربة	الشروط التجريبية	الفحص المجهرى لمنطقة الحقن
01	ننزع خلايا لمفاوية من فار 1 ثم يعاد حقنها فيه بعد معالجتها بالإنزيم الغليكوسيداز	خلية بالعة ← خلية لمفاوية ←
02	ننزع خلايا لمفاوية من فار 1 ثم يعاد حقنها فيه دون أية معالجة	
03	ننزع خلايا لمفاوية من فار 2 ثم يعاد حقنها في الفار 1	

2 - بهدف تحديد دور الغشاء الهولي في تمييز الذات

والتعرف على اللاذات تجري التجارب الثلاث التالية :

أ- فسر هذه النتائج ، وماذا تستخلص ؟

ب - يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) رسم تخطيطي

لبنية الغشاء الهولي للخلية للمفاوية للفار 1

المعالجة بالإنزيم غليكوسيداز .

** ماهي المعلومة التي تقدمها هذه النتيجة فيما يخص

تأثير هذا الإنزيم . مع التعليل .

التمرين الثاني : (7 نقاط)

يخضع بناء الجزيئات البروتينية في الخلايا الى آلية دقيقة ومنظمة . ولتوضيح بعض جوانب هذه الآلية نُقترح الدراسة التالية :


I - للتعرف على كيفية اشراف المورثة على بناء الجزيئات البروتينية نجري التجربة الممثلة مراحلها ونتائجها في الوثيقة (1) .

1- اعتمادا على الوثيقة (1) :


أ- حلل التجربة ونتائجها .

ب- ما هي المشكلة العلمية المراد معالجتها بتجربة الوثيقة (1) ؟

ج- ما هي المعلومة التي يمكن استنتاجها من هذه التجربة ؟



2- تمر عملية تركيب البروتين س (أ) بمراحل هامة على مستوى النواة والهيولى ، والوثيقة (2) تظهر بعض هذه المراحل :



أ- تعرف على البيانات المرقمة (من 1 الى 6) والاحماض الامينية (من A1 الى A5) و البنييتين (س) و (ص) للوثيقة (2) .

ب- صف الاحداث التي سمحت بالانتقال من الشكل (أ) الى الشكل (أ) .

ج- لماذا تعتبر المرحلة الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (2) أساسية ؟ مثلها برسم تخطيطي تفسيري عليه كلفة البيانات .

الجزء الاول من البروتين س (ب) Met - Lys- Trp- Trp- Gly

II - ان التحليل الكيميائي لجزء من البروتين س (ب) أعطى النتائج التالية :

اعتمادا على هذه النتائج التجريبية ومعلومات الوثيقة (2) ومعطيات جدول الشفرة الوراثية

*** استخراج جزء المورثة المشرفة على تركيب الجزء الاول من البروتين س (أ) و البروتين س (ب) .

الحمض الاميني	Met	Trp	Gly	Lys	Pro	Phe
الرمزة الموافقة	AUG	UGG	GGC	AAA	CCG	UUC

جدول الشفرة الوراثية

التمرين الثالث : (08 نقاط)

يعتبر النشاط الإنزيمي مظهرا من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات , و الذي يرتبط أساسا ببنيته الفراغية و يتم وفق شروط ملائمة لحياة الخلية .



I - الأميلاز انزيم يعمل على اماهة النشاء على مستوى الانبوب الهضمي .

- تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز (أحادي السلسلة الببتيديّة)

أخذت عن برنامج محاكاة Rastop.

1- تعرف على المستوى البنائي لجزيئة الأميلاز مع التعليل .

2- اذكر الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات هذه البنية .

3- للتعرف على أهمية الموقع الفعال في نشاط

انزيم الأميلاز أجريت المراحل التجريبية التالية :

أ - فسر نتائج التجريبتين 3 و 4 .


ب - ماذا تستنتج بخصوص الموقع الفعال .

مرحل التجربة	الشروط التجريبية	النتائج التجريبية	
		نشتت النشاء	إماهة النشاء
①	أميلاز طبيعي (غير طافر) + نشاء	+	+
②	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Thr 52) + نشاء	+	+
③	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Trp 58) + نشاء	-	-
④	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Asp 197) + نشاء	+	-

II- يقوم إنزيم اللاكتاز بإماهة اللاكتوز ($C_{12}H_{22}O_{11}$) إلى غلوكوز وغلكتوز .

تمّ قياس السرعة الابتدائية (V_i) لتفاعل الإماهة بدلالة تركيز اللاكتوز في غياب مادة الثيولاكتوز و في وجودها.

النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) , بينما يمثل الشكل (ب) كمية الركيزة S والنتاج P بدلالة PH الوسط (في غياب الثيولاكتوز) , حيث تمت القياسات بعد مرور نفس الوقت للأوساط الثلاث .



الوثيقة 2

1- فسر نتائج الشكل (أ) في وجود وفي غياب الثيولاكتوز؟ اذا علمت ان الثيولاكتوز ($C_{12}H_{22}O_{10}S$)

2 - أ - حلل نتائج الشكل ب . وماذا تستنتج ؟.

ب - فسر نتائج الشكل (ب) عند PH=2 .

III- من خلال ما توصلت اليه في الدراسة السابقة ومن معلوماتك . قدم تعريفا للإنزيم مبرزاً أهم خصائصه .

الاجابة النموذجية لاختبار الفصل الاول في مادة علوم الطبيعة والحياة (((3 ع ت))

النقطة		عناصر الاجابة	التمرين																
المجموع	مجزأة																		
5نقاط	0.25*6	1- أ- البيانات : 1- طبقتين فوسفوليبيديتين / 2 – بروتين سطحي داخلي / 3- بروتين ضمني 4- غليكوبروتين ب- السطح الخارجي يوافق الوسط (أ) والسطح الداخلي يوافق الوسط (ب) *** التعليل السطح الخارجي يوافق وجود السلاسل السكرية . ج- الميزة : فسيفسائي . التعليل : يتكون من طبقتين فوسفوليبيديتين يتخللهما بروتينات مختلفة الاحجام ومتباينة الاوضاع. 2- أ- التفسير : ** تج 1 : مهاجمة الخلية البلعمية للخلية للمفاوية يدل على اعتبارها لاذات بسبب المعالجة الانزيمية . ** تج 2 : عدم مهاجمة الخلية البلعمية للخلية للمفاوية لانها من الذات (أو : تماثل CMH). ** تج 3 : مهاجمة الخلية البلعمية للخلية للمفاوية لانها ليست من الذات (أو لاختلاف CMH) . الاستخلاص : تستطيع العضوية ان تميز عناصر الذات وتتسامح معها وتتعرف على عناصر اللاذات وتهاجمها . ب- المعلومة : انزيم الغليكوسيداز يخرّب الغليكوبروتينات . التعليل : عدم وجود الغليكوبروتينات في غشاء الشكل (ب) من الوثيقة (1) .	الاول																
7نقاط	0.25*3 0.5 0.5 0.25*6 0.25*4 0.5 0.75 0.25*6	I – 1- أ- تحليل التجربة ونتائجها : - ننزع نواة الخليتين (أ) و(ب) ، - ثم نزرع نواة الخلية (أ) في الخلية (ب) منزوعة النواة ، - وبعد الحضان الخلية الجديدة نلاحظ انها انتجت بروتين س (أ) ب- المشكلة العلمية : مقر المعلومة الوراثية المحددة للصفة الوراثية // أو اثبات ان النواة هي مقر المعلومة الوراثية ج- المعلومة المستنتجة : النواة هي مقر المعلومة الوراثية المحددة للصفة الوراثية (مقر المعلومة المحددة لنوع البروتين) 2- أ- البيانات : 1- رامزة الانطلاق / 2-الموقع P / 3- حمض أ / 4-تحت وحدة كبيرة / 5- الموقع A / 6- ARNt . 6- رامزة مضادة / Gly// A5 – Phe // A3 – Lys // A2- Met // A1- س-ADN//ص-ARNm . ب- وصف الاحداث: - انفصال الحمض A3 عن ARNt الحامل له - ارتباط الحمض A3 بالحمض Trp - حركة الريبوزوم بمقدار رامزة - دخول ARNt الحامل للحمض A5 في الموقع A ج- مرحلة الاستنساخ اساسية: لانها تسمح بتصنيع ARNm ينقل المعلومة الوراثية من النواة الى الهيولى مقر تركيب البروتين ... الرسم التخطيطي التفسيري لمرحلة الاستنساخ : انظر الكراس // الكتاب المدرسي . II – استخراج جزء المورثة المشرفة على الجزء الاول من البروتينين (أ) و (ب) : <table><tr><td>الجزء الاول من البروتين س (أ)</td><td>Met - Lys- Phe- Trp- Gly</td></tr><tr><td>ARNm</td><td>AUGAAAUUCUGGGGC</td></tr><tr><td>السلسلة الناسخة</td><td>TACTTTAAGACCCCG</td></tr><tr><td>السلسلة غير الناسخة</td><td>ATGAAATTCTGGGGC</td></tr></table> <table><tr><td>الجزء الاول من البروتين س (ب)</td><td>Met - Lys- Trp- Trp- Gly</td></tr><tr><td>ARNm</td><td>AUGAAAUUGGUGGGGC</td></tr><tr><td>السلسلة الناسخة</td><td>TACTTTACCACCCCG</td></tr><tr><td>السلسلة غير الناسخة</td><td>ATGAAATGGTGGGGC</td></tr></table>	الجزء الاول من البروتين س (أ)	Met - Lys- Phe- Trp- Gly	ARNm	AUGAAAUUCUGGGGC	السلسلة الناسخة	TACTTTAAGACCCCG	السلسلة غير الناسخة	ATGAAATTCTGGGGC	الجزء الاول من البروتين س (ب)	Met - Lys- Trp- Trp- Gly	ARNm	AUGAAAUUGGUGGGGC	السلسلة الناسخة	TACTTTACCACCCCG	السلسلة غير الناسخة	ATGAAATGGTGGGGC	الثاني
الجزء الاول من البروتين س (أ)	Met - Lys- Phe- Trp- Gly																		
ARNm	AUGAAAUUCUGGGGC																		
السلسلة الناسخة	TACTTTAAGACCCCG																		
السلسلة غير الناسخة	ATGAAATTCTGGGGC																		
الجزء الاول من البروتين س (ب)	Met - Lys- Trp- Trp- Gly																		
ARNm	AUGAAAUUGGUGGGGC																		
السلسلة الناسخة	TACTTTACCACCCCG																		
السلسلة غير الناسخة	ATGAAATGGTGGGGC																		
8نقاط	0.5 0.5 0.25*4 0.75*2 0.5 1 0.5 0.5 1 1	I – 1- المستوى : ثالثة . التعليل : سلسلة واحدة بها عدة بنيات ثانوية ومناطق انعطاف 2- الروابط : شارديّة// كارهة للماء // هيدروجينية // جسور كبريتية . 3- أ- التفسير :تج3 : عدم تثبيت النشاء وعدم امالته يدل على عدم تشكل المعقد ES بسبب عدم وجود تكامل بين الانزيم ومادة تفاعله نتيجة حدوث طفرة (تغير الحمض الاميني 58) . تج4: تثبيت النشاء يدل على تشكل المعقد ES لوجود تكامل بنيوي وعدم امالة النشاء يدل على دم قدرة الانزيم على تحفيز التفاعل بسبب الطفرة (تغير الحمض الاميني 197) . ب- الاستنتاج : ينقسم الموقع الفعال الى منطقة تثبيت ومنطقة تحفيز . II – 1- التفسير : ازدياد السرعة يدل على ازدياد تشكل ES بسبب ازدياد S . ثبات السرعة تدل على تشبع الانزيم بالركيزة S . في وجود الثيولاكتوز السرعة اقل مما يدل على تناقص تشكل المعقد ES بسبب ارتباط الثيولاكتوز بالانزيم لوجود تشابه بين اللاكتوز والثيولاكتوز مما يعيق ارتباط اللاكتوز بالانزيم وبالتالي عدم تشكل ES يؤدي الى تناقص السرعة . 2- أ- التحليل : نلاحظ : ازدياد الناتج P وتناقص الركيزة S كلما زاد PH من 2 الى 7 . الاستنتاج : يؤثر PH في النشاط الانزيمي . ب- التفسير : الكمية القليلة من الناتج يدل على السرعة القليلة للانزيم بسبب تغير بنية الانزيم نتيجة PH غير المناسب (2) الذي يؤثر على الحالة الكهربائية لجذور الاحماض الامينية بالخصوص في الموقع الفعال لتصبح الشحنة الاجمالية موجبة وبالتالي تغير بنيته يعيق تشكل المعقد ES وبالتالي تناقص حدوث التفاعل . III – التعريف : الانزيم وسيط حيوي يتميز بتأثيره النوعي المزدوج على نوع التفاعل ومادة التفاعل في شروط حرارة وPH ملائمة للحياة .	الثالث																

التمرين الأول: (05ن)

لديك الأحماض الأمينية الممثلة بالوثيقة (1).

1. صنف هذه الأحماض الأمينية.

2. إذا علمت أن قيمة الـ pH_i للحمض الأميني الألانين Ala

تقدر بـ 6، أكتب صيغته الأيونية للـ Ala عند $pH=2$ و

$pH=12$ و $pH=6$

3. نضع مزيجا من الأحماض الأمينية (Lys, Ser, Ala) في

جهاز الهجرة الكهربائية عند $pH=6$

أ. حدد بالرسم مواقع هذه الأحماض الأمينية بعد الهجرة. (يعطى $pH_i \text{ Ser}=5.68$ و $pH_i \text{ Lys}=9.74$)


4. ليكن الببتيد التالي: Ala-Lys-Ser-Val. أكتب صيغته هذا الببتيد عند $pH=1$.

التمرين الثاني: (07ن)

يعتبر النشاط الإنزيمي مظهرا من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات، ويرتبط ذلك أساسا بالبنية الفراغية

للأنزيم الذي يعمل في شروط محددة.


I. إنزيم غلوكوز أوكسيداز GO يقوم كوسيط لتنشيط تفاعل أكسدة الغلوكوز كالتالي:



- باستعمال أنزيم GO تم اجراء سلسلة من التجارب عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب ExAO في ظروف ثابتة من (درجة الحرارة، الـ pH ، تركيز الإنزيم GO)، في وجود الأكسجين تم متابعة تغيرات تركيز الأكسجين في الوسط، وهذا باستعمال D-غلوكوز، و L-غلوكوز في تجربتين منفصلتين. النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

الوثيقة (1)

قياس تركيز الأكسجين



1. حلل ثم فسر النتائج المحصل عليها عند استعمال D-غلوكوز.

2. ماذا تستخلص من هذه النتائج؟

3. في زمن 5 دقائق، تم إضافة كمية من (D-غلوكوز، و L-غلوكوز)، و O₂ بتركيز 250 ميلي مول/ل

عبر المفاعل الحيوي للتركيب التجريبي المتصل بالحاسوب.

أ. ماهي النتائج المتوقعة الحصول عليها.

ب. ماهي المعلومة الإضافية التي يمكن تقديمها.

II. تظهر الوثيقة (2) البنية الفراغية لجزء صغير من الإنزيم، تشير الأرقام الموضحة في الوثيقة إلى العناصر

الفاعلة في الإنزيم.

1. سمّ البنية الممثلة في الوثيقة (2).

2. ماذا تمثل الأرقام (195، 102، 57).

3. ما أهمية العناصر المرقمة في نشاط الإنزيم.

4. كيف تسمح لك المعلومات المتوصل إليها من شرح

الاختلاف المسجل في النتائج المبينة في الوثيقة (1).


5. من خلال ما توصلت إليه ومعلوماتك، بين العلاقة

بين بنية الإنزيم ونشاطه الوظيفي.

التمرين الثالث: 08ن

I. تمثل البروتينات أهم جزيئات الكائنات الحية العالية التخصص، المحددة وراثيا والتي تميز السلالات والأنواع.

قصد كشف العلاقة بين الذخيرة الوراثية ومميزات الكائنات الحية نقترح الدراسة التالية:



أ. أخذت عينة كمن الفحص بالمجهر الإلكتروني لخلايا

من الفأر لها القدرة على إنتاج جزيئات بروتينية متخصصة والمتمثلة في هرمون الأنسولين.

1. تعرف على مكونات الخلية بوضع البيانات حسب الأرقام.



2. بين أن هذه الخلية مقر تدفق المعلومات في

الذخيرة الوراثية الى صفات.

ب. باستعمال تقنية التصوير الاشعاعي الذاتي، تم

الحصول على الصور الممثلة في الشكلين 1 و 2 من

الوثيقة (2)



1. ماهي المراحل التي يوضحها الشكلين (1) و (2) من ظاهرة تدفق المعلومة الوراثية؟
 2. بواسطة رسم تخطيطي وظيفي، اشرح آلية المرحلة المبينة في الشكل (1)، مبررا في ذات الوقت متطلباتها؟
 3. معتمدا على مخطط الشكل (2) ومعلوماتك، بين في نص علمي آلية حدوث هذه المرحلة.
- II. لدراسة الجزيئات التي تنتجها الخلايا السابقة، استخلصت قطع من الـ ARNm من خلايا بنكرياس حصان وثور. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3) بعض الرامزات من الـ ARNm لكل منهما.**

الثور	الحصان	ARNm
...GCUUCAGUU...	...ACAGGUAUC...	
8 9 10	8 9 10	
GUU.....Val	ACU.....Thr	
GCU.....Ala	AUU.....Ileu	
GGU.....Gly	ACA.....Thr	
UCA.....Ser	AUA.....Ileu	
UCU.....Ser	AUC.....Ileu	
UGU.....Ser		



الوثيقة (3)

الشكل (أ)

الشكل (ب)



1. بين كيف ترتبط الأحماض الأمينية الموافقة للرامزات: 8، 9 و 10 في أنسولين الحصان.
 2. استخرج أجزاء المورثة المسؤولة عن تشكل هذا الجزء من الأنسولين لكل حيوان (الحصان والثور).
 3. سمح استعمال تقنيات الإعلام الآلي من الحصول على الشكل (ب) من الوثيقة (3)، وهو التمثيل ثلاثي الأبعاد للأنسولين (نموذج مأخوذ ببرمجية Rastop).
- أ. تعرف على المستوى البنائي المُمثل، مبرزاً الروابط المساهمة في ثبات هذه البنية.

III. باستعمال المعلومات المحصل عليها في الجزأين (ا و اا)، ومن معلوماتك الخاصة، أكتب نصا علميا توضح فيه كيفية الانتقال من البنية الممثلة في الشكل (2) من الوثيقة 2 إلى البنية الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 3، مع ذكر أهمية هذا الانتقال.

اختبار الثلاثي الأول في العلوم الطبيعية السنة الدراسية 2016/2017



التمرين الأول: للبروتينات عدة خصائص كيميائية وفيزيائية ادراسة بعض هذه الخصائص تجري الدراسة التالية

I-الأوسيتوسين (ocytocine) هرمون يفرزه الفص الخلفي لغدة النخامية عند الثدييات يتدخل خلال الولادة حيث يحفز تقلص العضلات الملساء للرحم، الوثيقتين 1- و 2 - تبين البنية الجزيئية لهذا الهرمون .



- 1- بأي نموذج تم تمثيل الوثيقة 2-
- 2- حدد عدد الوحدات التركيبية لهذا الهرمون مرقما أياها بالترتيب على الوثيقة 1- (المرفقة)؟ الترتيب يكون بوضع الرقم على ذرة الكربون المركزية C_α
- 3- أكتب الصيغة الكيميائية للحمض الأميني الأول والحمض أميني الأخير

II- لدراسة بعض خصائص الأحماض الأمينية تجري تفاعلين أحدهما في وسط حامضي و الآخر في وسط قاعدي على بروتين (الكازين) فنعتمد في ذلك على المبدأ الكيميائي التالي :



1- ما هي الخاصية التي توضحها هاتين المعادلتان؟ علل إجابتك .



2- ماهو مصدر هذه الخاصية و أهمتها من الناحية العملية ؟

التمرين الثاني: تعتبر النشاط الانزيمي من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات و الذي يرتبط اساسا ببنيتها الفراغية ويتم وفق شروط ملائمة لحياة الخلية

I- تمثل الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لإنزيم الريبونوكلياز الذي تكون من سلسلة وحيدة مكونة من 124 حمض أميني و4 جسور كبريتية

1. ماهو نوع البنية الممثلة في الوثيقة (1) ؟
2. ماهي أهميتها ؟ و ما الذي يعمل على تماسكها ؟

II-بالاعتماد على تجارب العالم Anfensen لإنزيم الريبونوكلياز نجري سلسلة من القياسات بدلالة المواد المضافة للوسط تتضمن: الشكل - أ - النسبة المئوية لتشكيل الجسور ثنائية الكبريت. الشكل - ب - تطور النشاط التحفيزي للإنزيم في وجود مادة التفاعل. و الوثيقة 2 - تمثل نتائج هذه الدراسة



- 1 - قدم تحليل مقارنا للنتائج المتحصل عليها للوثيقة 2 -

2--باستغلالك لهذه النتائج كيف تفسر تطور نسب التحفيز الإنزيمي

III-لدراسة نشاط هذا الإنزيم مخبريا يستخدم تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب (EXAO) وفي شروط تجريبية ملائمة

و ثابتة (PH ، درجة حرارة الوسط)


الوثيقة (-3-) تمثل نتائج تغيرات تركيز :

الأحماض الأمينية الحرة ((A))


ال : ((B))ARN النيوكليتيدات ((C))

قبل وبعد إضافة انزيم الريبونوكلياز .


1- فسر هذه النتائج وماذا تستنتج ؟



2- نعيد نفس التجربة ونغير في كل مرة إحدى متغيرات الوسط نتتبع تغيرات السرعة الابتدائية (V_i) لهذا الإنزيم بدلالة هذا المتغير النتائج المحصل عليها مثلت في الوثيقة-4-
أفسر النتائج المحصل عليها ثم حدد العامل المحدد ل سرعة التفاعل في الشكل ب .



الشكل ب




الشكل أ

الوثيقة 04

ب- مما سبق حدد العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل و غير المدروسة سابقا

التمرين الثالث:

البروتينات مركبات عضوية، حياة الكائنات متوقف على نشاطها ولمعرفة آليات تركيبها نقترح عليك الدراسة التالية:
I:- يمثل الشكل 1- من الوثيقة 1- قطعة من الـ ADN بداخل النواة، اما الجدول 1- من نفس الوثيقة يمثل البروتينات التي تم تركيبها في الهيولي نتيجة التعبير عنها.



الشكل 1- من الوثيقة 1-

جدول الوثيقة 1-

A	B	C	D	E	F	الـ ADN
1338	726	424	876	244	882	عدد النكليوتيدات في جزيئة الـ ADN
221	119	/	144	/	145	عدد الأحماض الأمينية الداخلة في البروتين
P4 (بروتين 4)	P3 (بروتين 3)	/	P2 (بروتين 2)	/	P1 (بروتين 1)	البروتين الناتج

1- أ - ما هي المعلومات التي تستخرجها من الشكل 1- و من جدول الوثيقة 1-

2- انطلاقا من الجدول حدد وحدة الشفرة الوراثية مع التعليل


ب - انطلاقا من مقر تواجد المعلومة الوراثية ومقر تركيب البروتين ما هي الإشكالية التي تطرحها معطيات الوثيقة (1)؟
ج - قدم فرضية لحل هذه الإشكالية.

2- للتحقق من صحة الفرضية نقترح التجارب الآتية:


3- انجز رسم تخطيطي عليه البيانات اللازمة تظهر فيه الآلية المبينة في الصورة a من الوثيقة 2-.



الوثيقة المرفقة (تعاد مع ورقة الإجابة): الاسم: اللقب:



الوثيقة المرفقة (تعاد مع ورقة الإجابة): الاسم: اللقب:



ملاحظة: اقرأ بتمعن، ركز، حاول ثم أجب بدقة. " ليس عليك أن تكتب كل ما تعرف بل أن تعرف ما تكتب".


على التلميذ أن يجيب على الموضوع التالي:

الموضوع:

التمرين الأول: للكشف عن بعض الآليات الخلوية التي تضمن الانتقال من اللغة النووية إلى اللغة البروتينية وإبراز بعض العناصر الضرورية

لحدوثها نقترح المعطيات التالية:


تعتبر الريبوزومات مقر لحدوث إحدى اليات تحويل اللغة النووية إلى اللغة البروتينية. تمثل الوثيقة (01) الصيغة الكيميائية لجزيئات متواجدة على مستوى الريبوزومات خلال نشاط هذه الأخيرة.



- 1- تعرف على المركبين الكيميائيين الممثلين بالشكلين (أ،ب)، ثم حدد مكان تواجدهما في الريبوزوم.
- 2- حدد نوع و أهمية وكيفية تشكل الروابط الكيميائية المشار إليها بالأرقام 1،2،3.
- 3- تعرف و صف المرحلة التي بواسطتها تم الحصول على المركب الممثل في الشكل (أ) مع تحديد متطلبات ومقر حدوثها.
- 4- مثل بمعادلة كيميائية فقط مراحل تشكل المركب الممثل في الشكل (أ). مبينا نوع التفاعل.
- 5- قدم تعريفا للبيان المشار إليه بالرقم 4.
- 6- بتوظيف الصيغ الكيميائية المعطاة في الوثيقة (1) ، صف الخطوة الموالية لتلك الممثلة في الوثيقة (1) .


التمرين الثاني: للبروتينات بنية فراغية محددة تكسبها تخصصا وظيفيا تتأثر بعوامل الوسط:

- I. يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم التيروسيناز (يشرف على تفاعل تركيب صبغة الميلانين)، بينما يمثل الشكل (2) الجزء الوظيفي للإنزيم:




1. تعرف على البيانات المرقمة في الشكل -1- من الوثيقة (01).
2. حدد المستوى البنائي لإنزيم التيروسيناز مع التعليل.
3. سم الجزء الوظيفي من الإنزيم، ثم قدم وصفا له اعتمادا على الشكل (2) من الوثيقة (01).
4. حدد تأثير استبدال الحمضين الأميين رقم 190 و 54 بحمضين آخرين على النشاط الإنزيمي. علل إجابتك.

II. باستعمال ExAO تم دراسة النشاط الإنزيمي، الشروط التجريبية والنتائج ممثلة في الوثيقة (02).




- 1- أكمل تطور المنحنى P من 1 إلى 3.
- 2- أكمل المنحنى ES بعد 2. علل إجابتك.

3- لإظهار العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي نقترح مايلي:



أ) يمثل الشكل (1) من الوثيقة (3) قياسات النشاط الإنزيمي بدلالة حرارة الوسط من خلال تقدير النسبة المئوية لتركيز الإنزيم E الحر. أما الشكل (2) يبين تمثيل للإنزيم أنجز خلال هذه القياسات. باستعمال معطيات الشكل (2) من الوثيقة (3)، فسر النتائج المحصل عليها في النقاط "أ"، "ب"، "ج" من الشكل (1). ماذا تستنتج؟



ب) تمت دراسة إمكانية تشكل المعقد (إنزيم - ركيزة) في ثلاث قيم مختلفة من الـ pH الوثيقة 04 تبين نمذجة النتائج المحصل عليها.


1. باستغلال الوثيقة 04 بين كيف يكون نشاط الإنزيم في الأشكال "س"، "ع"، "ص". علل ذلك.
من خلال ما تقدم ومعلوماتك، أذكر الشروط التي تسمح بتحقيق العلاقة بين الإنزيم والركيزة لإتمام التفاعل الإنزيمي.

III. الاماهة الجزئية لهذا الإنزيم سمحت بالحصول على عدة ببتيدات من بينها مركبين (س) و (ص). التحليل الكيميائي بين انهما يتكونان من بعض الأحماض الأمينية جذورها مبينة في الوثيقة 5

R=Lys (CH ₂) ₄ NH ₂	R= Asp CH ₂ COOH	R= Leu CH ₂ CH ₂ CH ₃ CH ₃	R=Tyr CH ₂ OH
pH _i 9.7	2.77	5.85	5.66

1- صنف الاحماض الامينية الأربعة مع التعليل (اجب في جدول).
2- باستعمال الصيغة المفصلة حدد شحنة كل حمض أميني في محلول ذو pH= 5,75 مع التعليل (اجب في جدول)
3- لمعرفة الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب المادتين (س) و (ص) قمنا بإجراء اماهة حامضية للمركبين، ثم عرضت نتائج الاماهة للهجرة الكهربائية، فكانت النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة 6 مع العلم أن كل بقعة توافق حمض أميني واحد.

4- استخرج الاحماض الامينية الداخلة في تركيب المادتين (س) و (ص).
5- سم المادتين (س) و (ص).
6- أكتب معادلة كيميائية تظهر فيها كيفية تشكل المركب (س).



الشكل 3

الفاشل يقول: الحل ممكن ولكنه صعب أما الناجح فيقول: الحل صعب ولكنه ممكن

انتهى - بالتوفيق -

التمرين الاول:

Rubisco أو Ribulose-5-bisphosphate Carboxylase Oxygénase هو إنزيم مميزه على مستوى الصانعات الخضراء يحفز النشاط الإنزيمي المرتبط بدمج غاز CO_2 المعدني في المادة العضوية المركبة من طرف النبات الأخضر خلال نشاط التركيب الضوئي


- ان بعض المضادات الحيوية (antibiotique) لها القدرة على كبح النشاط التركيبي للبروتين المتمثل في إنزيم Rubisco وقصد معرفة قدرة بعض الخلايا النباتية المستخلصة من أوراق نبات البازلاء على تصنيع البروتين في ضل وجود أو غياب المضاد الحيوي نقترح الدراسة التالية.

(I) التجربة -1-:

-نقوم بتحضير وسطين تحتوي على خلايا برانشيمية مستخلصة من أوراق نبات البازلاء وذلك في غياب أو وجود المضاد الحيوي و بعد مرور (30د) نظيف لكل وسط حمض أميني مشع (مثيونين مشع).

- في نهاية التجربة نتتبع تطور النشاط الإشعاعي على مستوى السلاسل الخفيفة (S) والسلاسل الثقيلة (L) المشكلة لإنزيم Rubisco على مستوى الخلايا البرانشيمية المستزرعة في كل وسط بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي والنتائج

التجريبية ممثلة ب الشكل - ب- من الوثيقة -1- اما الشكل - أ- من الوثيقة - 1- فيمثل البنية الفراغية لإنزيم Rubisco



1. ما هو المستوى البنائي الفراغي لإنزيم Rubisco مع التعليل.

2. على ماذا يعبر النشاط الإشعاعي الذي ظهر ضمن أوساط الزرع .

3. قدم تحليلا لنتائج الشكل (ب) من الوثيقة - 1- .

4. فسر هذه النتائج وماذا تستنتج؟.

(II) التجربة -2-:

قصد التأكد من النتائج السابقة حول مقر تأثير المضاد الحيوي في ظاهرة تركيب البروتين نقترح ما يلي:

1. اكمل البيانات المرقمة من الوثيقة -2-


2. أ- حلل الشكل - ب - من الوثيقة -2-

ب- ماذا تستنتج؟

3. أ- سم الالية الممثلة في الشكل - ب - من

الوثيقة -2-


ب- حدد مكان حدوثها بدقة.



4. اذكر العناصر الضرورية لحدوث هذه الالية مع تحديد دور كل عنصر في ذلك .
5. مثل بواسطة رسم تخطيطي وظيفي دقيق عليه كافة البيانات العضية المتدخلة في هذه الالية مع تحديد مميزاتها البنوية و الوظيفية

III (تمثل الوثيقة-3 - البنية الفراغية للسلسلة الثقيلة (L) لإنزيم Rubisco

1. ما هو النموذج الذي مثلت به هذه الجزيئة وما هو الهدف من ذلك؟.
2. يمثل الشكل (ج) جذور الاحماض الامينية وترتيبها في السلسلة الببتيدية المكونة للجزء المؤطر من الشكل (أ) والشكل (ب) من الوثيقة (3):
- أ- استنتج نوع الروابط التي يمكن تشكيلها انطلاقا من هذه الاحماض الامينية؟
- ب- اعد بناء الجزء المؤطر في الشكل ب باستعمال هذه الإحماض الأمينية .
- ج- ما هي المعلومات المستخلصة من هذا التمثيل الفراغي؟
3. اذكر كيف يؤثر المضاد الحيوي على البنية الفراغية لانزيم Rubisco وعلى وظيفته ؟





التمرين الثاني:


أولاً: تعتبر بكتريا pyloriHélicobacter من بين المسببات الرئيسية للقرحة المعدية لدى البشر، لكن وعلى اعتبار ان وسط المعدة يعتبر جد حامضيا pH=2 ، نتساءل كيف تمكنت من العيش ضمن هذا الوسط قبل استهدافها لبطانة المعدة اين تنمو و تتطور و للإجابة عن هذه الإشكالية نقدم المعطيات التالية:

- تستعمل بكتريا pyloriHélicobacter إحدى انزيماتها المتمثل في اليورياز في إماهة اليوريا (NH₂-CO₂-NH₂) و إفراز ناتج التفاعل المتمثل في الأمونياك (NH₃⁺) ضمن المستويات القريبة منها على مستوى المعدة.
- كما يتفاعل الأمونياك (NH₃⁺) مع أيونات (H₃O⁺) التي تسبب في حموضة المعدة .
- يظهر الشكل -أ- من الوثيقة 1 العلاقة بين جزيئات الماء وتراكيز (NH₃⁺) وقيمة الـ pH أما عن المعادلة-3 - فتمثل تفاعل شوارد الامونياك (NH₃⁺) مع أيونات (H₃O⁺)
- المعادلة-1- و-2- من الوثيقة-1- تظهر تحلل مركب اليوريا ضمن شروط تجريبية مختلفة.

الشكل أ العلاقة بين جزيئات H_2O وتركيز H_3O^+ وقيمة الـ pH



المعادلة 1 : يتم التفاعل بعد 60 سنة



المعادلة 2 : يتم التفاعل بعد 10×2^{-6} ثانية


الوثيقة 1

1. كيف تبرر المعادلة 1 و 2 الدور التحفيزي لأنزيم اليورياز؟ علل
2. قدم النمذجة الجزيئية التي تبرر النشاط الإنزيمي المدروس، مبرزاً نوع التفاعل
3. ما هي المعلومة الإضافية التي تقدمها المعادلة 2-
4. باستغلالك للمعادلة 3 - ومنحنيات الشكل أ- من الوثيقة 1:

– علل قدرة البكتريا على العيش ضمن الوسط المعدي الجد الحامضي؟

ثانياً: ضمن شروط تجريبية ممثلة في قيمة الـ pH المثلى وتركيز ثابت من اليوريا وانزيم اليورياز نقيس تطور السرعة الابتدائية للتفاعل (V_i) عند درجات حرارة مختلفة. كما نقيس السرعة الابتدائية لتفاعل كيميائي عند قيم متغيرة من درجات الحرارة والنتائج موضحة في الشكل 1- من الوثيقة 2-

يمثل شكل 2- من الوثيقة 2- تطور السرعة الابتدائية للتفاعل (V_i) عند تركيز ثابت من اليوريا وانزيم اليورياز وقيمة مثلى في درجة الحرارة و متغيرة لقيمة pH الوسط.



1-صف تأثير درجة الحرارة على السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي وكذا نشاط الإنزيمي لليورياز.

2-كيف تفسر هذه الاختلافات المسجلة؟

3-برر قيم السرعة الابتدائية عند مجال الـ pH (0-4).

4-نتابع تطور السرعة الابتدائية لنشاط انزيم اليورياز عند قيم مثلى من درجة الحرارة و pH الوسط عند

• تراكيز ثابتة من اليوريا و تراكيز متزايدة من جزيئات الانزيم.

• تراكيز عالية من اليوريا و تراكيز متزايدة من جزيئات الانزيم

➤ **ترجم** على شكل منحني بياني النتائج المتوقعة فيما يتعلق تطور السرعة الابتدائية للتفاعل؟

ثالثاً: بالاعتماد على هذه الدراسة ومكتسباتك **بين** ان انزيم اليورياز لايمكنه التأثير على مستوى المعدة .قدم بذلك مفهوماً دقيقاً للأنزيم.

التصحيح النموذجي :

التمرين الاول :

(I) التجربة 1 :

1. المستوى البنائي لانزيم الـ Rubisco : بنية رابعة
التعليل : احتوائه على تحت وحدات (12) كل تحت وحدة ذات بنية ثلثية و تتمثل في السلسلة الثقيلة L و السلسلة الخفيفة S ذات المستوى البنائي الثالثي.
2. يعبر النشاط الاشعاعي الذي ظهر ضمن اوساط الزرع على تكاثف الاحماض الامينية المشعة و اندماجها و ارتباطها بروابط بيبتيدية بتشكيل الوحدات البروتينية للسلاسل الثقيلة و الخفيفة لانزيم الـ Rubisco .
3. تحليل نتائج الشكل ب من الوثيقة 1 :
- نلاحظ بغياب المضاد الحيوي كانت نسبة الاشعاع التي بتركيز عالية تقدر بـ 100 %
- بغياب المضاد الحيوي : تناقص طفيف في نسبة الاشعاع بنسبة لتحت الوحدة الخفيفة S و تناقص كبير للاشعاع بالنسبة لتحت الوحدة الثقيلة L تقريبا 12%

4. التفسير :

نقص الاشعاع على مستوى تحت الوحدة L بوجود المضاد الحيوي يدل على عدم دمج الاحماض الامينية و عدم ارتباطها بروابط بيبتيدية قصد تركيب البروتين للسلسلة L و هذا لان وجود المضاد الحيوي عرقل حدوث عملية الترجمة.


الاستنتاج : نستنتج ان المضاد الحيوي عرقل او اعاق تركيب البروتين

(II) التجربة 2 :

1. البيانات المرقمة : 1 - رابطة استرية ، 2 - حمض اميني ، 3 - ARNt .
2. أ - تحليل الشكل ب من الوثيقة 2 : نلاحظ عدم ارتباط الحمض الاميني المنشط رقم 4 المثبت في الموقع A للريبوزوم بالثلاثي بيبتيد المرتبطة بالـ ARNt رقم 3
ب - الاستنتاج : نستنتج ان المضاد الحيوي يثبط عملية الترجمة حيث يمنع تشكل الرابطة البيبتيدية على مستوى الريبوزوم
3. أ - اسم الالية الممثلة في الشكل ب هي عملية الترجمة
ب - تحدث في هيولى الخلية بالتحديد على مستوى الريبوزومات
4. العناصر الضرورية لحدوث هذه الالية و دور كل عنصر.

العنصر	الدور
الـ ARNm	حامل و ناقل للمعلومة الوراثية من النواة الى الهيولى
الريبوزومات	تسمح بقراءة المعلومة الوراثية وتحويلها من اللغة النووية الى اللغة البروتينية
الـ ARNt	يثبت الحمض الاميني و ينقله و يقدمه للقراءة
الاحماض الامينية	الوحدة البنائية المكونة للسلسلة البيبتيدية
الـ ATP	الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل

5. الرسم التخطيطي الوظيفي




(III) النموذج الذي مثل به الشكل (أ) من الوثيقة 3 هو النموذج الشريطي والهدف من هذا التمثيل هو اظهار البنيات

الثانوية ومناطق الانعطاف (المناطق البينية) للبروتين ،كما يسمح لنا بمقارنة البنيات الفراغية للبروتينات.

2. نوع الروابط التي يمكن تشكيلها:

- رابطة بيبتيديية بين الوظيفة COOH للجذر المشترك للحمض الاميني 65 والوظيفة NH₂ للجذر المشترك للحمض الاميني 66 وبين الوظيفة COOH للجذر المشترك للحمض الاميني 169 والوظيفة NH₂ للجذر المشترك للحمض الاميني 170
- رابطة ثنائية الكبريت بين جذرين للحمضين الامنيين سيستيين رقم 66 و 170
- رابطة شاردية بين جذرين للحمضين الامنيين ذات الجذرين 65 و 169.

ب. اعادة بناء الجزء المؤطر



ج. المعلومات المستخلصة

- تقارب احماض امنية في البنية الثالثة هي في الحقيقة متباعدة في التمثيل البنائي الاولي (66 و 170 - 65 و 169)
- تشكل روابط محددة ودقيقة بين جذور هذه الاحماض الامنية يسمح باستقرار وتماسك البنية الفراغية
- استقرار وتماسك البنية الفراغية يسمح للبروتين باكتساب تخصصه الوظيفي

3. كيفية تاثير المضاد الحيوي على البنية الفراغية للانزيم وبالتالي وظيفته

ان المضاد الحيوي يمنع تشكل الرابطة البيبتيديية بين الاحماض الامنية للسلسلة البيبتيديية الثقيلة L للانزيم وبالتالي لا تتشكل البنية الفراغية للبروتين L احدى تحت الوحدات للانزيم ومنه غياب تركيب البنية الفراغية الرابعة الوظيفية للانزيم

التمرين الثاني :

اولا : 1 - يتضح من خلال مقارنة نتائج الوسطين مايلى:

في غياب الانزيم تطلب اتمام التفاعل مدة زمنية طويلة 60 سنة.


في وجود الانزيم تطلب اتمام التفاعل مدة زمنية جد قصيرة 2 x 10⁻⁵ ثانية.

-تؤكد هذه المقارنة أن وجود الإنزيم يقلل من المدة اللازمة لاتمام التفاعل فهو بذلك يسرع التفاعل ومنه يمكن القول أن الانزيم يلعب دور محفز.

2 - ابراز نوع التفاعل + النمذجة الجزيئية لنشاط إنزيم اليورياز:

أ- نوع التفاعل : إنزيم اليورياز يحفز تفاعل اماهة وتفكيك اليوريا ((NH₂-CO-NH₂)) إلى مادتي الأمونياك (NH₃) وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) ومنه يمكن القول أن نوع التفاعل المحفز من طرف إنزيم اليورياز هو تفاعل تفكيك

النمذجة الجزيئية :



1. المعلومة الاضافية :

ظهور إنزيم اليورياز ضمن جانب المتفاعلات وكذا جانب النواتج يعطي لهذا النمط من الجزيئات دور الوسيط الكيميائي أي أنه لا يستهلك خلال التفاعل الإنزيمي

2. -تعليل قدرة بكتيريا *elicobacter pylori* في العيش ضمن الوسط المعدي الجذ حامضي:

يسمح تحفيز تفاعل اليوريا من قبل إنزيم اليورياز بظهور مركب الأمونياك NH_3 كنتاج تفاعل.
-بعد إفراز جزيئات NH_3 من طرف البكتيريا ضمن المستويات القريبة منها تتفاعل هذه الأخيرة مع الأيونات التي تتسبب في حموضة المعدة والمتمثلة في أيونات الهيدرونيوم H_3O^+ وهو ما يقلل من تركيزها ويسمح بظهور الماء H_2O ضمن النواتج.
-انخفاض تركيز H_3O^+ وزيادة كمية الماء يقلل من الحموضة ويزيد من قيمة ال PH في المستويات القريبة من تواجد البكتيريا ويصبح هذا الوسط قريبا إلى التعادل وهو ما يجنبها تأثير حموضة المعدة
ثانيا : وصف تأثير درجة الحرارة على السرعة الابتدائية للتفاعل:

-نشاط إنزيم اليورياز:

-تتزايد السرعة الابتدائية للتفاعل بزيادة قيم درجة الحرارة ضمن وسط التفاعل ليبلغ هذا النشاط قيمة أعظمية V_{max} عند درجة الحرارة ($55^\circ C$ قيمة مثلى لدرجة الحرارة المميزة لنشاط هذا الإنزيم).
-عند قيم درجة الحرارة التي تفوق القيمة $55^\circ C$ نسجل تناقصا في قيمة السرعة الابتدائية بدلالة قيم درجة الحرارة المتزايدة ضمن هذا المجال.

-التفاعل الكيميائي:

-تتزايد السرعة الابتدائية للتفاعل بزيادة قيم درجة الحرارة ويستمر هذا التزايد المسجل مهما زادت قيم درجة الحرارة ضمن وسط التفاعل.

تفسير الاختلافات:

- من $55^\circ C$ فما فوق:

أ -**نشاط اليورياز** : عند قيم درجة الحرارة التي تفوق القيمة $55^\circ C$ التناقص في قيمة السرعة الابتدائية بالنسبة لنشاط إنزيم اليورياز يرتبط بتأثير درجات الحرارة العالية على البنية الفراغية لإنزيم اليورياز آخذين بعين الاعتبار طبيعته البروتينية ويرتكز هذا التأثير على الروابط الكيميائية خاصة المتعلقة بالمستوى البنائي الثالثي مما يؤثر على الشكل الفراغي للموقع الفعال وتضعف قدرته على إحتواء الركيزة وهو ما يقلل من كفاءة التحفيز الإنزيمي.
ب -**التفاعل الكيميائي** : إستمرار التزايد في قيمة السرعة الابتدائية نفسرها بأن زيادة درجة الحرارة ترفع من الطاقة الحركية لعناصر وسط التفاعل . وبالتالي فإن الجزيئات تتحرك بسرعة أكبر مما يرفع من فرص التصادمات فيما بينها وبذلك تكون هذه التصادمات أكثر فعالية على كفاءة النشاط التفاعلي
ملاحظة : رفع درجة الحرارة بمقدار عشر درجات مئوية يؤدي الى مضاعفة سرعة التفاعل الكيميائي لمعظم التفاعلات الكيميائية.

التبرير:

-عند مجال قيم ال PH من 1 إلى 4 نسجل نشاط إنزيمي ضعيف جدا يكاد يكون منعدما.

-يمكن أن نبرر هذه العلاقة بما يلي:

-مجال ال PH من 1 إلى 4 يعتبر حامضيا وهو ما يجعل من جزيئات إنزيم اليورياز تسلك سلوك قاعدة آخذين بعين الاعتبار طبيعته البروتينية.

-يترجم هذا السلوك إلى شحنة إجمالية موجبة لجزيئات إنزيم اليورياز.

-يؤثر هذا السلوك على الحالة الأيونية لجذور الأحماض الأمينية خاصة المنتمية للموقع النشط للإنزيم (الموقع الفعال) مما يؤثر على قدرته في بناء روابط إنتقالية ضعيفة مع بعض المجاميع الكيميائية جزيئات الركيزة وبذلك تقل كفاءة التحفيز
ثالثا:

PH : المعدة جد حامضي $PH=2$


وحسب المعطيات فإن هذه القيمة تمنع وتثبط عمل إنزيم اليورياز الذي ينشط في قيم PH تقدر ب6 اين يكون نشاطه اعظمي وهذا ما يؤكد عدم تأثيره على المعدة

-مفهوم الإنزيم:

-جزيئات ذات طبيعة بروتينية تعمل على تسريع التفاعل ، تتدخل بشكل وسائط كيميائية ولا تستهلك خلال التفاعل ، ترتبط خصوصيته بامتلاكه لموقع فعال ، نشاطها يتطلب توفر شروط ملائمة من ال PH ودرجة الحرارة كما أن هذا النشاط يتأثر بالعوامل المحيطة ضمن وسط التفاعل.

التمرين الأول: (05 نقاط)

لغرض فهم آليات تركيب البروتين و التعرف على بعض البنيات المتدخلة في ذلك أنجزت الدراسة التالية:-
تمثل الوثيقة 1- رسم تفسيري لصورة بالمجهر الإلكتروني لمرحلة من مراحل التعبير المورثي عند حقيقيات النوى.




الوثيقة 1-


1. قدم عنوانا مناسباً للوثيقة 1- ثم سم العناصر المشار بالأرقام من 1 إلى 4 .
2. فسر التغير التدريجي لأطوال العناصر 3 .
3. مثل الجزء المؤثر برسم تخطيطي تفسيري عليه كافة البيانات للظاهرة الموضحة في الوثيقة 1-.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I. يوضح الشكل أ- من الوثيقة 1- البنية الفراغية لإنزيم ARNase تم الحصول عليها باستعمال برنامج Rastop، بينما يبين الشكل ب- من الوثيقة 1- قطعة ببتيدية قصيرة من هذا الإنزيم.



الشكل - ب




الشكل - أ

الوثيقة 1-

1. سمّ البيانات المرفقة في الشكل أ-.
2. انطلاقاً من الشكلين أ و ب - ضع تعريفاً دقيقاً للبنية الفراغية .
3. بالاعتماد على معارفك و معطيات الشكل ب- :-
a. استخرج عدد الأحماض الأمينية المكونة للقطعة الببتيدية ثم صنف الحمضين A و B مع التعليل.
b. ما هو دور هذه الأحماض الأمينية على مستوى الإنزيم.

II. تمثل الوثيقة 2- نتائج فصل ثلاثة أحماض أمينية : Lys , Glu , Cys بتقنية الهجرة الكهربائية ضمن درجة PH مجهول



الوثيقة 2-

1. اعتماداً على معطيات الجدول أدناه انسب البقع A , B , C إلى الأحماض الأمينية الموافقة، مع التعليل.
2. مثل الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية السابقة عند PH= 9.74


الحمض الأميني	Lys	Cys	Glu
PHi	9.74	5.02	3.08
الجذر (R)	$-(CH_2)_4-NH_2$	$-CH_2-SH$	$-(CH_2)_2-COOH$

التمرين الثالث: (08 نقاط)

I.

تمثل

الوثيقة 1- جزء من إنزيم كربوكسي ببتيداز (أ) (Carboxypeptidase A) بين العلاقة بين الركيزة و الموقع الفعال.



الوثيقة 1

1. حلل الشكل ب- من الوثيقة (1).

2. ما هي المعلومة الممكن استخراجها من الوثيقة (1) فيما يخص نشاط الإنزيم السابق.

II.

الكيموتريبسين (Chymotrypsine) والكربوكسي ببتيداز (أ) (Carboxypeptidase A) إنزيمان يتواجدان في العصارة البنكرياسية، بحيث يحفز كل أنزيم تفاعل كسر الرابطة الببتيدية من الناحية الكربوكسيلية للحمض الأميني ضمن سلسلة متعدد الببتيد. علماً أن إنزيم الكربوكسي ببتيداز (أ) لا يؤثر على القطع الببتيدية الناتجة إلا بعد تأثير إنزيم الكيموتريبسين.

تمثل الوثيقة (2) موقع تأثير كل إنزيم على القطعة الببتيدية.



الوثيقة 2-

1. حدد الحمض الأميني المستهدف من طرف كل إنزيم.

2. ما هي نتيجة تأثير إنزيم الكربوكسي ببتيداز (أ) على القطعة الببتيدية الموضحة في الوثيقة (2)؟ وضح التفاعل الحاصل بواسطة رسم تخطيطي.


III. يتأثر النشاط الأنزيمي بشروط الوسط فقد يكون أعظمي . ضعيف أو منعدم .

اعتماداً على معارفك وعلى ما جاء في التمرين اشرح في نص علمي :-

• العلاقة بين البنية الفراغية و التخصص الوظيفي للإنزيم.

• آلية تأثير درجة حرارة الوسط على التخصص الوظيفي للإنزيم.

أسرة المادة تمنى لكم كل التوفيق

ن. إ	ن جزئية	عناصر الإجابة
01.5 01.5 02	0.5 01	التمرين الأول: 05 نقاط 1. العنوان: رسم تخطيطي تفسيري لظاهرة الاستنساخ عند حقيقيات النوى. البيانات: (1) ADN، (2) إنزيم ARN بوليميراز، (3) جزيئة ARN _m ، (4) اتجاه الاستنساخ.
	01.5	2. تفسير التغير التدريجي لأطوال العناصر 3: يزداد طول العناصر 3 (ARN _m) كلما اتجهنا من بداية المورثة إلى نهايتها حيث زاد عدد النيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين المقروءة في المورثة من طرف الأنزيم زاد عدد النيوكليوتيدات الريبية المرتبطة (المركبة) في الـ ARN _m وبالتالي زيادة الطول
	01 بيانات	3. الرسم التخطيطي التفسيري:
	01 رسم	
0.75 0.75 0.75 01 2.25 1.50	3*0.25	التمرين الثاني: 07 نقاط I- 1. تسمية البيانات المرقمة في الشكل أ (1)- البنية الحلزونية α ، (2)- البنية الوريقية β ، (3)- منطقة إنعطاف.
	3*0.25	2. وضع تعريف دقيق للبنية الفراغية: شكل فراغي يكتسبه البروتين نتيجة انطواء والتفاف السلسلة الببتيدية على مناطق محددة، إضافة إلى تشكل روابط كيميائية مختلفة بين أحماض أمينية محددة (شاردية، هيدروجينية، كبريتية...) <u>منموضعة بطريقة دقيقة</u> ضمن السلسلة الببتيدية....
	0.25	3. a. عدد الأحماض الأمينية المكونة للقطعة الببتيدية:- 16 حمض أميني
	0.25 0.25	تصنيف الحمضين الأميين مع التعليل: (A) حمض أميني حمضي، لاحتواء السلسلة الجانبية على وظيفة حمضية كربوكسيلية. (B) حمض أميني متعادل، لعدم احتواء الجذر R على أي وظيفة أمينية أو حمضية كربوكسيلية
	0.5 0.5	b. دور الأحماض الأمينية على مستوى الإنزيم: ❖ الأحماض الأمينية الموجودة خارج الموقع الفعال تضمن تماسك البنية الفراغية للإنزيم وذلك بتشكيل روابط كيميائية مختلفة بين أحماض أمينية محددة. ❖ الأحماض الأمينية الموجودة ضمن الموقع الفعال تضمن الارتباط والتأثير على مادة التفاعل عن طريق مختلف الروابط الانتقالية التي تنشأ بينها وبين جزء من مادة التفاعل.
	3*0.25 3*0.50	II- 1. نسب البقع إلى الأحماض الموافقة، مع التعليل: نلاحظ أن كل من الحمضين B و C يتجهان نحو القطب السالب و هذا يعني أنهما يحملان شحنة سالبة (فقد البروتونات) إذن الوسط قاعدي. في هذه الحالة يكون :- $PH_i(C) < PH_i(\text{الوسط})$ $PH_i(B) < PH_i(\text{الوسط})$ الحمض الأميني بقي في منتصف الشريط فهو متعادل كهربائيا وبالتالي :- $PH_i(A) = PH_i(\text{الوسط})$ من العلاقة 1 و 2 نجد $PH_i(C) < PH_i(A)$ $PH_i(B) < PH_i(A)$ انطلاقا من معطيات الجدول نجد :- $PH_i(A) = PH_i(\text{الوسط}) = 9.74$ الحمض الأميني B يقطع مسافة أكبر من C إذن $ PH_i(B) - PH_i(\text{الوسط}) > PH_i(C) - PH_i(\text{الوسط}) $ من خلال معطيات الجدول نجد :- $PH_i(C) = 5.02$ و $PH_i(B) = 3.08$ إذن البقعة A توافق Lys و البقعة B توافق Glu و البقعة C توافق Cys 2. تمثيل الصيغة الكيميائية للأحماض السابقة عند $PH=9.74$. $\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array}$ الحمض الأميني السيستئين: $\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array}$ الحمض الأميني الغلوتاميك: $\begin{array}{c} \text{H}_3^+\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ الحمض الأميني الليزين:

التمرين الثالث: 08 نقاط

الجزء الأول:-

1. تحليل الشكل ب:

يبين الشكل ب موقع فعال للإنزيم به ثلاث أحماض أمينية هي Arg_{145} ، Glu_{270} ، Tyr_{248} به مادة التفاعل (ثنائي بيثيد)، إضافة إلى ذرة الزنك (Zn^{+2}).

بحيث ترتبط مادة التفاعل بالأحماض الأمينية للموقع الفعال بثلاث روابط انتقالية هي روابط هيدروجينية: رابطة مع الحمض Arg_{145} (بين O لمادة التفاعل و H للأرجنين) رابطة مع الحمض Tyr_{248} (بين N لمادة التفاعل و H للتيروزين) رابطة مع الحمض Tyr_{248} (بين H لمادة التفاعل و O للتيروزين)

2. المعلومة المستخرجة من الوثيقة 1:

- ❖ قبل استخراج المعلومة يجب تقديم تحليل مختصر للوثيقة نصف فيه أهم التغيرات الملحوظة .
- ❖ تحفز مادة التفاعل الإنزيم على تغيير شكل موقعه الفعال حيث تتموضع الأحماض الأمينية المشكلة له في المكان المناسب للإرتباط ثم التأثير عليها عن طريق تشكيل روابط انتقالية ضعيفة ومؤقتة. إنه التكامل المحفز.

الجزء الثاني:-


1. تحديد الحمض الأميني المستهدف من طرف كل إنزيم (حسب الوثيقة -2):

- ❖ الكيموتريسين:- حمض Tyr
- ❖ الكربوكسي بيبيدياز أ:- حمض Gly

2. نتيجة تأثير إنزيم الكربوكسي بيبيدياز أ على القطعة الببتيدية:

Glu—Asp—Leu—Tyr ، His—Gly

✓ التوضيح برسم تخطيطي:



الجزء الثالث:-

النص العلمي:



A- العلاقة بين البنية الفراغية والتخصص الوظيفي للإنزيم:

- ❖ يتعلق نشاط الأنزيم ببنية الفراغية
- ❖ يتم الحفاظ على استقرار البنية الفراغية للإنزيم نتيجة تشكل روابط كيميائية مختلفة بين أحماض أمينية محددة (شاردية، هيدروجينية، كبريتية...) متموضعة بطريقة دقيقة ضمن السلسلة الببتيدية.... (محددة وراثيا).
- ❖ يضمن اكتساب البنية الفراغية شكل الموقع الفعال .
- ❖ يؤمن الموقع الفعال وظيفة الإنزيم :- الإرتباط (مجموعة التعرف) و التأثير (مجموعة التحفيز) على مادة التفاعل عن طريق تشكيل روابط انتقالية ضعيفة ومؤقتة.


B- آلية تأثير درجة الحرارة على وظيفة الإنزيم:

- ❖ تؤثر درجة الحرارة المنخفضة أو المنعدمة على حركة الجزيئات في الوسط مما يؤدي إلى تباطؤ أو منع تشكل المعقد ES وبالتالي يكون النشاط الإنزيمي ضعيف أو منعدم.
- ❖ عند درجة الحرارة المثلى تكون البنية الفراغية للإنزيم طبيعية مما يسمح بتشكيل المعقد ES فيكون النشاط الإنزيمي أعظميا.
- ❖ تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في تحطيم الروابط الكيميائية الضعيفة (خاصة الهيدروجينية) التي تحافظ على استقرار البنية الفراغية للإنزيم خاصة الموقع الفعال فيفقد بنيته الفراغية المميزة ويصبح غير وظيفي وهذا ما يمنع تشكل المعقد ES وبالتالي يكون النشاط الإنزيمي منعدما.



Free enzyme





Michaelis complex



Nucleophilic
water attack




Amine product
release



Enzyme-carboxylate complex

Tetrahedral intermediate

Active Site of Carboxypeptidase




3- Metallo Peptidases

-The **arrangement** of other participating residues in the active site of **Carboxypeptidase A**, as revealed by **X-ray** structural analysis of the enzyme-substrate complex is shown.

-The enzymes are active in the **pH 6–9** range; their specificity is generally low.

-Inhibition of these enzymes is achieved with **chelating agents** (e.g. **EDTA**) or sodium dodecyl sulfate (**SDS**).



Carboxypeptidase A active site



امتحان الفصل الأول

في مادة علوم الطبيعة والحياة

ملاحظة هامة:


اقرأ بتمعن، ركز، حاول ثم اجب بدقة.

التمرين الأول: (08 نقاط)




تسمح البنية الفراغية للإنزيم من أداء وظيفته النوعية ، و هذا مرتبط بوحدهاته التركيبية " الأحماض الأمينية ."

I - يمثل الشكل 1 - من الوثيقة (1) البنية الفراغية لجزيئة بروتينية وظيفية (إنزيم) تم الحصول عليها باستعمال أحد البرامج المهمة في هذا المجال ، بينما يظهر الشكل - ب - الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر من الشكل 1 - والتي لا تتوافق مع المبدأ العلمي لارتباط الأحماض الأمينية ضمن السلسلة الببتيدية.



الشكل - ب -



الشكل 1 -

- 1 - نذكر بأهمية هذا البرنامج و استعمالاته.
 - 2 - تعرف على المستوى البنائي لهذه الجزيئة ، ثم صف بنيتها .
 - 3 - أحسب الوزن الجزيئي لهذا الإنزيم باعتبار أن الوزن الجزيئي المتوسط للحمض الأميني (100 g/moles) و أن الوزن الجزيئي لجزيئة (H₂O) هو (18 g/moles) .
 - 4 - أعد كتابة الصيغة الكيميائية مصححا الأخطاء الواردة فيها .
 - 5 - تسمح الإماهة الكلية للإنزيم المدروس بالحصول على أحماضه الأمينية وعند وضع بعض الأحماض الأمينية المؤطرة والممثلة في الشكل - ب - من الوثيقة (1) على ورقة مبللة بمحلول ذو pH = 6,8 انفصلت الأحماض تبعا لشحنتها.
- تعطى قيم الـ pHi للأحماض الأمينية AA5 (10,76) ، AA6 (5,07) ، AA7 (3,22) ، AA126 (5,97).

- ب 1 - حدّد سلوك كل حمض أميني في هذا الوسط.
- ب 2 - مثل على شريط الهجرة الكهربائية وضعية الأحماض الأمينية الأربعة.

II - مكن استعمال برنامج آخر من الحصول على الوثيقة (2) ، التي تظهر نتائج مقارنة بين جزء من السلسلة غير الناسخة من الـ ADN لثلاثة مورثات خاصة بالسلاسل الببتيدية A ، B ، C لنفس البروتين حيث الإشارة (-) تظهر التشابه مع السلسلة الأصلية A .

CAU	AAA	CCC	UGG	1	75
His	Lys	Pro	Trp		
GUA	UUU	GGG	ACC	adn - A	CATAAACCCCTGGCGCGCTCGCGGCCCGGCACTTCTGGTCCCCACAGACTCAGAGAGAACCACCATGGTGCT
Val	Phe	Gly	Trh	adn - B	-----AGTCA-G--AGAGC-AT-TATTGCT-A-ATT-G-TTCTGACACA-CT-T-TT-A-TAGCAACCT-A
				adn - C	GGCCGG-GGCT-GCTAGGGAT-AAGAATA-AAGGAA-CA---TTCAG-AGTTCC-AC--T-G-TTCT-GAAC
جدول الشفرة الوراثية				الوثيقة (2)	




1 - حدد هذا البرنامج وعدد مزاياه.

2 - أحسب عدد الأحماض الأمينية الموافقة لهذا العدد المقدم من النيكلوتيدات في السلسلة المستنسخة.

3 - أحسب النسبة المئوية للتشابه بين أجزاء من المورثات $(B - A)$ ، $(C - A)$ ، $(C - B)$.
- ماذا تستنتج ؟

4 - مستعينا بجدول الشفرة الوراثية. وضح برسم دقيق على المستوى الجزيئي عليه البيانات ارتباط الحمض الأميني (ح) من السلسلة الببتيدية (A).

5- مخطط الوثيقة (3) يلخص آليات ومقر تصنيع البروتين عند حقيقيات النواة.



- سم البيانات المرقمة وكذلك الأحرف (أ، ب، ج، د) والنشاط (س).



التمرين الثاني: (07 نقاط)

لإظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز الأنزيمي وتأثير بعض عوامل الوسط على نشاط الأنزيمات تم إنجاز دراسة علمية تظهر العلاقة بين تلون الفرو عند الأرنب ونمطه الوراثي وكذا درجة حرارة الوسط.




1 - يظهر الشكل (1) من الوثيقة (1) سلالتين من الأرانب:

- سلالة a متوحشة ذات فرو داكن.

- سلالة b الأرنب الهيملاي ذات فرو أبيض ماعدا بعض المناطق.

أما الشكل (2) من نفس الوثيقة فتظهر سلسلة التفاعلات المسؤولة عن تحويل مادة تيروسين tyrosine إلى ميلانين Mélanine المسؤولة عن ظهور اللون الداكن.

(1) الوثيقة



1 - اقترح فرضيتين تفسر بهما عدم ظهور اللون الداكن في بقية الجسم عند الأرنب الهيمالاوي.



2 - لفهم العلاقة بين الفرو عند الأرنب الهيمالاوي ودرجة حرارة الوسط أجريت التجارب التالية :

التجربة 1 :

عند إزالة الفرو للأرنب الهيمالاوي ووضع هذا الأرنب في وسط درجة حرارته 15 °م طيلة فترة تجديد فروه , يظهر الفرو الجديد كله داكنا مثل فرو السلالة المتوحشة (a) مع العلم أن درجة حرارة الجسم الطبيعية عند الأرنب هي 37 °م.

النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (2) والتي تظهر إنزيمات الفرو تيروزيناز tyrosinase محصل عليها بتقنية الفصل الكروماتوغرافي chromatographie الذي يتعلق بالوزن الجزيئي.




التجربة 2 :

لمعرفة فعالية إنزيم التيروزيناز عند سلالتين الأرانب (a و b) أجريت سلسلة التجارب التالية .

الأنايب	الشروط التجريبية
الأنبوب 1	كمية (ك) من التيروزين + أنزيم تيروزيناز السلالة b في درجة حرارة 36°م
الأنبوب 2	كمية (ك) من التيروزين + أنزيم تيروزيناز السلالة b في درجة حرارة 30°م
الأنبوب 3	كمية (ك) من التيروزين + أنزيم تيروزيناز السلالة a في درجة حرارة 36°م
الأنبوب 4	كمية (ك) من التيروزين + أنزيم تيروزيناز السلالة a في درجة حرارة 30°م

و النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (2) من الوثيقة (2) .



الوثيقة (2)

أ - ماذا تستخلص من نتائج الشكل (1) من الوثيقة (2) ؟

ب - حل منحنيات الشكل (2) - ماذا تستنتج ؟

ج - وضح كيف تسمح لك معطيات هذه الوثيقة من تأكيد صحة أحد الفرضيات المقترحة في السؤال 1 ؟

د - مثل برسم تخطيطي العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل في الزمن 10 د في كل من الأنبوبين (1 و 2) .

3 - لمعرفة سبب تأثر البنية الجزيئية لإنزيم التيروزيناز بدرجة حرارة الوسط نقدم الوثيقة (3) :

الشكل (أ) من الوثيقة (3) يمثل جزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة إنزيم تيروزيناز لكلا السلالتين (a و b) والشكل (ب) من

الوثيقة (3) يمثل تتابع الأحماض الأمينية المقابلة لها .

تتابع النيكلوتيدات	1	2	3	4	5	6	7
الأليل المتوحش	...CAG	AAA	AGT	GTG	ACA	TTT	GCA...
الأليل الهيمالاوي	...CAG	AAA	AGT	GAC	ATT	TGC	ACA...

الشكل (1)

تيروزيناز متوحش	... Glu — Lys — Ser — Val — Thr — Phe — Ala...
تيروزيناز هيمالاوي	... Glu — Lys — Ser — Asp — Ile — Cys — Thr...


الشكل (ب)

- باستغلال الوثيقة (3) والشكلين 1 و 2 قدم تفسيراً يظهر العلاقة بين النمط الوراثي لإنزيم التيروزيناز وتأثير درجة حرارة الوسط عند الأرنب الهيمالاوي .



التمرين الثالث: (05 نقاط)

I - يتوقف نجاح زرع الطعم لدى الانسان على مدى التوافق من حيث نظام (HLA) بين المعطي و المستقبل إذ



الوثيقة (1)

يملك كل فرد تركيبة خاصة به من حيث الأليلات المشفرة لجزيئات (HLA)، حيث تمثل الوثيقة (1) النتائج المتعلقة بنسبة نجاح الزرع.

أ - ما هي العلاقة التي يمكنك استخراجها من الوثيقة (1) بين جزيئات النظام (HLA) و نسبة قبول الطعم؟


ب - حدد في جدول الاختلافات البنيوية بين HLA-DR

و B و HLA-A

II - تطور مرض الداء السكري عند شخص (ب) فسبب له فشلا كلويا حادا، استلزم إجراء عملية زرع كلوي. وللحصول على كلية تقدم لهذا الغرض ثلاثة أفراد متطوعين (س، ع، ص) من أجل تحديد الأنسب منهم أجريت الاختبارات المبينة في الوثيقة (2).

الاختبار الأول: أخذت من الشخص (ب) خلايا لمفاوية و بلعمية و وزعت على أربعة أوساط أضيف لكل واحد منها خلايا كلوية لأحد الأفراد المتطوعين (س، ع، ص) وكذلك الخلايا الكلوية للمصاب (ب). الشكل (1) يبين نتائج الاختبارات النسيجية.

الاختبار الثاني: الشكل (2) يمثل نتائج الاختبارات الوراثية (تحديد أليلات الذات).



1 - باستغلال نتائج الشكل 2، حدد المتطوع الأنسب مع التعليل.

2 - هل نتائج الاختبار في الشكلين (1 و 2) منسجمة، وضع.

3 - إذا اعتبرنا أن نتائج الاختبار الثاني مؤكدة، استخرج الشخص الذي يجب إعادة اختباره الأول.

أيامي أربعة:

قال الخليل بن احمد:

ويوم اخرج فألقى فيه من هو اعلم مني فأتعلم منه فذلك يوم غنيمتي:

ويوم اخرج فألقى من أنا اعلم منه فاعلمه فذلك يوم اجري:

ويوم اخرج فألقى من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي:

ويوم اخرج فألقى من هو دوني وهو يرى انه فوقني فلا أكلمه واجعله يوم راحتي.

التمرين الأول:

في نهاية الحمل تنمو الغدد الثديية عند المرأة و تنقسم خلاياها لتركيب مجموعة هامة من المواد تدخل في تركيب الحليب.

1- تحضن مجموعة من الخلايا الغدية.

- المجموعة الأولى: في وجود اليوراسيل المشع.

- المجموعة الثانية: في وجود الحمض الأميني الـ Leu المشع.

نستخلص كل ساعتين الـ ARN لخلايا المجموعة الأولى

و بروتينات المجموعة الثانية و نقيس نسبة الاشعاع داخل هذه

الجزينات، النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة 1

1- حل وفسر النتائج المحصل عليها؟

2- علل التتابع الزمني لظهور هاتين الجزينتين؟

3- سم المراحل المشكلة للجزينتين محددا مقر كل منها؟

2- يعتبر الكازين من البروتينات المفرزة في الحليب. حيث يلاحظ عند بعض النساء غياب هذا البروتين في حليبهن حيث تتميز المورثة المسؤولة عن تركيب هذا البروتين بالقطعة التالية :

TAC TCC CTC AAT CTT ATT TTG

1- فسر غياب الكازين في حليب هذه النسوة.

التمرين الثاني:

الليزوزيم بروتين يتكون عند الانسان من 130 حمض أميني اكتشف صدفة من العالم ألكسندر فليمينغ حيث اتضح أن له القدرة على تخريب جدران البكتيريا، لدراسة بنية انزيم الليزوزيم و العوامل المؤثرة على نشاطه نقدم الوثائق التالية:

1- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 البنية ثلاثية الأبعاد لانزيم الليزوزيم بينما الشكل (ب) يبين البنية الأولية لهذا الانزيم و ترتب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب العنصر (ك)



-
- 105 110 115 120 125 130
- | Reference | Query |
|--|--|
| ArgAspProGlnGlyIleArgGlnIaTrpGlnAlaTrpArgGlnGlnArgCysGlnIleGlnArgAspGlnArgGlnIaTrpGlnAlaGlnGlyCysGlyGlnAla | ArgAspProGlnGlyIleArgGlnIaTrpGlnAlaTrpArgGlnGlnArgCysGlnIleGlnArgAspGlnArgGlnIaTrpGlnAlaGlnGlyCysGlyGlnAla |
| ----- | ----- |
| Phe | ----- |
- Selection: 0/454
- 2


-
- | Concentration (3) | Reaction Rate (V) |
|-------------------|-------------------|
| 3.5 | 230 |
| 5.5 | 140 |
| 6.5 | 85 |
| 7.5 | 80 |
| 8.5 | 100 |

التمرين الثالث :

للعضوية قدرة التمييز بين مكوناتها (الذات) والمكونات الغريبة عنها (اللاذات)، بفضل جزيئات خاصة محمولة على الأغشية الهيولية للخلايا.


I - لإبراز مميزات الغشاء الهيولي نُقترح الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يمثل جزء من بنية الغشاء الهيولي للخلية.
- الشكل (ب) يوضح خطوات ونتائج تجربة أجريت على الغشاء الهيولي (تجربة استرجاع الفلورة) حيث تُثبت مادة مفلورة (كونكافالين A) على العناصر (4) للوثيقة (1) ثم تسلط على غشاء الخلية حزمة أشعة ليزر التي تزيل المادة المفلورة لجزء من الغشاء الهيولي، تُحضر بعدها الخلية المعالجة في وسط ملائم.



الشكل (ب)

الوثيقة (1)



الشكل (أ)

1- اكتب بيانات العناصر المرقمة في الشكل (أ) للوثيقة (1).

2- أ- هل مادة الكونكافالين (A) ترتبط بالسطح الخارجي أم الداخلي للغشاء الهيولي؟ علّل.
ب- فسر هذه النتيجة. ماذا تستنتج؟

3- استخرج من الوثيقة (1) مميزات الغشاء الهيولي.

II - تتواجد جزيئات نظام CMH على السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية وهي محددة وراثيا والوثيقة (2) تمثل دراسة لبعض هذه الجوانب:

1- الشكل (1) يمثل نتائج معاملة ثلاث خلايا (خلية كبدية، كرية دم حمراء، خلية لمفاوية LB) بتقنية الوسم المناعي: تستعمل أجسام مضادة موصومة بعناصر ذهبية مختلفة القطر.

جسم مضاد CMH I قطرها 15 نانومتر.


وجسم مضاد CMH II قطرها 30 نانومتر.

- أنسب الأغشية 1، 2، 3 إلى الخلايا الثلاث مع تعليل الإجابة.


2- انشك (2) يمثل النمط الوراثي (تركيبية أليلية) CMH I.

أ- قارن بين النمط الوراثي للأب والأم، ثم احسب نسبة التوافق بينهما.

ب- مثل نمط وراثي محتمل لأحد أبناء هذه العائلة بحيث نسبة التوافق مع كل من الأب والأم تساوي 50 %.



الشكل (1)



الشكل (2)

الوثيقة (2)

III - مما سبق ومعلوماتك، اكتب نصا علميا تبرز فيه كيف تتفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة بها.


انتهى الموضوع

اختبار الثلاثي الأول

التمرين الأول:

الجزء الأول:

- تمثل الوثيقة 1 الية تركيب زلال البيض من طرف خلية افرازية حقيقية النواة.
- اكتب بيانات الوثيقة 1 الموافقة للحروف س، ص، ع، ل بـ قارن بين ص و ع كيف تفسر ذلك ؟
- نريد برمجة اصطناع زلال البيض باستعمال البكتيريا (E COLI) حيث تتابع الاحماض الامينية الثمانية في السلسلة البروتينية لزلال البيض موضحة في الوثيقة 2.
- تم التعرف على الشفرات المضادة للـ ARN_T لكل حمض اميني لزلال البيض و هي ممثل في الوثيقة 3.
- أففي الحالة الطبيعية هل تستطيع البكتيريا E COLI اصطناع زلالا لبيض ؟ علل.
- بم امتخلص جزء من الـ ARN_m الموافق للبيتد الممثل في الوثيقة 2 ثم جُزء من الـ ADN الموافق لهذه السلسلة من الاحماض الامينية.



الوثيقة 1

سيرين - الالين - الغلايسين - ايزولوسين - سيرين - غلايسين - هيثرونين
1 2 3 4 5 6 7 8

الوثيقة 2

UAG ايزولوسين

الالين: CGU
سيرين: AGG


ميثونين: UAC
غلايسين: CCG

الوثيقة 3

الجزء الثاني:

- تأخذ البروتينات بعد تركيبها بنيات فراغية معقدة تكسبها وظيفة محددة.
- تمثل الوثيقة 1 رسما تخطيطيا لبنية فراغية لاحد الانزيمات.
- قدم وصفا دقيقا لهذه البنية.
- اكتب البيانات المرفقة.

1/4



الوثيقة 1

1/2 - يمثل الشكل التالي تسلسل الأحماض الأمينية من الجزء "م" من البروتين السابق :

Ala - ص - Asp - Phe - Glu - Asp - ص - Tyr - Lys - ع - Arg - Leu

الوثيقة 2 تمثل نتائج هضم الجزء "م" من طرف الأنزيم ببسين الذي يفك الروابط الببتيدية للأحماض
الأمينية (Trp-Tyr-Phe) أو هضم الحمض الهيدروكسي H_2N
1- استخرج الببتيدات الناتجة وعدد الأحماض الأمينية
2- اعتادا على معطيات الوثيقة 2 تعرف على الأحماض الأمينية المجهولة "س"، "ع"، "ص"

الببتيد	الكتلة المولية	الحمض الأميني	الكتلة غ/ل	PHI	الحمض الأميني	الكتلة غ/ل	PHI
01	261	Ala	89	6	Val	117	6,01
02	508	Gly	75	6,06	Tyr	181	5,64
03	649	Asp	133	2,08	Lys	146	9,6
		Phe	165	5,49	Arg	174	0,76
		Glu	147	3,15	Leu	131	6


الوثيقة 2

ب- أعطت الإماهة الجزئية للجزء "ل" من البروتين السابق المركبين H_2N و $COOH$ بحيث يتרכب هذين
المركبين من الأحماض الأمينية التالية (Cys, Val ; Asp ; Lys) و الممثلة في الوثيقة 3.

$\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2\text{SH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
السيستين $\text{Phi} = 5.96$	الغالين $\text{Phi} = 5.96$	حمض الإسباريك $\text{Phi} = 3.77$	الليزين $\text{Phi} = 9.74$

الوثيقة 3


- 1- ماهو سلوك هذه المركبات اتجاه المحلول ذو $\text{pH} = 5.5$ (كل واحد علي حدي)؟ مع التعليل
- 2- استنتج الخاصية التي تتميز بها هذه المركبات من خلال الدراسة ؟ هل تطبق هذه الخاصية علي البروتين السابق (الممثل في الوثيقة 1) ؟ علل اجابتك
- 3/ بهدف التعرف علي تركيب المادتين α و β نقوم بفصل المركبات العضوية لهما بطريقة الفصل الكهربائي النتائج موضحة في الوثيقة 4
1. اعتمادا علي النتائج الفصل الكهربائي ماهي المركبات، المشكلة لكل من المادتين α و β ؟




الوثيقة 4

التحليل الثاني

إليك المعادلة التالية التي تعبر عن إمالة السكروز تحت تأثير إنزيم السكراز إلى السكرين البسيطين الفركتوز والغلوكوز، الوثيقة (1).



- 1 - ما هي العلاقة البنوية بين كل من إنزيم السكراز والسكروز؟
- 2 - تقدم عادة الرموز التالية للتعبير عن التفاعلات الإنزيمية: E, S, P.
- أ - استخدم الرموز السابقة للتعبير عن معادلة إمالة السكروز.
- ب - ماذا تمثل هذه الرموز؟
- 3 - لدراسة آلية عمل السكراز إليك الرسوم التخطيطية التالية:



الوثيقة 2

G: غلوكوز، F: فركتوز، 1: ذرة الكربون رقم 1، 2: ذرة الكربون رقم 2

- أ - صف عمل إنزيم السكراز اعتماداً على الوثيقة (2).
- ب - ما هي المعلومات المستخلصة حول خصائص الموقع الفعال للإنزيم.
- ج - هناك حالتان ناقشتان عن الطفرات يفقد الإنزيم إما قدرته على تثبيت الركيزة الحالة (1) أو ترتبط مادة التفاعل بالإنزيم ولكن يفقد الإنزيم قدرته على التفاعل الحالة (2) والجدول الموالي يبين النمطين من هذه الطفرات.

الطفرة الأولى	استبدال الحمض الأميني Asp المرقم بـ 23 بالحمض الأميني Asn
الطفرة الثانية	استبدال الحمض الأميني Glu المرقم بـ 204 بالحمض الأميني Ala

- د - حدد نتيجة تأثير كل طفرة.
- هـ - ما هي مميزات الموقع الفعال للإنزيم التي توضحها نتائج هذه الطفرات؟